

OBSERVATIONVM
ET
CVRATIONVM
CHIRVRGICARVM

Libri Quatuor posteriores.

Quorum	{	I. II. III. IV.	}	DE	{	Plagis, seu Vulneribus cruentis, casu,
						offensione, percussione, contusione
						ac concussione.
						Ulceribus,
						Fracturis,
						Luxationibus.

IN QVIBVS EORVNDEN CAVSSÆ,
SIGNA, PROGNOSIS ACCVRATE ET
graphice depinguntur.

AVCTORE.
PETRO FORESTO ALCMARIANO
Med. Delphensi.

Cum Priuilegio S. Cæs. Maiest. ad decennium.

Nec non verum ac materiarum Indico locupletissimo.



FRANCOFVRTI,
Apud D. Zachariam Palthenium.

Anno M. DC. XI.





CLARISSIMO, CONSVL
TISSIMO, AC DOCTISSIMO VIRO,

Dn Zachariae Brendelio, Med. Viriutque D. & in incl-
ta Salana eiusdem, necnon Physices Professorice-
leberimo, suo amico venerando.

S. P.

Quatuor hosce Clarissimi Viri Dn. Petri Foresti,
Observationum Chirurgicarum libros ultimos, Vir
Clarissime ac doctissime, sub nominis tui amplissimi
utela publici iuris esse volo duabus de causis Pri-
um quod priorum librorum inscriptionem tibi oppido
gratam fuisse intellexim: deinde, ut inter usurium praestitorum be-
neficiorum iterum persolverem. Et cur non digni sint tali pa-
trono, cum totam plane rem Chirurgicam solita sibi methodo au-
ctor in eis absoluat: adeo quidem ut si us priores quinque de Tumori-
bus praeter naturam libros adiunxeris, Chirurgiae Candidatis ac stu-
diosis nihil amplius desiderandum sit, quod ad exactam artis iñue-
scientiam conducere queat; utque hisce novem voluminibus instructi
ad operationem ipsam seu ^{exercitium}, Deo auspice, progredi audacter pos-
sint, praecedente tamen necessario exacta Anatomia, quam ex Riolano
inter Neotericos exactissimo, sibi comparare poterunt, cognitione. Tu-
um iam est, vir clarissime, eosdem ea benevolentia, qua priores, hoc est,
prompta ac dextra accipere: Paltheniumque tibi commendatum albo
notare lapillo. Vale.

a tui cultore

Zacharia Palthenio D.

CATALOGVS OBSERVATIONVM CHIRVRGICARVM,

horum quatuor librorum.

LIBRI SEXTI.

qui est de plagis seu vulneribus cruciatis, casu, offensione, percussione, ac contusione contusione, OBSERVATIO I. De vulnere simplici, ac male curato sine lethali.

II. De vulnere perperam indicato non esse lethale.

III. De vulnere Hegatu. M. Iacobi Carpi.

IV. De vulnere ventriculi.

V. De vulnere ventriculi.

VI. De vulnere in felle vulnerato, Iac. Carpi.

VII. De vulnere abdominis, per quod eviscerum dilapsum erat, & ab indebito chirurgo abscissum.

VIII. De vulnere ventris seu abdominis, ad interiora penetrante.

IX. De sagitta vulneri infixa extrahenda.

X. De vulneribus venenosis tele phostitis.

XI. De vulnere fallo per incisum in facie.

XII. De vulnere in facie prope maxillam suam suam & profunde ex Carpi descripta.

XIII. Carpi, De vulnere quodam pene raptum manus secundum transversum incisum.

XIV. Carpi, De vulnere quodam in raptu manus glabe transversum incisum & lesa.

XV. De vulnere in oculi sinistro palpebra, Iac. Carpi.

XVI. De vulnere sexdecim annorum, casu, in oculum in palpebra vulnerato.

XVII. De vulnere transverso, utramque partem tam posteriores quam anteriores ipsius thoracis.

XVIII. De quodam vulnere in pede dextro, adeo vehementer, ut totus per circa oculum seu malleolum abscissus fuisset, & ingens dolor aderat, Iacobi Carpi.

XIX. De quodam vulnere in cubito brachii sinistro, ut totum os cum iuxta nervis incisum esset, & ex dolore motus esset de humero, Iacobi Carpi.

XX. De paralyti pollicis, ex incisione musculi, Laurentii Bonasucci.

XXI. De frange in vulnere.

XXII. De frangente seu debito ex ista.

XXIII. De simplici vulnere in carne.

XXIV. De vulnere profundo & occulto, quantum ad latitudinem eiusdem, in parte superiore dextri.

XXV. De novo vulnere.

XXVI. De vulnere inducenda Iac. Carpi.

XXVII. De vulnere fallo in crura, cum contusione in humero.

XXVIII. De contusione ab igne vulnere.

XXIX. De incisione quodam excelsatione supra palum cadente, ac seipsum ledente.

XXX. De casu ab alto, in quo timbatur eoque quatuor assensu membrorum interiorum.

XXXI. De offensione & casu.

XXXII. De vi ex summo pendere lenitate aliquid mali in corpore sentiri.

XXXIII. De submersione aqua.

XXXIV. De vulnere in oculis ab animalium venenosis.

XXXV. De vulnere cum profusione sanguinis ex arteria.

XXXVI. De sanguinis profusione ex vulnere.

XXXVII. De vulnere in mano per transversum fallo, tendinibus ac nervis transmissis.

XXXVIII. De nervi paralyti.

XXXIX. De vulnere in iuxta, & loco nervo fallo, phlegmon accedente, unde humidum quod exstulabat.

XL. De nervi contusione.

XLI. De crura ferre ablato.

XLII. De capiti contusione.

XLIII. De simplici contusione capitis, ab igne dissectione.

XLIV. De contusione capitis, cum raptura cruris.

XLV. De vulnere quodam, & vulnere ac, in oculis, & igne ut inde visum amitteret.

XLVI. De vulnere brachii, & de vulnere sub scapula, & de vulnere in dextro, penetrante ad interiora.

XLVII. De vulnere thoracis, transiente in pulmonem: cui quoque prodest, ipse vulneratus esset.

XLVIII. De vulnere cum encephalo, penetrante ventriculorum, lethali.

XLIX. De vulnere vulnerato: ex quo vulnere subscapula esset motus.

L. De vulnere lethali sub planta pedis.

LIBRI SEPTIMI.

qui est de viceribus.

OBSERVATIO I. De viceribus & aceria in superficie, in quodam hydropis laborante.

II. De viceribus quodam in viceribus & maligno.

III. De viceribus alio quodam maligno curato.

IV. De viceribus quodam ab amissione medullae dexterae, & casu curato, deinde & de quodam in dextera viceribus curato.

V. De quodam habente viceribus alidum in tibia.

VI. De viceribus cum viceribus in quodam plantarum.

VII. De viceribus viceribus.

VIII. De viceribus, in qua motus erat de abscissis frangente.

IX. De superficie carnis in viceribus.

X. De viceribus viceribus.

XI. De viceribus cum viceribus corruptione.

XII. De viceribus malis & malignis in viceribus.

XIII. De viceribus viceribus, ambulans, & viceribus.

XIV. De viceribus feridis & putridis.

XV. De viceribus profundo & cavernoso.

XVI. De viceribus, in oculis obduci, & viceribus, & viceribus.

XVII. De viceribus viceribus supra oculum viceribus.

XVIII. De viceribus in tibia.

LIBRI OCTAVI.

qui est de fracturis.

OBSERVATIO I. De ossibus contusione, in qua motus erat fractura.

II. De quodam qui fracturam cruris patiebatur.

III. De viceribus maxilla fractura.

IV. De viceribus in humero, & viceribus, & viceribus, & viceribus.

V. De fractura furculae fractura.

VI. De fractura costarum, & plicacione sursum dem.

VI. De fractura coxae.

VIII. De humero, ac deinde etiam brachio fractura.

IX. De tibia fractura.

LIBRI NONI.

qui agit de ossibus luxatis.

OBSERVATIO I. De coxa luxata.

II. De maxilla inferiore seu mandibula luxata.

III. De vertebra seu luxata & fractura, unde motus fuit, & viceribus.

IV. De humero luxato.

V. De tibia luxata.

VI. De femore luxato.

VII. De gune articulo & sua loco paululum motu.

VIII. De pede luxato.

OBSER-



OBSERVATIONVM ET CURATIONVM.

CHIRVRGICARVM.

Liber Sextus,

D^r

PLAGIS, SEV VVLNERIBVS CRVENTIS, casu, offensione, percussione, contusione, ac concussione:

D. PETRO FORESTO Alcmariano, Reip. Delfensis medico, auctore.

Sunt etiam interiecta quaedam Observationes Iac. Carpi Chirurgi Bononiensis.

OBSERVATIO I.

De vulnere simplicis, ex mala curatione facto lethali.

P

Ver annorum duodecim, cum chely luderet, in pago Langedickio vocato prope Alcmariam, & cum alius quispiam puer, chelym auferre cupiens, ipsum aliquo modo offenderet, altercatione ac rixa inter ipsos orta, vius alterum praecurrentem, cultello emissio vulneravit in clune, vulnere tamen non ita profundo: sed cum chirurgus rusticus imperitus, istius pagi ingulnus, ipsum aliquot diebus male tractasset, ac indebito modo medicamenta adhibuisset, vulnere phlegmonem induxit: quam cum melius minus curare nosset, tandem gangraena vulneris locis circumvicinis suborta est: ac paucos post dies mors. Quamvis enim parentes pueri me aduocari iussissent, tamen cum gangranam confirmatam esse viderem, puerum prope diem mortuum iudicans, rem pro deplorata reliqui: monens chirurgum, ut postea cautius se gerat: nam vulnera quae leuia videntur, si praepostero ordine curentur, id est, aut nimis cito consolidentur, aut non bene expurgentur, aut suppuratio non bene promouetur, mala & incurabilia fiunt, & primo gangranam aut sphacelum, ac postea mortem inducunt.

SCHOLIA.

*Vulnere de-
finitio.*

Cum in hoc libro sexto Observationum & Curationum nostrarum Chirurgicarum proponimus tractare de plagis seu cruentis vulneribus, breuiter scire oportet, quod chirurgi recentiores vulnus definiunt solutionem esse continuam, recentem, cruentam, seu puri seu putrefactione in partem nec mortuam ex infusum incidentem. Hanc

Auicennae interpres non modo, sed & omnes communiter plagam appellant. Atque huius definitionis examinatione inuenies apud Tagaultium lib. 2. de vulneribus cap. 1. Sic & Fallopius libello De vul. cap. 1. *Ne possimus*, inquit, *integrum vulnere rationem tractare, primo videndum, quid sit vulnus, deinde quot differentiae. quib. species vulnere distinguantur: tertio quid sit sperandum: quarto, quae ratione sanandum sit vulnus.* Quoad primum attinet, vulnus solutio est continui, idque consensu omnium scriptorum. Vt autem pateat melius, quid sit solutio continui, *viuimus. Auicenna & Galen 3. & 4. methodi*, solutioni continuitatis contraria vnitas vel continuitas cognita recte vni- ne partium, cognoscitur & solutio continuitatis. Verum solutae vnitatis variae species sunt apud eundem Auicennam: *Vulnus*, inquam, *vulnus, apertum, fissura, excisio, punctura, incisio, fractura, contusio*, &c. id genus alia. Nomina autem solutae vnitatis apud Galenum. 4. *Methodi med.* sunt *vulnus* quod in carne est, *fractura*, in osse, *contusio* siue *distensio*, in nervo, *anulso* vel *dumfio* in ligamento, *ruptio* in musculis, *collisio* vel *contusio* in valis proprie. Continua quoque soluiunt *sanguinis subter cutem effusio, oris apertio, transcolatio*, de quibus alias diximus. Ceterum utrum vulneris definitio bene instituta sit, & an vulnus simplex morbus sit, an compositus, an affectus partium similium vel dissimilium, & multae similes quaestiones dilucide explicantur ab eodem Fallopio; praesertim *primo capite dicti libri De vulneribus*: & 2. cap. ubi enumerat species omnes solutae vnitatis: & 3. ubi vulneris definitionem exactissime dat: & 4. cap. ubi vulnerum differentiae enumerantur. Quae omnia apud ipsum videre poterimus. nostrum enim non est omnia illa transcribere. Vulnere autem tu

*Soluta vni-
tatis varia
species.*

*Nomina so-
luta vni-
tatis.*

tē ex aquo possunt sanari & interficere xgros, & hęc mala vuloera a Celfo vocantur, a Galeno grauiā & difficilia. Vthacigitur cognoscitur, & possit pręueniari successus vulnerum, quatuor sunt obseruanda Primo pars affecta: secundo *morbū ipsi*, tertio *habitus corporis*, quarto *res naturales*. Circa primū caput obseruanda est *membrū vulneratū*, & eius *pręstia*, & *digressio*, secundo an pars dura, an molli, tertio an calida, an frigida, quarto eius *sius*, an *profunda*, an *timē*, quinto *numerus partium*, vltimo *vsus partium*. Quod ad secundum caput, consideranda est *magnitudo morbi*, qualitas, *sius*, *symptomata conuulsa morbo*. vltimo *complicatio aliorum morborum cum vulnere*. Circa tertium caput obseruandus est *habitus totius corporis*, an *bonum*, an *alius*, an *cachecticum* sit corpus, in tali corpore vulnus letale est, si sit alicuius momenti. Oportet etiā obseruare *habitus singularem partium*, & an in toto corpore sit aliqua affectio mala, aut si vulneratū laboret febre, vel morbo Gallico, vel alia labe vniuersali totius corporis. præterea ætas obseruanda est diligenter. Circa vltimū obseruandæ sunt res nō naturales, vt *etūs præcedens*, & *presens*, & *plenitudo*, & *evacuatio corporis*, & *motus*, & *quies*, *vigilia* & *somnus*, & *locus*, in quibus consistunt vulnerati. Aer enim maxime facit ad præstigiū vulnerū: ita etiam

7 *temperies*, & *animi passiones* sunt obseruandæ. Sit autem vobis hoc pro exemplo præstigiū: Si vulneretur pars nobilis ab infirmo in infirmo, & pars ipsa sit principū alicuius facultatis, & semper sit in motu, & sit in corpore cachectico, certā mori præmonstrabit, etiā si nō adsint omnes istę conditiones, dummodo aliqua earum adsint. At in vulnerato, quem illic Delphenses chirurgi præ manib. habebāt, etiam io morte ipsi totum corpus colore viridi ad citrinitatē declinatē infectum erat, magnam in vulnere arguens corruptionem, vt isti chirurgi impetite iudicaret, hominem iſtericiā infectum. Quare hæc de præstigiū ratione in vniuersum sint dicta: quæ ipsa postea etiam ex Scholiis tum exemplis sequētib. multo clariora euadent.

SCHOLIA.

Vidua vero seu signa prognostica vuloerū, sicuti etiā & omnis solutionis continuitatis. desumuntur ex substantia, vsu atque actione affecte cuiusque particulæ: & præterea ex propria ipsius dispositionis seu affectus essentia, item ex symptomatis quæ vulneribus ipsis accidunt, vt ex sequētib. patebit. Itaq; iudicat Galen. l. 4. Ther. quod magna & grauiā vulnera nō mediocriter adferant periculū. Tisariā autē vulnera ipsa, vt & reliqua omnia vitæ, grauiā magna; reddūt. Nēpe vel propter asiduitatē partis excellētis, vel præcellētiam, vel propter affectus magnitudinem, vel propterea quod sunt cacothie, id est, maligna, contumacia & rebellia. Hinc vulnera quæ in capite accepta sunt, aut intra thoracem, intraue etiā peritonæum peccerunt, nō paruum periculum aduachunt, potissimum si quid interiorum vna sit vulneratum. Quin etiam cacothie esse, quæcunq; in articulis accepta vulnera sunt, id quoq; vt Galenus inquit lib. 4. Therap. omnes fere sciūt:

Empirici quidem ex sola ipsa experientia: qui vero corporis naturæ scientiā cōparare studuerūt, Vulnera in ex ipsa vulneratarū partū natura. Vbi enim tendones & nervi & carne vacua atq; officia loca sunt, his doloris, vigiliarum, conuulsionis & delirii periculum insit. Adhæc vulnera quæ adeo magna sunt, vt futuris indigeant, aut si nō his, certe deligatura, periculo nō vacāt. Cuiusmodi sunt ea, quæ principales mūsculos pertransuersum penitus diuidunt, magnasq; venas, nervos, arterias, atque etis medullas ipsas discindunt ac contundunt. Primum (nempe partū lesa præstantiā) hoc aphor. nobis expressit Hippocrates: Viscera discissa (id est, magno atque profundo vulnere diuisa) aut cerebro, aut corde, aut septe transuerso, aut aliquo ex tenuiorib. arteriis, aut ventericis, aut ventericis habet. I. deo ego aliquando chirurgū Alemariæ rēsi, quū vulneratū quendā curaret vulnus in dorso circa humerū habeoetū, quod ipsum vulnus tamen nō penetrabat, cū tamē antea tabe laborasset, & cū vltimus ad optimā sanie oō perueiret, circa pectus etiā ceterius oborto apostemate, deinde alio abscessu in latere, atq; alio in inguine & circa testiculos. Idē abscessu aperto circa testiculos & pendendum, cū materia purulenta vna cū vrina efflueret, chirurgus putabat substantiam vesicæ lesam & perruptam fuisse: quod si ita fuisset, æger paulo post obisset. Verū cū nō moreretur nisi post longū tēpus, idq; nō ex vulnere aut apostemate, sed tabe consumtus ex hectica febre, qua etiam ante vulnus inſictū laborauerat, manifestū fuit ipsius vesicam nequitiam lesam fuisse. Tertius porro signū, vt pote mali moris vulnerū, seu cacothie mōtionē ille idē Hippocrat. fecit in aliis aphorismis, vbi tradit eos, quib. tumores in vicerib. apparent, non admodū conuulsi, neq; inficere, verum huī de repente evanescētib. quib. dā conuulsiōes & distēsiōes fieri: quādo scilicet vulnera a tergo insistant, quib. dā vero insano, vt de dolore acuto, vel lateris suppurationem, cū scilicet in partib. arteriarib., qua venosa sunt atq; arteriosa, vulnera contigerint, vel intestinū diffultarem (quam sanguinea nominant) si tumores sunt rubicundi, id est, sanguinei. Idē mox subiungit: Quod si in vulnerib. prævalens sit febris, & prauis, tumor non appareat, malum est ingeni, hoc est, noxa est magna. Etenim his suspicari licet materiā, quæ vulnerib. incumbere affolet, aucti, ac transmutari in sedem aliquam principem. Vulnera autem praua hic appellari ab Hippocrate, vt Galenus ait in Comment. existimandum est, quæ sunt io capitib. aut finibus mūsculorum, & maxime neruorum. Nā in capitib. mūsculorum, mūsculi nerui adnascuntur, ex finib. autem tendones oriuntur. Ceterum nomine periculi in præcedētib. intelligitur mors, vel totius corporis vel particularis membri, quæ quidē vitæ est prinatio, aut (vt dicitur) maleficiū, aut lesa pars impotētia perpetua & inextinguibilis. hoc est, priuatio sensus ac motus, ac propriæ actionis ipsius, adeo vt nō amplius mēbrū aut particulā corporis nesciatur, sed deo minuat, vt ait, & quæ uocet. veluti lapidus oculus, aut ær, vt voluit Arist. l. 2. de anima & quarto Meteor. Por-

Vulnera necessitas alia dicitur prognostica vulnerum.

ro iudicii huiusmodi vulnere cognitione (ut decet) *Targantius*, quem sapientissime in hoc libro sequemur, ut prime necessaria est cuiusque chirurgus, sed ei maxime, qui ex decreto magistratus super acceptis vulneribus in prohibito conflictu, ac illicita pugna, iudicium rectum ac æquū ferre cōpellitur. Quare in puero hoc vulnerato, de quo *Observationes* *hinc* libri epimus recte quis iudicasset, vulnus minime lethale fuisse, sed a rustici medicalistri imperitia lethale factum. Itaque ante omnia scire debet chirurgus, quæ vulnera lethalia sint ac insanabilia, quæ difficilem curationem habeant, quæ promittent. Est enim prudens hominis (ut recte nos admonet *Celsus*) eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem eius, ut occidi, quem fors ipsius peremit. Hoc modo cum ego accitus essem aliquando ad vulneratum in pectore, vulnere transiente in pulmone vsq; (nam accepta candela ardente vna atq; altera compressa ore, uti mandabam, aer seu spiritus ex pectoris vulnere prorumpens candelas exstinguit) nec ego, nec chirurgus sanitatem polliceri voluimus, cum malum incurabile esset: quamvis empiricus quidam superueniens audacter ipsi sanitatem integram polliceretur, rerum omnium, ac præcipue artis quam proficiebatur impensissimus homo: nā æger seu vulneratus ille, paulo post, ut prædixeramus, & cum Empirici magna ignominia animā exspiravit. Deinde ubi grauis incutus, si nec certa tamen desperatione, est, indicabis necessarius (id est, familiaribus & amicis periclitantibus in difficili rem esse, nisi victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel scellissime videris Sed ut hanc (inquit) prudenti viro conveniunt, si turis hislinnis est paruum rem attollere, quo plus præstet sic videatur. Ceterū (ut ad propostum revertamur) scire oportet ex mente *Galeni* in *Commentario aphorismo* paulo ante citati, vbi de hisq; &c. vulnere quædam esse debet ex necessitate lethalia, quædam vero non ex necessitate, sed magna ex parte talia esse, cōtra vero, quædam omnino sanabilia, quædam ut plurimum. *Lethalia sunt ex necessitate ac insanabilia*, quæ cordis substantiam penetrant. Hæc enim protinus hominem evit tollunt: ut enenit *Alcmæraz* *Iohanni* choroalzo fortioris filio, ab *Arnoldo Vento* iuvene vulnerato: nam ab inflicto vulnere illico eum sanguine simul animam efflavit. Quādoquidem corde sic percussio, totus sanguis, ita imperante natura, affuit ad ipsum, veluti ad præcipuam vitæ arcem, confugit, hic ex omnib; corporis partibus, ut læx parti fœtat suppetat, transmittitur, vnde maxima statim sit sanguinis profusio, quam & spiritum resolutio mox consequitur, vel in percussio viscere tumor præter naturam, maxime autē phlegmone excitatur, vel tanta sit sanguinis collectio, obstructioq; tam insignis, ut vitalis spiritus in corpus universum, ut oportebat, amplius diffundi non possit. Quo fit ut venis & arteriis languescantibus, pallescente vultu, & frigido, maliq; odoris oborto sudore, extremisq; partibus frigidis apparentibus, maturata mors sequatur. Cor enim neque solutionem

continui diu (ut inquit *Anticenus* 2. primi.) nec apostema vita permanente perferre potest. Refert tamen *Boninius* de *Abd. morh. canis. cap. 6.* scilicet in cordis tunica curesse ad *Filolopius*, *Præmā*, inquit, locū tenet vulnus in corde, quod necessario lethale est. Nemo enim vulneratus in corde dū supermixtus naturaliter, nam si obstruimus præstantia partibus, necessario mors sequi debet: ita etiam si confideremus eius solubilitatem, quæ data est, neq; potest a gelatinaria & si eius motum perennem si ceteros: ac præterea si temperem, calidum enim omnibus aliis partibus est cor, quod propterea facile potest inflammari. Si addatis postea magnitudinem vulneris, & habitum inbecilem eo quo, certissima erit signa mortis. Succedit vena cana, cuius vulnus necessaria est lethale, non quia nobilissima sit pars sed ratione vsu, quia cum totum sanguinem continet, ipsa etiam vulnerata totus sanguis effluit præterea substantia est nervosa, quæ ratum genus non potest audacis situm profundum, qui nō potest mori, attingit. Ideo vulnera vena cana necessaria sunt lethalia. *De minimere sanentur Succedit arteria magna, cuius vulnera lethalia sunt, eisdem scire et qui vulnera canis, propter quæ & vena magna vulnera. Arteria magna, cuius vulnera lethalia sunt, eisdem scire et qui vulnera canis, propter quæ & vena magna vulnera.* etiam ob continentem motū, qui agilitatis aciem præbuit. Succedit cerebrū, de quo dubitū est, ut eius vulnera sunt lethalia, an noniam quia non movetur, & molle est, & frigida temperem, colligere possimus, eius vulnus non esse necessario lethale. Est ergo vulnus sit maximum, & circa basim cerebri, & adueniens cum alio morbo, ut cum inflammatione membrarum, non est necessario lethale, sed ut plurimum, vel ex æquo. Si sit vulnus magnum, non autem maximum, & sit cum ablatione substantiæ cerebri, cum sit inflammatione membrarum, est lethale ut plurimum. Si autem vulnus modeste, sive ablatione substantiæ, & sine inflammatione, sit æquo, vulnus ergo cerebri non sunt necessario lethalia, quia cerebrum non est instrumentum vite. & calor & calor dicit, nec etiam discernit instrumentum, ut caput habet dicit, & inflammationem, sed mollitiam & frigiditatem, quæ facit ut inflammatur nec movetur, sed quiescit: ut plurimum ergo lethalia sunt, non autem necessaria. Sed contra est *Hippoc.* in lib. de vul cap. qui dicit, vulnera in cerebro mori. Respondeo, *Galenus* exemplo, qui *Hippoc.* ap. lib. 6. aphor. 13. vbi quæ habent resiliam cerebri, vel viciam, necessario mori dicit, de maximum tantum cerebri & viciam vulneribus intelligendum putat. Ita ego *Hippoc.* in lib. de vulneribus de maximum tantum vulneribus, loqui potius, qui ait, vulnera in cerebro mortem necessario succedere, quod quidem ex eodem *Hippoc.* confirmatur, qui in 2. prætoribus, emittit partes, quæ vulnerata inducunt mortem, cui dicit non ex æquo, sed alias magis inferre, alias minus, autē inferre mortem, quæ maximum vulneribus efficitur. loquitur ergo *Hippoc.* de maximum vulneribus. Hæc *Filolopius*. Hinc & alii dicunt, quod & mortem etiam adferunt inevitabile magna ac profunda vulnera substantiæ cerebri, in oculis, diaphragmatibus, stomachi seu cesophagi, ventriculi, asperæ arteriæ, pulmonis, lienis, cystis felleæ, renum, quos & tenuium intestinorum, præsertim eius, quod intestinum appellatur, atque id genus aliorum membrorum principa-

Vulnera cordis.

Vena cana vulnera.

Arteria magna, cuius vulnera lethalia sunt, eisdem scire et qui vulnera canis, propter quæ & vena magna vulnera.

Cerebrū vulnera.

Historia Empirici superueniens audacter ipsi sanitatem integram polliceretur, rerum omnium, ac præcipue artis quam proficiebatur impensissimus homo: nā æger seu vulneratus ille, paulo post, ut prædixeramus, & cum Empirici magna ignominia animā exspiravit.

Vulnera ex necessitate lethalia.

Cordis vulnus curiale.

Corrumpit vulnus.

principalium aut ipsos principalib. membris feruientium, ministerio quidem, seu ad vitam necessarium. Ideo autem vulnera eiusmodi lethalia ex necessitate dicuntur, quoniam nullius ex eis feruatur vnquam, mortemque consequitur inexcusabile, vt in sequentibus demonstrabitur. Seruari etiam non possunt Callosi, quibus in spina, medulla percussa

12 est, & quibus circa fauces grandes venae vel arteriae praecise sunt. Vulnera vero ea non ex necessitate,

Vulnera magna ex parte lethalia.

sed secundum plurimum mortalia dicuntur, quae ad regionem praedictarum partium perueniunt, vel eas leniter ac superficiei tenus dumtaxat attingunt, non autem praeter alae adiguntur, nec effutu digna sunt. Adhaec quae in capite musculorum accepta fuerunt. Ob id autem mortalia vt plurimum, at non ex necessitate dicuntur, quoniam vulneratis, nisi rite tractentur, proflus ex eis commoriendum sit si vero in nullo peccatum sit, illos interdum sanari contingit. Hinc Guido se quendam vidisse affirmat, qui in parte postica capitis vulnus acceperat, ex quo parua quaedam portio substantia cerebri exierat, vt ex memoria lesione cognitum est, & tamen is a tali vulnere conualuit, restitutaque est illi ex integro, post curationem vulneris, memoria. Non tamen asserit illum superficiei permansisse potuissse, sit tota vna cellula, seu totus vnus ventriculus, per vulnus exiisset, vt de quadam Celario refert Theodoricus. Sed nec Galenus (Comment. lib. 6. Aphorism. etiam adfirmat in illo adolescentem, quem vulnere vidit Smyrnae in Ionia, viuentem adhuc praecceptore suo Pelope, aliquid substantiae cerebri aditum fuisse, sed dumtaxat vulnus effatu dignum accepisse in altero anteriorum ventriculorum cerebri, quos ob id geminis natura condidit, vt si alter ipsorum laesus fuerit, reliquus adhuc subserviat. Sed & hoc tamquam admirabile, ac stupendum quoddam incredibileque spectaculum, seu naturae miraculum narrat idem Galenus. Id de vespertum corporis humani ipsumque adolescentem tandem sanatum fuisse refert, Deipotius, vt credebatur, voluntate, quam villa humana arte. Quod si inquit ambo ventriculi simul fuissent vulnerati, ne tempore quodam momentum in viuere potuisset. Vnde colligit ibidem gemitatis, vt sic dicam) quorundam organorum necessitatem. Cerebrum itaque insigniter & ad ventriculos vsque vulneratum sanari, rarissimum est & pene incredibile, vt in Commentario aphorismi superius citati, (nempe lib. 6.) Galenus asseruerat, vbi verum esse scribit, quod magna vulnera, quae conueniunt Hippocrati ita nominare, dissectiones & praefusiones aut praenominatis particulis mortem adferunt inenitabilem, facitque omnes, quod vulnera, quae vsque ad alaeque ventricularum cerebri penetrant, praecui dubio interueniat, mortemque adferunt praeproperam. De his epigram. lib. 9. Obs. & Curat. medicinalium nostrarum obs. 35. & 36. de dolore capitis ex vulnere capitis insillit. Vide et alia exempla in Scholii eiusdem Obs. Sed & ille, qui in capite ad tempora lapide ictus fuerat, ilico mortuus est, vt videre potes scholio obs. 32. eiusdem libri. Porro vulnera cerebri & membranarum ipsum

obuoluentium (quas Graeci *μυρίαι* vocant) idem lethalia sunt. quoniam ad lesionem ipsius cerebri & membranarum ipsum continentium, sequitur lesio. & interdum abolitio actionis musculorum thoracis, & aliorum membrorum respirationi subservientium. Horum autem actione deperdita, perire simul respirationem necesse est, vnde cor. lis quoque temperamentum soluitur, quo fit tandem, vt etiam animalis ipsius necessitatio sequatur interitus, vt lib. 5. de loc. affect. scribit Galenus. Cerebro igitur laeso insigniter aut meningibus ipsum continentibus discessis, homini atque omni animalis interitus est commoriendum est. At nunc de hepatis vulnere. Sed prius casum M. Iacobi de Carpo Bononiensis, chirurgi expertissimi, hic ponamus, quem inuenimus in libro M. Iohannis Tieny manuscripto.

OBSERVATIO III.

De vulnere Hepatis, M. Iacobi Carpi.

Nepos Magistri Iustiniani Fantini anno 1523 die 24. Iunii vulneratus erat in hepate, ex cuius vulneris orificio modica pars hepatis dependebat, quam Carpus in prima visitatione intro misit, aut repositum eandem tamen partem naturam postea se parauit. Altero die mane hoc medicamentum exhibuit: *R. rhabdaptum in substantia 3. li. mumi. 3. x. rubi in tartaro fer. xx. cum pauca vino rubeo fiat potus.* Vnde ratio hanc erat: Panis semel atque bis in aqua communi ablueri iussit, vt caliditas panis amoueretur: deinde ponit praedictum panem in aqua chalybeata, in qua bullitus erat hic facculus, pulueribus sequentibus repletus: *R. masticis, tragac. gummi arab. lib. ii. sem. plantag. ana. 3. li.* Et illo pane cocto cibabat vulneratum, donec sanguis in vulnere restrictus fuit. Tercio vero die capiebat syr. sequentem: *linili. 14 3. fr. de end. 3. li. ag. end. plantag. ana. 3. li. b. mifc.* Octauo die hoc pharmacum cepit. *R. rhab. 3. li. 3. m. schiobanthis fr. vii. mannae 3. li. 3. cum ag. chalybeata, ana. q. li. fiat potus.* Modus vero medendi vulneris hic erat. In secunda visitatione, vulnere prius tamen a sanguine absterco, etiam ita enim vocat modice hoc emplastro illinitam imposuit: *R. sang. dracon. in lact. yma, myrrall. boli arm. ana. 3. li. 3. rub. m. li. puluerizatur omnia subtilissime per se, & emplastrum ex eis cum albumine oui conficiebat.* Deinde vulnus oleo rosario tepido inungebat circumcirca, & pulvere sang. draconis aspergebat. Tercio stuppam in aceto insusam & expressam, & in dicto emplastro illinitam superposuit. Quarto peciam panni de lana in aceto insusam ponebat. Vltimo lisciauit & sic continuauit per quatuor dies. Postea dimisso illo emplastro tentam insusam in oleo absterco & oleo rosario imposuit, & circa vulnus cum oleo rosario, & praedictis puluere procedebat: vltimo loco peciam lini in vino spisso insusam & bene expressam, in quo vino bullierant salina, rosamarinus, rosa rubra, vulnere imponebat: & sic processit vsque ad septimam. Deinde praescripsit vnguentum generans

CAR-

Adolescentem qui ex vulnere cerebri saluatus.

Vulnera temporis cerebri lethalia.

carnem, cuius descriptio hæc est: *Rolci abietini, myrtini ana ℥ ss. cera ℥ i. thuris, sang. dracon. ana ℥ ss* fuit vnguentum quo vnguento illinebat tentam. peccata vero ex lino illinebat vnguento *basilico* maiore, & aliquando vnguento *resina*. Postea consolidavit cum crocitis illi conuenientibus. & sic, U. i. gratia, sanatus est.

S C H O L I A.

Hepatis vni
nera. **G**vidoa Gulli & co affert hepatis vulnera, etiam circa fibras ipsius, non admodum tamē profunda, nec cum ablatione alicuius portionis substantiæ ipsius, glutinari & prorsus sanari. Quia in re Galenum sequutus est, qui in *Comment. 18.*

15 *lib. 6 aph.* haud quaquam veritatem consentanea eos dixisse refert, qui non solum vulnera, quæ in summa iecino:is partis consistunt, sanari posse affirmabant, sed & profunda quoque in fibris eius facta, imo & fibras ipsas abscissas. Hic tamen, vt habet historici (*quam ex libro manu descripto a M. Iohanne Tienge medico suo habui, discipulo ipsius Carpi*) pars exigua hepatis a natura separata fuit, vulnere tandem consolidato. Ceterum quicquid sit, causa, ob quā vulnera iecino:is magna ex parte lethalia sint, est, quæ propter defectū nutritionis cor languet, ac emoritur, atque ita tandem deperit animas sed non illico. Quādoquidem ob vicium hepatis & imbecillitatem, sine alimento permanens æger, diutius etiam sufficere potest, vt Gal. est auctor *lib. 3. de loc. aff. 7.* sic inquit: *Peritector aff. Rana est, tum ob inedia, tum mortuorum animalium verum per longa temporis intervalla, in huiusmodi affectibus vitam protelare possunt.* Sed de interperic & morbis in cōpositione hoc loco potius agit. Si autem vulnera hepatis magna ac profunda sint, venæque porta dicta iecino:is cauo commissæ (vti Delphicis euenit, qui calcem vendebat, huic & mortem prædixit, cui a vulnere inflicto venter mirum in modum attollebatur, & liquida ac sanguinolenta deieciebat) vel concava ab ipsius gibbo prodies, dissecta fuerit, vel larga sanguinis profusione oborta, breui temporis spatio moriuntur, qui ita sunt vulnerati, priusquam vulnera agglutinentur. Hepatis itaque vulnera, nam iuxta *Fallopium, p. 11. cerebrum hepatis* sequitur, aliqua lethalia sunt, aliqua non lethalia. Potest enim quoad substantiam, quoad motum, quoad usum facillime sanari, si sit vulneratum, sed difficultatem faciunt particule ex quibus cōflatur, & sicut. Si enim non vulneretur hepar circa vnam cauam, & circa partem venæ caux vel portarum, nullo modo potest sanari: in reliquis autem partibus sanari potest. Leuius etiā eius vulnera vt plurimum lethalia sunt, magna vero, & quæ circa vnam cauam sunt, necessario lethalia.

Vulnera diaphragmatis quando ita sanantur.

Nervosa sub illa & motu, adglutinationem impediunt.

Vulnera quoque diaphragmatis prius incurabilia sunt, maxime, si in parte eius nervosa fiant: hæc enim parte exangue est, adhuc in continuo est motus: quæ duo sanc prohibent, ne labra vulneris agglutinentur. Nervosa namque corpora semel diuisa nunquam coeunt, ea præsertim, quæ in perpetuo vultu motu, cuiusmodi est *sepium transversum*. Quippe tametsi dici solet, quod vul-

nera, quæ sananda sunt, vti quæ quietem requirunt, non solum tamen motus diaphragmatis, etiam si perpetuus, vulneris adglutinationem impedit, sed & nervosa quoque ipsius substantia. Quod abunde testatur Galenus, his verbis: *T. anseris, si sit vulnera, in carnosissimis partibus subinde coalescere sunt visa, cum motu, non obstanti. Quæ vero in nervosis cum herent, insanabilia sunt.* Sic etiam Fallopius: *Diaphragma, inquit, si vulneretur in parte carnea, vultus magna ex parte est lethalis, si tamen in parte nervosa, semper succedit mors, quia tunc semper succedit conussio sere totius corporis delirium & inflammatio, & non possunt oppari medicamenta. Sane difficilis grauilque curatio est etiam corū, quæ in carnosissimis partibus, si has iam phlegmone occupavit. Accidit autem hæc curandi difficultas ob eam rem, quod in ea vulnera sanies distulatur, quæ impedimento est, ne labra soluta vniatis coalescant.* Sic ille æger, qui in Platera Flandrica Delphis vulneratus cumbebat, a chirurgo impetior, aut negligentior saltem, non adeo bene tractatus, etiam duobus vulneribus externe oculi, sanie collecta in ventre & paulo supra diaphragma, tabe tandem consumtus obit. Facili incisione viscera interna læsa non videbantur, nisi quod levis cicatrix, non dum tamen curata, in parte carnea diaphragmatis apparere videbatur. Dubium iudicium erat, *utrum ex vulnere per se lethali, an per viam choliurgi imperitiam cerneret.* Sed de vulneribus pulmonis & hæc addamus.

OBSERVATIO. IV.

De pulmone vulnerato.

Pater atque filius rustici, in pago quodam Gratch dicto, in Waterlandia, eadem cohabitantes domo, atque eodem victu videntes, dum extra pagum spaciarentur, orta inter eos lite, pater minatus est filio, atque eundem cultu originato & strico inuadens profugus filius, patrem ipsum per cæcipes ex improviso cadentem, cum se ipsum defendere non posset (adhuc ferè admodum) cultello in ipsa pulmonis si de percussit. Qui cum non statim moreretur; sed ultra quatuor pluresque menses vitam protraheret, adeo nos ad eum vocati sæpe ipsum iuimus. Verum factio prognostico, pulmonis vulnera esse incurabilia, nihil in curando illo vulnere proficere potuimus. Tandem itaque ex eodem illo vulnere, cum non consolidaretur, tabe superueniente, ac pus per os exspuens, longo tempore vitam misere protrahens, consumtus mortuus est. Sed & hoc magis miratu dignū, quod in vulnerato, qui in Noloscomio Delphicis decumbebat, vidimus: qui cū ultra quatuor annos ex vulnere pulmonem læsum habuisset, cum rectus sedebat, impetu ac spiritu quodam per vulnus promodum consolidatum, sed in statum fistule efformatum ac induratum, pus cum filia & marmure euehebat. Sed cū sequenti die cocto per me præscripto vteretur, melius habebat: adeo, vt potius sæpius fuerit repetita: & quod magis admiratu dignum est, licet prius consumtus ac ad tabem incli-

Lib. 2. Mel.

17

inclinare videretur, tamen postea restitutus ac robustior factus, exiit e Nosocomio ad proprias aedes: nec de eius morte adhuc quicquam audiui, quamquam existimē vulnus istud, quod in pulmone habet, numquam exstiterat plane consolidatum iri. Podio autem nostrā, quam ipsi praeferebam, & quam auro praeferebat (cuiusque formulam summis precibus a me postulabat, et si satis commodis rebus conflat, nec inter arcana recenseri debeat) erat talis: *R. ungula cabalina m. j. herba veronica, garyophyllata, caulium rubrorum, (saniculae utriusque ana m. j. agrimonie) egregie etiam facit ad fistulas) pentaphyllonis ana m. B. rad. consolida maioris 3 uj. coquantur in aqua communī pro lib. j. adde mellis rosolati ʒ ij. syr. iunbani ʒ j. misce.*

SCHOLIA.

Pulmonis vulnera.

18

Vulnera (inquit & *Tegumenta*) quae pulmonibus incurrunt, ideo curata sunt difficilima, imo magna ex parte insanabilia. quoniam protissime phlegmonē excitant, quae si semel occupaverit, exigua (inquit *Galenus*) vulneris glutinandi spes est. Adde quod ea, quae sanandis ulceribus idonea sunt medicamenta, contingere illa integris pulmō viribus non possunt. Accedit praeterea & illis sanandi difficultas, quod respirando mouetur, & tuſſiendo lacerantur. Ait & Fallopius: *Vulnera pulmonis semperunt mortem ex aquo, & ex aquo etiam possunt sanari.* Notandum tamē, quod si vulnere tur pulmo in parte carnosā, in qua sit aliquid insignis ramus v. n. arterialis, necessatio moritur homo, quia suffocatur a quantitate sanguinis. Cognoscitis autem tale vulnus, quia exspuitur sanguis copiosus, spurculus quidem, sed niger. Succedit medulla spinalis: quae si vulnere tur ad sui principium, necessario sequetur mors, quia vniuersi corporis conuulsio succedit. Si autē ad inferiores partes vulnere tur, vulnus necessario lethale non est, nisi sit magnum, aut punctum illatum, quamvis semper conuulsio succedat, sed non ita magna, ac si in principio spinalis medullae vulnus intulitū esset. Ceterū vulnera tracheae, id est, asperae arteriae, effatu digna, & maxime, quae cartilagineae eiusdem substantiam occupant, raro etiam ad sanitatem perducuntur. particula enim haec dura est: & ex sanguis: assidueque per vulnus fit respiratio, quae sane impedimento est, quo minus labra coalescant. Magna quoque oesophagi vulnera, inter exitalia atque insanabilia numerari solent, tum ob cibae potus per eum transitum, qui sane adglutinationē prohibet, tum quod eiusmodi vulnera duntaxat, ut *Galenus ait lib. 6. Methodi*, contra medicamentorum in transitu fruuntur: sicuti & quae in ore seu orificio ventriculi consistunt. Verum hic, quae ori ipsius ventriculi insident, sensus quoque acumen sanationi obstat. Iugulares venae (quas & *organicae* vocant) grandi vulnere percussae, aere & raro curationē recipiunt: tum quod larga profusione sanguinis, hominem vitae spiritu exhauriant, tum quod ligaturam, stringendo ac filiendo sanguis necesse est, propter immensam suffocationis pericu-

lum, sustinere non possint. Sed nunc de ventriculi vulnere exemplum addamus, ut reliqua manifestiora eadem.

OBSERVATIO V.

De vulnere ventriculi.

Quirinus Adciani, Aenopola, in interſignio Pedis Griphonis habitans, a mercatore quodam, cui etiam Delphis comotabatur, vulneratus est, vno quidem vulnere versus diaphragma ad interiora penetrante, versus latus dextrū: altero paululum in sinistrum declinante. Cū autem hic vulneratus ebrius exſisteret, atque ceruicis repletus, ac citis chirurgis, plus quam dūc pinatæ ceruicis, ut nobis referebant, ex vulnere emanauerunt. Mane autem ego summo dilato: alio ad eum quoque accitus sum, vna cum Ericio medico alio, cui & adiunctus est alius medicus Heganus, nempe Hugo Nienenius, & tres simul chirurgi vna aderant. Cum autem hic pulſera intermitterent haberet, & ſ.igidum exſudaret, mortem in foribus eſſe, communī conſilio habui, & re bene accitae perpenſa, praediximus. Et tunc etiam reuera erat: nam circiter quatuordecim horas ab inſiſſio vulnere obiit. Ericius putabat, oesophagum laeſum fuiſſe: at ego vulnus ſtomachū & ventriculum penetraſſe exſtimabam, cum ſitam ceruicis copiam prius ex vulnere cum impetu fluxiſſe conſiderarem.

SCHOLIA.

Ventriculi diſſeſiones, & tuncium quoque Intestinatorum, ſed omnium maxime ſeſioni, ob rationes, quas ſupra diximus, lethales ſunt, quod particulae necroſae ſint exſanguis, per calq; vicioſarum ac ſuperuacancarum humiditatum tranſitus ſit: adde quod eorum vſus perpetuo vitæ conſeruanda eſſe neceſſarius, non ſolum vtilis: adhuc, medicamenta his locis perniciōrib. nō poſſunt commodè admoueri. Ita H. nienius Sleyerius Delphenſis, qui ad templum Diui Hippolyti calcem tum lapides oſificib. adminiſtrabat, eſſe ſub liene conſuſus eſt ad horam noctis decimam, 2. 7. die Iulii, anno 1561. cui cum chirurgus adſiſſet, & tētum impoſuiſſet, ſ. ſta decenti ligatura, plurima euomit, & nihil retinere potuit. Ad horā noctis ſecundam, cum plurimum angetur, & chirurgus linamentum ex vulnere traxiſſet, ſanguis tamquam ſonte prorumpens eſſluxit. Atque iterum ocluſo vulnere per totum ventrem dolebat, noctemque inſomnem cum maxima anguſtia peregit, & quicquid bibeſſet, euomebat, & nihil continere poterat. Ad horam decimam diei ſubſequentis iam eum vocatus fui, ſrigidum exſudabat, pulſus deſiciebat, plurimum angetur. quare nihil agendum fuiſſe, ac praedixi mortem iam adſuturam. Itaque hora ſecunda pomeridiana eodem die, videlicet 18. Iulii idē obiit. Cum autem huic ſanguis ita ex vulnere prorupiſſet, tamquē ſonte manāſſet, veriſimile fuit aut venam emulgentem, aut venam cauiam, aut aliquem ramū ex magnis venis peruſum fuiſſe, tum inteſtinum aliquod ex gracilibus, ob vtrius

Vulnera ſpinalis medullae.

Tracheae vulnera.

Oesophagi vulnera.

Ventriculi vulnera.

Ventriculi vulnera.

Ventriculi vulnera.

10

continua torfionem, hinc procul dubio mortale fuit vulnus, hominemq; intra septemdecim horas interemie. Ceterū cum vulnus lethale existeret, non potui non admirari chirurgi imprudentiam, qui ē *h. diaphanensis* ei propinauerat quam potionem licet magna ex parte euomisset, ex ea tamen bis quocunque alium deposuerat, paulo ante mortem. Præstat enim in vulneribus

Chylus & glans perit
ut coarctantur
in vul-
neribus inte-
stinalium,
quam medi-
camenta per
exhibita
vulneribus
re.

Ictus in inte-
stina vulnus
est insignis
le.

Ventriculi
vulnere.

Matricis.
Reum.
Vesica.
suam solu-

ventris (*in quibus spes aliqua sanandi est*) potius ad clystera & glandes confugere, quam ad medicinas fortes, easque per os, maxime autem in principio, exhibere: nam tunc Natura per mēbris vulnerati debilitatem, eiusmodi medicamenta ferre, aut in actum deducere ac regulare, vt vocant, nō potest, vt recte etiam monuit Ioannes de Vigo lib. 1. de vulneribus cap. 21. de vulneribus ventriculi penetrantibus. Ceterū vt eo regrediamur, vnde digressi sumus, ieiunium intestinum omnium maxime inter tenuia incurabile, (sicut Galeno & Paulo prædicatur, tum propter vasorum, quæ in eo sunt, magnitudinem, multitudinemque, tum quia tunica prætenus nervosaq; existat. Adde qd & bilem sinceram hoc intestinum ex cholagogis poris recipit vniuersam, & omnī maxime iecori vicinū habetur. Ventriculi itaq; diffisiones, & tenuium quoq; intestinorum, sed omnium maxime ieiuni, matricis, renū, vesicæ, & folliculi f. l. l. modo quo supra diximus, ob id lethales sunt, quæ omnes particule ex sanguine sunt, & superflue recipiunt, & per ea transiunt, & vitæ conferuant, nec medicamentis commode recipiunt. Exemplū vulneris renis curati vide scholio Obf. 20. l. 23. abf. & curatio nem medicinalium nostrarum de sanguine concreto ex renis vulnere ischuriam inferre: estque casus mirabilis, in quo refertur num quid subtilia renis læsi curari possit, nec ne. Porro per verbū diffisiones, magna, vti superius diximus, ac profunda vulnera intelligimus, & ad finem vsque interiorē longe lateq; percurantia,

qualia cernuntur in iis, quæ penitus sunt excisi. Hæc autē dictione ex in duxit vti sumus, ne quis putet vulnus quodcumque in prænominatis partibus, exiiale esse, atque insanabile. Ventriculus itaq; & tenuiora intestina, etiam secundum Galenum (*comm. 18 lib. 6. v. Aphorism.*) quia non parū participant carnosæ substantiæ, si in summa porte duntaxat vulnerata sunt, sepe numero agglutinantur. & velut hæc dicit factio (*vt loquuntur*) in robur substantiæ corpulentæ cōcordi concretionē coalescunt. Sic & vesicæ ceruicem siue collū quotidie sanari videmus, cū ex ea lapis extrahitur, quoniam ex parte carnosæ est. Idē & de aliis partibus iure credi potest, si per summa corporis seu substantiæ carā vulnus duntaxat incidit. Vesica, inquit Fallopius, si vulneretur, non sequitur tamē mors, nisi magnū sit vulnus, & in eius nervosa parte, aut per telatrali. Si enim sit in parte, quæ ossi sacro alligatur, sanari potest, ipse Fallopius obseruasse se dicit. Si vero sit in laterali vesicæ parte vulnus, & sit magnum, & in parte nervosa, necessario mors sequitur. Si autem ista nō adfuerit, vt plurimū lethale est, non tamen necessarium. In collo autē vesicæ sanari potest, nisi contundatur & læsetur. Quare in

calculorū exactione faciendū est potius vulnus magnū, quā digitis pars læcranda, quoniam qui læcrantur, nunquā sanantur. Vesica autem follis lacerata, mortem necessario inferit, (vt etiā supra diximus) nō ob suū, tum ob substantiā, tū ob excrementum, quod in ipso continetur, non tamē subito necat, sed per teporis spatium. Succedunt renes, qui, si eorum substantia propria vulneretur, dummodo vulnus nō pertingat ad eorū finē, nō interimit necessario: si autem pertingat ad finem, & sit magnum vulnus, necessarium & repetitionem adfert mortem, paruum autem sanari potest, quod ego vidi: quāvis plurimūq; mors succedat. Sequitur ventriculus inter partes, quæ vulneratæ hominē interficiūt. Si ergo vulnus in eo sit magnum, vt plurimum mors succedit, non tamen necessarium: si autem sit leue, frequenter interficit, & raro sanatur. In ore autem ventriculi, siue superioris, siue inferioris, necessario quidem mors sequitur: sed in aliis ventriculi carnosæ partibus sanari potest vulnus: & ab eodē Fallopio multi sanati ac integre restituti sunt, quib; perforatus erat ventriculus. Vulnere autem intestinorum, secundum eundem Galenū Fallopiū non sunt necessario lethalia: sed si vulnus cōfusi possit, aut alio quodā mediō coniungi, ac foramen obstrui, superuiuere poterunt, quam rem interdum vidimus a chirurgis artis suæ peritis scire atq; de xtre administrari, summa cum ipsorū laude, ac argorum salute. Sed his omisiss, aut in alium commodiorem locum dilatis, exemplum vulnerati lienis proferamus, non quidem quod nobis videre æque curare contigit, sed quale a Iacobo Carpo, cuius in hoc libro crebra mentio fiet, annotatum reperimus.

Vesica folis
vulnere.
Renus
vulnere.
Ventriculi.

OBSERVATIO. VI.

De multo in splene vulnerato, Iac. Carpi.

MILIS in splene vulneratus cū esset, huic Carpus præscripsit syr. sequentem: *R. syrapi ros. l. j. Baq. en. horeæ, caude equina, confolide ana 3 j. misce. & cum 3 j. trochisc. de carabe arumant. extor.* Vulnere impoluit paruas tentas, infusas in oleo hypericonis, resacæ & abstersit ana part equal. & similiter pecias in dictis oleis infusas & sic processit per aliquot dies: attamen in secundo die supraposuerat dictis peciis emplastrū tale. *R. vini optimi part. iij. acet. pari. i. & cum farina fabarum q. s. fiat emplastrum;* hoc modo inquam, continuauit per aliquot dies. Postea præscriptum est vnguentū generans carnem, ac deinde vng. cicatrizans. Interuenit a principio vena secunda est lienaris, & etiā hæc potio post syr. præscripta fuit: *R. cassia namter extrahit 3 vj. diaparr. seluani 3 j. rhubarb. an. substantia 3 m. j. spec. gr. v. cum decoct. communi fiat potus,* Atque hoc modo curatus est.

SCHOLIA.

Lienis vulnera, cum munus habeat toti corpori appropinquæ, ac prope necessaria, sitq; (*vt nonnulli dixerunt*) veluti alterum hepatis, periculosa sunt, non adeo tamen vt aliarum modo dictarum particularium. Sed hi quoq; in præcipiti sunt, in quibus vsque ad cautitatem membrorum

Vulnera v-
esica vena-
ria.

brorum

Vulnra per
miratione.

brorum intus conditorum vulnra perueniunt. Hæc enim vt plurimum lethalia sunt, tum quia aer externus & nos ambiens, per ea non alteratus ingreditur, internas partes nõ parum offenditum quia per eadem internus exhalat spiritus; quo sic expirante & euanescente, virtutis robur insigniter offenditur & dissoluitur, multoque imbecillus redditur. Accedit huc, quod eiusmodi vulnra haud cõmode detergeri possunt, quodque ea tandem degenerant in fistulas & empyemata, id est, purulentas collectiones, excitant: vnde & mors ipsi vulneratis demum accidit: quamquam tamen multi, potissimum si bene tractentur, euadunt; quod ipsum hoc sequens exemplum de vulnere abdominis indicabit.

OBSERVATIO VII.

De vulnere abdominis, per quod omentum dilapsum erat, & abscondito chylurgico abscessum.

AEGIDIVS Ioannis, Delphicensis iuuenis, insignis colastus seu nepos, ac filius perditus, vt vocant, in lupanari a nauta homine Gaudano eiusdem fauiz (cui *Syrphus* cognomen erat) culro mensario læsus fuit in abdominis parte sinistra, duobus aut tribus digitis transuersis ab umbilico, pertuso peritoneo, ita vt per vulnus omentum procerideret. Chirurgus iuuenis imperitus, qui tunc accitus erat, absque ligatione inconsiderate omentum abiecit. Vnde postea subséquuta est sanguinis profusio, & om̃i corruptio, ac deinde febris, cum alia grauissima symptomata corruptionem subsequens. Tanta putredine putredine accessit, vt etiam sub pubem factus sit abscessus, ac demum ulceratio, vt mox dicemus. Quinto autem die ab inflicto vulnere ad ægrum vocatus fui. Ad quem cum venissem, obiurgauit temerarium chirurgum, ob crassam eius ignorantiam, qui particulam omenti ad magnitudinem manus e vulnere propendentem, absque ligatione & cauterio abiecerat; vnde ex profusione sanguinis ex venulis & arteriis om̃itiam ad concauitatem ventris paulatim emanantis, magna exoriebatur putrefactio, cum & ex vulnere sanguis putridus emanaret, febrisque suboriretur? Sed quod hic chirurgus tam eorum delictum in arte sua commiserit, valde mirũ, cum experientia recenti ac aliorum periculo edoceri debuisset, vulnus illud eo modo non fuisse tractandum: oam & paucis ante illud tempus diebus, cum alius quoque chirurgus imperitus Delphicensis omentum similiter ex alterius vulnere propendulum, sine vlla ligatione abiecidisset, non multis post diebus vulneratus quem curandum susceperat, obiit ex sanguinis profusione & omenti putrefactione. Ceterum quod ad hunc iuuenem attinebat, decoctũ illa vulneraria chirurgi in vino Pictauiensi cocta, ob febrem inhibuimus: sed pro sanguinis concretionem dissoluenda, qui in concauitate ventris exitum non habens, in putredinem conuertebatur, sequens decoctum propinauimus. *R. capul. Ven.*

*scabiosa agrimonia. canthum rub. artemis. rub. hypericum. ana m. ss. herdes mundat. p. j. liquoristia rasa & mundate 3v. i. femm. farnicula 3j. sem. myella 3j. sem. quas. frigid. maior. ana 3j. rhah. scitelli 3j. squinanthi 3j. vuar. pass. enucleat. 3j. inubar. num. vti. fiat omnium decoctio in aqua comuni, pro lib. i. coletur. adde mellis ros. colati 3j. syr. de echinor. Nicol. cum rhah. syr. viol. (ob calorem febrilem) ana 3j. misc. Hæc autem, cum lassus esset in principio Decembris, anno 1562. quinto aut sexto demum die, cum ante ad eum vocati oon essemus, præscriptimus. Verum cum sitibundus esset, hac in frascripta ptisana pro febre & pro potu quotidiano ac siti vt vteretur, mandauimus. *R. bordei mundat. p. j. rad. liquor. rasa 3v. i. fiat decoctio in aqua comuni pro lib. j. Ceterum cum iam duobus tribusve diebus alium non exonerasset, eam glande sequenti irrorauimus: *R. pul. buera picta 3j. ss. sili communi parum, cum melle quod satis est, fiat glans. A glande bene excreuit. Victu tenui utebatur, hordeato contenti tantum. Postea ita leuiter eandem euacuauimus, nempe dico octavo Decembris: *R. silior. sena Alexand. 3j. rhah. b. optimi 3j. squinanthi 3j. bulliant semel in decocto iam superscripto: cuius fortis ex pressio accipe 4ij. adde syr. ex infus. ros. 3j. misc. bis optime excreuit. Nono die Decembris hanc potiunculam præscriptimus: *R. corticum rad. echinor. dentis leonis, farnicula, liquor. rasa ana 3j. agrimonia, farnicula, canthum rub. garyoph. ana m. j. bellidis, herdes communi, hypericum ana p. j. sem. a. frigid. maior. (vt materia ad renes diuerteretur, tum ob calorem febrilem) ana 3j. coquantur in aqua comuni pro 3j. i. co-laturæ addendo syr. de end. mell. ros. col. ana 3j. misc. pro tribus dosibus matutinis. Ceterum putrefactione omenti ex sanguinis profusione magis accrescente, cum huic chirurgus iuniori incepto, quod ad vulneris curationem, soli non fiderem, accitus esset secundum chirurgus, Theodorus ille, qui Nisocomi præerat: & si euerque vulneri prouidebat. Verum cum sanies virulenta sanguinolentaque ac putrida e vulnere emaoaret, si venter aliquo modo premeretur; idco & nos 10. Decemb. die decoctum sequens propinari mandauimus: *R. rad. farnicula, echinor. ana 3j. capul. Ven. polyrichi, garyophyllat. summum-tum hyperic. ana m. ss. syr. card. p. j. herdes mundati p. j. canthum rub. m. j. vuar. pass. enucleat. 3j. ebulliant in aqua comuni, pro 3j. i. colat. adde syr. ex infus. ros. 3j. syr. de echinor. ana 3j. misc. pro duobus dosibus. 13. Decemb. iusfrascripta potiunculam præscripti: *R. cort. rad. echinor. dent. leonis sena p. trostiquir. rasa ana 3j. agrimonia, beem. capul. Ven. garyophyllat. farnicula, canthum ruborum, bellidis ana m. ss. bordei mundat. p. j. sem. a. frigid. maior. ana 3j. vuar. pass. enucleat. 3j. fiat decoctio in aqua comuni. pro lib. j. colatura addendo mellis ros. colati, syr. ex infus. 3j. (ad deterfionem) ana 3j. syr. de echinor. Nicol. cum rhah. 3j. misc. 3j. rhah. scitelli 3j. squinanthi 3j. species diuersæ abb. 3j. fiat puppula, quæ pēdcat in dicta decoct. sim expressio, dum*******

B

potio sumetur. Eodem tempore subinde, si opus esset, alui irritabamus glande, si minus molis esset. Sed ex vulnere olido, ab omento putrefacto, quod facile putrescit ac inflammatur. *ut Scholia sequens docemus*, virus exibat, & tandem sub pubem etiam in parte sinistra & regione vulneris intumuit totum abdomen sinistrum, cum maximo dolore & duritie: & ideo inungi illud mandauimus oleo lilialeo & chamo milino. Sed putrefacto omento facta est suppuratio in concavitate ventris in parte inferiori supra pubem. Decimo itaque sexto Decembris lenitum sequens exhibuimus: *Re. cassia mundata cum melle, dactylis coniunctis ana ʒij. diaprun lenitum ʒj. misce. exhibeatur cum cyathovino decoctionis superscriptæ. ex hoc quatuor secessus habuit, cum alleviatione: tamen post diem vnum atque alterum dolor per totum ventrem inferiorem auctus est: & ventris rota inferior regio nigrior facta est, tamquam esthiomenos accederet: tumorque durus erat: & a vulnere facta compressione ventris ab ima parte ad superna manibus deducendo, putredo sanguinolenta exibat, cum tanto fetore, ut in cadauero fieri affolet: quod autem etiam in parte inferiore ventris suppuratio fieret, id dolor vehementior & febris aucta indicabant. Ideo ad eandem iuvandam, & dolorem sedandum imperauimus, ut chirurgi ventri applicarent cataplasma sequens. *Re. rad. altheæ ʒij. fl. al. malvæ ʒij. fl. al. altheæ m. j. fl. al. meliloti m. j. fl. chamomilæ m. j. coquantur in aqua comuni ad molliorem, pulvis addit farinae hordei, farinae seminis lini ana p. j. olei chamomill. liliorum, hyssopi recentis ana q. liat**

27 cataplasma molle, secundum artem, & toti abdomini, præsertim in parte sinistra, applicabatur: idque multis diebus continuando atque reiterando. 22. die Decembris, pro materiaz putredinalis deterfione a vulnere, quæ tamquam a caduere olida emanabat, decoctum sequens per os dedimus. *Re. agrimoniz, capill. Pen. pentaphyll. caninum rub. garyophyllata, cerevisia ana m. j. hordii communis ad maiorem deterfionem) p. j. sem. cucumer. melonum, ana ʒss. fiat decoct. in aqua comuni ad ʒix. addit colaturæ syrup. ex infus. ros. ʒij. mellis ros. colat. syr. de echinor. Nocoli cum rhubar. ana ʒss. misce. pro tribus dosibus. Fuit illud apozema sæpe reiteratum: quo utebatur usque ad menslem Ianuarii anni 1663. Et cum putrefactio indies increveret, tandem facta est suppuratio in parte superiori, duobus digitis a vulnere, in latere eodem: & tandem ille per ruptus est abscessus, sine incisione, idque beneficio naturæ. erant & duo parua foramina circa vulnus: & imponebantur tentæ parvæ, quemadmodum & in vulnere, tinctæ in oleo hypericonis vulnerario, quod chirurgi ad manus habebant. Verum exiguum quid materiz ex illis foraminibus exibat, eaque corrupta, fetida, virulenta, ac sanguinolenta, si comprimerentur: & ita ad vulnus precipuum declinabat materia, eoque commodius compressione decenti ad-*

ministrata tandem ex vulnere ipso emanabat. Interim omentum magis indies putrescebat, materiamagis sese in concavitate venteris quoque recipiente, ad partem inferiorem decumbens, cum magna quadam duritie. Tandem per duas septimanas emplastro superscripto semper appposito, seu cataplasmate infra umbilicum & paulo supra pubem, facta quoque est suppuratio, & tumor ingens, ita ut consultum mihi videretur, ut ibidem fieret incisio ac apostematis, seu abscessus: verum cum nullus chirurgus id audeat attentare, ob virum debilitatem ipsius ægri, nec solum chirurgi qui hunc tractabant, sed nec alii, qui etiam raritatis gratia, ob calum mirabilem eundem iuviscebant, nempe Volckius, Florætius, & alii plurimi chirurgi Delphensis, cum omnes eundem pro deplorato haberent, neque audent aggre di incisionem: tandem per scriptum est apostema: & per paruum foramen exiit, materia valde sordida, virulenta, corrupta, saniosa, veluti fex sanguinis corrupta, in paruatamen quantitate, sed cum tanto fetore, ut in cubiculo ægri nemo perdurare posset. Emanabat autem quotidie talis materia: idque ultra sex septimanas: & quod mirum erat, chirurgi ipsa filamenta extrahabant omentum corruptum, quod valde pingue & foetidum erat, ita ut paulatim totum omentum per eiusmodi filamenta plane corruptum & olidum per vlcis foramen extraxerint: ita ut chirurgi qui præsentis erant, tum ego, miraremur, quomodo iuvenis ille superuivere posset, cum tantus fetor ex illo foramine inferiori intra pubem & umbilicum, simul etiam ex duobus aliis illis foraminibus paulo supra vulnus existentibus exiret: ita ut reliqua pars omenti, quæ ab incipio, chirurgus non abscissa erat, demum consumpta ac corrupta per foramen inferius exierit. Istis sic fe habentibus, ægrum, virum debilem & consumptum, victu resumptio ac restaurante nutrivimus. Per vulnus vero, cum syringa, pro abstersione illius saniei putridæ, quæ in concavitate ventris permanebat, decoctum agrimoniz & hordii commun. cum melle rosato inieciimus per aliquot dies: postea febre etiam cessante, decocto foliorum agrimoniz, in vino Rhemensi cum melle rosato ad plurimos dies vsi sumus. Similiter & decoctum hordii communis cum agrimoniz & melle rosato per os exhibuimus. Interim materia illa putrida ex vlcere circa pubem emanante, cum sinistra pars abdominis adhuc dura permaneret, emplastrum denuo superscriptum ad repus appodimus. Postea cum illud diuturnitate tædium pararet, ceratum illud descriptum a nobis obs. 24. de matæmæ duritie, lib. 17. quod chirurgi paratum habebant (emollit enim apostemata ad miraculum, & resoluat) cum diu appositum esset, durities paulatim cessavit: & materia fluxibilior reddita commodius emanabat tam per vulnus, quam per foramina vlcera: & continuando syringationes superscriptas, natura ipsa, quæ

omnem

omnem medicorum iudustriam superat, maluma bono legregavit: ita vt illa foramina superiora primo consolidata fuerint, deinde & vulnus ipsum: vltimo autem & vlcus sordidum in parte inferiori circa pubem existens repurgatum est, mox oculum, sinuifilula, de qua tamen plurimum metumus: sed superinducta cicatrice prorsus coactum est, & perfecte cooualuit nobis alisque omnibus, quid id viderunt, valde admirantibus: vt vere dicere possimus cum Hippocrate diuino, *Natura forti omnia esse possibilia*. Potenti enim virtuti nihil est difficile, vt quæ per ossis medium transmittit materiam abscessum gignentem, vt refert Galenus, lib. vi. t. aphor. 55. ideo mirari desistimus. Decubuerat autem hic per tres menses, & tandem ab omnibus pro deplorato habitus, sanus euasit, gratia diuina, ac nostra diligenti opera, per eum, qui omnes curat, ita vt si omento nunc viuat, etiam hoc tempore, anno 1568. cum hæc transcriberem, mense Nouembri, & quidem cōmodissime; magis quoque; tutus, vt ipse refert, quam gladiator ille, quem Galenus resibus ob hoc foueri voluit. Verū hic, quod miratur dignū est, oō magis se vult ab venteris fouet quam antea dum adhuc omentum habebat; nec frigore se affici dicit: optime comedit; & bene valuit in hoc vsque tempore, licet id ipsum, cum primo in publicum prodiret, pro miraculo haberetur, cum tan periculose decubuisse.

SCHOLIA.

QUAM pessime iunior ille chirurgus egerit, qui omentum per vulous propendens absciderat; id omnibus peritis medicis ac chirurgis doctis, in confesso habetur. Nam quauis omentum, si exciderit, necessarium (vt dicebat Hippocrates aphor. 58. lib. 6.) putrescat, absque tamē ligatōe abscidendi non debuerat. Quod optime Galenus, lib. 6. *Method. medicandi contra Thorsū & Method. docuit*, ita scribens. Quipresensum hi quoque rationales simpliciū animales partium curationem, vt qui ab instrumentaliū tanquam indicatōes fiant. Ceterum paucis etiamnum contra methodicos auditis, de istis qua in ventriculo accidere vulnerib. alio stylo conferemus. Vulneratio peritonæ excidia subinde omniū, quod primariū pars fū, an non primariū, vel ex quibus conditur, vel quam habent aitionem osomve, hi compertum non habent, itaq. cum linc, aut nigricat portio ea quæ excidit, hi quid faciāt, audiū est operatiōis: vt ratiōe præcīdēt, an intra peritonæum remiserint. Omniū n. vel ab ipsa experientia: quid agendum sit, intellegent, vel ab ipsa particula naturæ indicatōnem fuerint. Atque reserua huc utraq. eam quidam quam experientia suppleddt cognitionem, dum viderandam scilicet hoc scēla sūa nomen *Methodū* extolunt: eam vero quæ ex particula naturæ suggeritur, quod nec subtilitatem eum norant, nec aitionem, nec osom, dum a diffinitione ceu inuolu abhorrent. Idcirco nesciunt sine omento ex iū, quæ necessaria ad vitam sūt, an quæ necessaria quidem non sūt, montamen omniūo iussu nota, sed nec an cū eum afficiat

mul afficienda pars aliqua primariū sū, an secūda: addo quod nec sicut an vaserū quā in eo continentur, aliquod possit per sanguinis profusum hominē intermere: nec si quis post nigrū eum abscessum, quod integrum est, vinculo cōplectatur, quæ sanguinis profusum declinet, an id ipsum periculo vili sit futurū. Nam leui salū intus omentū neruissimū videtur. Proinde, nisi quis exacte naturā eum habeat compertam, nūm quā adebit vinculo tēni ac arteriū veniq. cōpositum sciamus, hōrū tamē inia ex maximis artib. arteriū tūm veniū intelligamus. Sanguinis itaq. quidem profusum canebimus; cōficiendū vero neruū non interueniū. Proinde id quod supra nigrū ai positi est, vinculo excipimus: quod post vnculū est, amputabimus: atq. vt in imo sūc iam comprehēsa gastrorrhaphia vnculū sūc pendeat, curabimus; quo neminem facile eas, eū ex vulnere suppurante euomentur, recipiamus. Hætenus Galenus. Id quod omnes alii quoque chirurgi posteriores faciunt, vt recte Ioannes de Vigo cap. 11. de vulneribus ventris & partium eius cū penetratiōe, in hoc modum docet: (Cū istō vulnere inquit, solus zorbū (id est, omentum) extra ventrem exire: quia facili causā corrumptur. Ait enim Hippocrates, cum egerat dū zorbū & vulnere, necessū est, vt putrescat, quod ex eo egredietur, licet extra locum paruo tempore morietur. Et hoc accidit velociori tempore, quam intellais & hepatis, si excē. vt cesariū Galenus commento aphor. 58. lib. 6. dicit. Hinc etiam Ioannes de Vigo ita inquit: *Quoniam inestina & extremū hepatis sinū remanent extra longo spacio, in tantum quod multum acerbemter infunduntur, cum ventrem ingreditur, satis cito ad propriam naturam reducentur: quod ita non, accidit de zorb.* Zorbū enim si siluādo extra vulnus paruo tempore morietur, amen necesse est, vt quod ex eo aer vel frigus attingit, ad ipsissimā putrefactionem perueniat. Quamobrem periti e chirurgi, si alimproperant ad incisionem illius. Modus autem remotionis zorbi alterati seu corrupti, est, vt legatur zorbū quam commodissime poterit fieri in loco sano sita ligatōe: deinde abscidatur tota incisione propaleaturam per digitum vnum. Deinde cauteri zorbū in loco incisionis ipsius vsq. ad ligaturam: & statim prius calidū panis molliū & assidū decem, semet insur reducatur: filum tamen extra vulnus relinquēdo, vt in tempore remotionis eschara extrahi valeat. Vigō itaq. Galenum sequitur. Quamquam autem Galenus ligatione absque cauterio vituit, vtrumque tamen vt fiat laudamus. Sed socius ille bonus noster chirurgus abscidit quidem cū omento, nec ligauit; vnde postea ægrum interfecisset, oisi beneficium orturæ ac diligenti nostra industria euasisset. ob febrem cōcomitantem putrefactioem, tūn alia symptomata illa grauissima ex putrefactione omēti; quod cum facile inflammatur, facile quoque putrescit, vt diximus; multo, magis ex sanguinis illa profusione. Hinc & Galeo de omento ad longū hoc modo ratiocinatur, lib. 4. de vsu partium, sic scribens. Vnde silu-

Omentum excidit ab scido non debet, sine ligatura.

Quomodo Zorbū ab aerē corruptum ligandus & abscidendus est.

Omenti
sibi nulla
ra.

etiam sua ingrossa natura propter hoc ipsum, scilicet ut calidior venter secundum anteriorem: generavitque et extendit per totum ventrem ipsum aliquod corpus densum sibi et leno, et calidum. Densum quidem, ut insinu concludat innatum caliditatem: leno autem, ut frangit et absque pressura caliditas: calidum autem (hoc quidem neque sermone videtur) quia tale oportuit esse gratia calefactionis factum. Sed si leno quidem sibi, et densum, compelluntque erat futurum, id membranosum oportebat existere. Quia enim alia immensior partem in animali tali corpore densior et lenior? Si vero calidum, vasa habere multa, scilicet vasa et arterias, et pinguedinem copiosam cum cum solum; quomodo quidem calida rursus, cognoscit et esse sensum ventrem in eo, velut oleo, videtur autem non minus et hoc, scilicet facilius eius inflammationem transmutatio, tamquam ad flammam naturam proxime accedat: nullum enim frigidum promitte comburitur. Et ubi iam manifestum, factum est sermone, vocatur iunior, hoc est omentum, ex duabus vocibus tunica densa et subtilibus sibi invicem superpositis, multus vero arterius, et venis, et pinguedine non pauca consistit. Quod autem calidius gratia factum sit, evidenter est discere in illis, in quibus vulneratum habentibus inspicimus, quod est abdomen, excidit omentum per vulnus: deinde lundum factum, ad necessitatem lesa partem impellit medicos. omnis enim frigidum sentimus ventrem, et minus concoquunt, et pluribus operimentis exterius, et omenti egent, et maxime quando insensu ac effluvia digna fuerit magnitudine, id quod abscessum est. Sic enim et nos id aliquando sibi cum abscessum illud gladiatori in vulnerato. Ille vero homo sanatus est cito, sed tamen adeo facile et paribatur, et labebatur a frigida externa, ut non sustineret nudum habere ventrem, sed latus undique involuebatur. Substitui autem cute et victoris texture, ut vocat, erat a principio hic gladiator, et secundum aliam partem, et secundum ventrem, et propterea, ut puto, cito infrigidabatur. Cur autem in homine hac particula ut plurimum accedat externa contra omnia intestina? An quia colligitur intestinum sine umbellissima, et pellicula mollissima, et nuda pilis, et omnino facile paribatur? An etiam neque in aliis animalibus ventris superaces sit, sed in eis quidem magis, in his autem minus extensum est contra intestina, pro cuiusque animalis natura? Hactenus Galenus, ex cuius verbis constat omenti natura atque structura; et quod facile inflammatur et putrescat, multoque facilius eorum abscessu, ut diximus, absque ligatione, unde et abscessus ille periculosus accessit. Ideo et vtile duximus et de omento et de peritonio disserere, antequam ad intestina descendere, cum quibus continentur. id, ideo membrum in homine adiposum est. Oritur id (inquit Aristoteles) de medio ventre, quia vultus futura deservitur. mediam igitur ventris partem et cuncta intestina complectitur: cuncta

autem arefe, aut humescit, simplici membrana speciem refert. Ceterum pingue est, ac alimentum plenum, cum per membrana densitatem sanguinem alimentum transmissum calidumque fuerit: idque pingue necesse est fieri: tenuissimum enim hoc est, et calore loci intus concoctum, pro carnis et sanguinis coagulatione, in adipem evadere necesse est, autem solum in aliquibus animalibus, ut in cane et bove. Omentum propterea hac ratione existit, ad cibum meliorem concoctionem, ut facilius celeriusque concoquatur: calor enim vum habet concoquendi: pingue autem calidum est, et omentum pingue est: itaque de medio ventre oritur, quoniam reliquam partem igitur infundit fover. Hæc de omento Aristoteles. Galenus omentum ipsum (ut paulo ante ostendimus) plane densum, leno ac pingue facit, ut gravitate aut asperitate intestina non lædat, utque eadem, et ventrem calefaciat, ex duabus tenuissimis membranis constat, arteriis et venis, dispersum multo intus adipe, pingue: vulneratos enim, quibus demta est omenti pars, difficillius cibos conficere videmus: unde et pluribus coopercimentis egent. Nam cutis per se mollis est, et nuda pilis: ob id omento pingui indiget. Hæc tamen Ægidius noster, quod in aliis heri non vidi, licet omento careat, frigus utcumque pari potest, forte quis densiori cute constat. Sed quod ad peritonium attinet, de eo hæc pauca adiungemus. Id membrum (inquit Galen.) partem ventris inferiorum sub præcordiis intrinsecus ambit, et intus cuncta colligit intestina. Diaphragma et ventris exteriores musculos ad expellenda viscera alioque: excrementa coadiuvat, et contra frigoris iniuriam ventrem et intestina cum aliis munit ac conservat, ac præterea constat, quod in feminis sola fere ea membrana partus onera gestat, quo plurimum in partitione intumitur. præter cain longa oratione et diuturna peritonium circa illa plurimum defatigatur; et ob eam causam declamatores concionatorumque, quibus illa defatigantur, ventralibus valde iuvantur. Adhuc intestinum cruciatus peritonio leuantur: 34 nam id ventum inclusum saepe vi sua alterutrumque propellit. Hoc autem vulnerato, facile vires eius percipiuntur: transverso enim supposito, et hæc eadem membrana, duabus veluti manibus, ad excrementa exoneranda premuntur intestina. Ceterum intestina continuo continet et adstringit peritonium, et regesto ad intestina calore concoctionem iuvat. Vario flumine contextum est, unde attrahit, continet, et excludit. idque frequentius per inferiora, diaphragmatis officio, sine quo roctus et vomitus movet, constringente nimirum inferiori peritonii parte. Ea autem membrana circa vmbilicum robustior est: sed ad utraque illa minus firma est; et ad inguina, ac demum ad spina finitur. Viscera eo modo cuncta, arterias, ac venas vniuersas circumligat, et cum septo transverso unitatem facit: una autem sui parte pubis

Omenti vel
litas in ani
mali.

Peritonei
officium.

Mysteria Ga
leni de gla
diatore.

33

*Peritonæi
sequitur.*

pubis & inguinum offibus, vesicæ, alioac mulierum locus adligatur. Iuxta inguina sepe ruptor, & bubonoclas efficit; aut in imum scrotum descendente omento, epiploclas caussas, aut intestinis labentibus enteroclas facit, & hydrooclas, cum humor scrotum implet, de quibus alias egimus. Peritonæum igitur contegit omnia hæc adiacentia, quæcunque infra septum transversum sita sunt, veluti operculum existens. Ex hac enim membrana (*ut nunc ostendimus*) animalibus multa cōmoda proueniunt, primo quod contegit, secundo, quod a superincumbentibus musculis viscera deducit, tertio, vt celerius aridi alimentis superuacua descendat, quarto, ne facile intestina ventriculusque inflentur; quinto, vt omnia infra discrimen ea membrana colligantur, atque ita illinātur, vt caro carni cohzreat, quædam tum & extrema membra cute vestiuntur, dein abdominis musculis. Hæc autem hic ad non & volumus de omento & peritonæo, cum ad chirurgiam maxime spectare videantur, ob vulnera quæ in eas membranas sepe infliguntur. Ceterum cū de prognosticis signis vulnerum hic agere ceperimus, etiam reliqua ad eandem materiam spectantia nunc proficiamus. Vulnera itaque, tum puncturæ, quæ in capite musculorum sunt, vbi nervi, tendones & ligamenta scilicet carne nudantur; item quæ tribus digitis a iunctura distant, & quæ prope tempora accepta sunt, magis ex parte vialis existere; quemadmodum & alibi de iuuenis illo diximus, qui lapide percussus in temporibus, mox obiit. Nervus vero & tendonis punctura, propter sensus vehementiā, & quoniam hæc pars principalis, id est, cerebro continetur, proxima est ad nervorum conuulsionem excitandā; ac tum præsertim, cum nihil extrorsum exspirat, obreecat cutis vulneris; vt Galenus annotauit in opusculo cui titulum fecit *Artem paruum*. Proinde huiusmodi pectus mortem accersit. Noxa enim quæ cerebro illata est, statim cōmunicatur organis respirationi seruientibus, *ut iam supra dictum est*. Quo circa quinto libro *Aphor.* scripsit Hippoc. *Conuulsio ex vulnere lethalis est*. Non quidem (*ut Galenus ait in Commento*) ex necessitate, sed admodum crebro; lethalis enim nomine hic, vt & in plerisque aliis aphorismis, vsus est Hippocrates pro periculosa, & ad mortem sæpius perducente. Finit autem ex vulneribus conuulsionis, siue spasmi, ratione subsequenti ea inflammationis, vbi nervosæ partes attigerit. Et primum quidem videntur conuelli, quæ ex directo sunt, partium inflammatione laborantium; deinde postquam & principium attigerit passio, ad totum exfeditur corpus. Membra autem particularia ex accepto vulnere iudicantur mortua, quando principes ac maiores venæ arteriæ quoque & ossa, quibus vitam, nutritionem, & fulcimentum accipiebant, penitus excisa sunt & destructa; incipiuntque hucscere aut nigrescere, mortis habitum induere, ac cadaueris formam repræsentare, non secus quam in

*Vulnera in
capite mus-
cularum.*

*Intemporis
Nervi & te-
ndonis pun-
ctura.*

*Spasmi ex
vulnere le-
thali, id est,
valde pericu-
losi.*

*Vulnera
membrorum
particulariū
quando sty-
morata.*

gangrena & sphacelo, vt videre est in excisione brachiorū & tibiarum. Iudicatur itidem membra ad vsum a natura instituta fore incepta, & perpetuo impotentia, quando nervi, tendones, & ligamenta (quos Græci *συνδεσμοι* vocant) penitus sunt abscissi & destructi, suamque protinus actionem perdunt, ac resiccati & tabescere incipiunt. Vulnera ea omnium mitissima sunt; & omnino (*ut vocant*) sanabilia, quæ in euchaemis ad est, boni lucci corporibus, & in locis carnositate accepta sunt, vbi & nervi pauci, & venæ, & arteriæ non multæ reperiuntur. Ad hæc quæ diuisionis magnitudinem non habent, hoc est, lōgitudinem, latitudinem, ac profunditatem non multam. Periculū enim facit vulnus, quodcumque magnum est. Ratio autem, ob quam hæc vulnera tutiorem habent curationem, omniumque minime formidanda sunt, est quoniam ea nec febris, nec prorsus aliqua symptomata sequi consueverunt, modo saltem recte, & vt res ex postulat, tractentur. Ex ideo in exemplū § 36 primo attulimus de vulnere in nate a rustico perperam chirurgiam faciente male curato, non difficile fuit iudicare, quod ipsius incuria potius quam vulneris malignitate mortem obierit puer ille vulneratus. Quo circa recte ac prudenter feceris, si in tuis remunerationibus, seu (*ut dicunt*) depositionibus hoc præfuit fuerit; utque etiam addideris, Dummodo nihil aliud superuenierit, quod nec in presentiarum appareat, nec in talibus cadere solet. Vulnera autem, quæ vt plurimum sanabilia dicuntur, mediamque inter duo dicta extrema nempe & omnino sanabilia, & necessitate lethalia naturam sortiuntur, ea sunt quæ in ejiectis musculorum carnosorum longè iunctura & temporibus sunt; item quæ in calvaria, quæ Græci *εγχείρησις* nominant, thorace, & ventre incidunt. Hæc nō sicut atque ex ore trahuntur, adhibeturque diligens cura, & laborans obedientem se præstiterit, in nulla propemodum re indulgens propriæ voluptati, ac præcreta exteriora omnia ite sunt apparsa, curationem indubie recipere possunt. Si vero in his peccatum sit, eorum curatione maiori dati aut intercipi contingit, hominemque vulneratum tandem ad interitum miserrime deduci. Proinde cum de illia ferre iudicium voveris, huius rei mentionem, vt nomini tuo & ex illi rationi bene cōsulas, & tacere oportet, sed hæc ex multis quæ nunc clausa

*Vulnera
quando nō
sunt imple-
ta, imple-
ta.*

*Vulnera tu-
mores en-
terici, &
peritonæi.*

Cern. Cal.

*Vulnera
vt
plurimum
sanabilia.*

OBSERVATIO VIII.

De vulnere ventris seu abdominis, ad interiora penetrante.

MENS I Junio anno 1548. iuuenis quidam annorum nouemdecim, robustus admodum & validus, in Schaga pago habitans, vulneratus fuit in ventre sub umbilico, iectu ad interiora penetrante. Ad quem accitus sum statim ab asinibus; nam ipsi inctuebant intestina excelsa,

toque; m'gis, quod paulo ante hoc tempus, Maio nempe mense, alius in eodem loco vulneratus subito exspirauerat, chirurgus tamē promittente sanitatem: erat autem ille chirurgus Gusbertus nomine, senior quidem, si bene memini. At nostro chirurgi, qui huius iuuenis, de quo nunc
 27 loquor, curationi praeerat, Ludolphus nomen erat, sed is nimium gloriosus, ut huius patris chirurgi (quamvis plerumque linguarum imperitus) esse solent, statim in primo meo accessu amicos affantes obiurgare cepit, cur isli me vocassent, cum is tam bene atque ego (sic loquebatur) vulnerato stercore, si opus esset, commouere sciret, tamquam hoc solum medici officium esset, & nullam aliam opem vulneratis afferre posset, aut aliud consilium dare: & proinde id solum prestare posset indoctus ille alazon barbitonsor, qui chirurgi munus exercebat, ut nimisquam iactabundis verbis proclamabat. Cui ego, falsis illius verbis oon commotus, placide respondi: *Amice, quid ad te, quod isli me vocarint ad vulneratum iuuenem, cum in totum nomine honorariam censui mei mercedem persoluitur mihi non fiat. Interim tamen hoc mihi explicato, quid tibi videatur de vulnere esse, numquid laesum aut punctura ipsa ad intestina usque pervenerit, ac ea confissa aut perforata, aut tenetur saltem perstricula sint, nec ne? nam hoc praecipue cognita necessaria ego esse puto, antequam remedia vlla adhibeantur, ne nobis eveniat, quod prius socio iuxta chirurgi emenerit, cum haud dissimili casus sit. Atque parum tibi constans, modo dicebat intestina laesa, modo illesa, ut non minus dubius quam perplexus esset, ac quid certo statueret, dicere non poterit. Cui ego denuo locutus, & paulo acerbius hominem adortus fuisti: Tu modo mentionem fecisti de stercore, ut facias utrum vulnus stercore sit, nec ne? Hoc enim est quod nos docet Galenus lib. 1. de loc. aff. circa principium ita scribens: Si vena per vulnus exeat, vesicam fuisse vulneratam ostendit, quemadmodum ubi stercus per vulnus excedit, intestinum alicui vulnus esse situm, haud dubium est. Sic etiam cum cibis egreditur, in ventri-*

38 culo vulnus esse, manifestum est. Sic & urinum supra signum parum ac suppuratum cum medicis videret, ex incisione illa stercus subsequens, in collo abscissum esse declaravit, &c. Tu itaque, si stercus & vulnere egredere videris, quid adhuc dubitas intestinum vulneratum fuisse? Respondit, vulneratum post vulnus infusum, nondum ventris fabricam disposuisse. Cui iterum respondi: Tu itaque offas vulnus, velentiam ipsam (sen linamentum) quomodo vulnere infusum, numquid stercus oleat, nec ne, id enim neque medico, neque chirurgi ignominiosum esse debet, cum hoc modo in cognoscendo mali ducatur, & deinde commodum agrum curare possit. Is igitur dictis nostris obtemperans, & Paulo modestior factus, ac robore suffusus, & astantium auctoritate permotus, qui ipsum monebant, ut medici consilio aliquo modo auscultaret, vultus iptum primo ol-

fecit, ac tentam ipsam naribus admouit, quam & ego similiter olfeci: quae cum nec stercus, nec eiusmodi quippiam, imo nec ingratum quicquam aut odium in se haberet, ab ea hora inter me & chirurgum magna intervenit concordia; & indissolubilis amicitia, ita ut deinde post multos annos frequentissime me in curam vulneratorum suorum non solum admiserit, sed vitro vocari mandauit. Tunc tandem inspicies lotium, quod minime tinctum erat, tum pullum explorans, quem aequalem inveni, agrum nulla febre occupari iudicavi, ac eundem optime de salute sperare iussi, animumque addidi, dicens: si modo mihi ac chirurgi monitus obedire velles, ipsum cussissime primum recuperatorem sanaveris. Glandem igitur iniicete iussi; qua optime album reddidit; nec ipsa excrementa sanguinolenta erant: unde & certiores quoque facti sumus intestina minime laesa esse. Deinde die sequenti, cum excrementa adhuc duriora essent, hoc pharmacum sequens eidem propinquimus: R. cassiae ceroster extralla ℥j. pul. rhubarb. elect. murena ana 3℔. fiat bolus; quem duoravit, & ex eo ter probe alium deposuit, & cepit optime habere: iociter bis in die capitabat ex hoc decocto sequenti: R. canthum rub. betonica. ag. imoria, fenicula, consilida utrinque, valeriana, hyperici, sanguinaria, pimpinella, herba roberti, psali leonius, seu fenicula maioris, bugla ana m. ʒ. iad. feniculi ℥j. rubia similis ℥ss. fiat omnium decoctio in aqua simplici, pro lib. ij. stentque supra herbas per noctem: deinde fiat foris expressio; colaturae addendo mellis rosacei ℥j. miscet; & fiat portio vulneraria, in qua haec puppa sequens suspendatur, exprimens dum potio sumetur. R. murena, spermatis ana 3℔. trechyl. alchabeng sine opio ʒj. mil. cin. momi, nucis muscatae, macerata ana ʒss. crassius pulverizatur, & ligentur in puppalinica rata. Quae portio vulneraria cum vix vltus esset per vi vel vii. dies, adhibitis remediis exterius confectus per chirurgum, vultus optime consolidatum est, magno cum nostro honore, & iuuenis sanus perfecte factus est.

S C H O L I A.

Hic sciendum est, quod non est semper necessarium intestinis laesi, ut stercus per vulnus exeat: nam ex intestinis gracilibus laesi minime exit, ut egregie docet Amatus cenus in i. curat. 67. sic referens: Archetellum Pauli tertii Pontificis, vir, qui ob raritatem eius detentus in precibus habebatur, quem apud Vanciam agere, coisse per fissum suum inter umbilicam, & ventriculi affuerat, hoc est, ab vtero late ad aliud, adeo ut ab utroque latere vulnus orificia magna apparerent, per quae intestina gracilia exierunt, ad quae cum chirurgi accesserint, vntu intestina redierunt, quae illesa esse dicebant, quia nullum inde stercus exierat ac sic cuius vulnera fuerant, ab utroque parte orificia non dimittentur; ut quorum singula linamenta in melle-

Signa intestini
 signa gra-
 culi vulner-
 ratorum.

melle-

*Stomachi in-
flama p^{re}se-
ntes.*

40
*Ex gracilib.
Intestini la-
te, cum ster-
cus in hunc
fit, exire po-
test.*

*Vulnera ex
tra cutem
da sunt.*

*Formula se-
rui indi-
cium de vul-
neris ex-
pecta.*

Aphor. 1.

mittebant. *Sequenti vero die obiit. Eius cadaver dis-*
secari fecimus, & stomachi infimam partem incisam
et inspectam. (Acutebant hoc Chirurgi, in hoc quod
dicebant intestina laesa non esse, quia inde sterces non
exierat, quia si intestina gracilia laesa & incisa fuissent,
non inde per ea sterces emitti necessarium esset, quia in
intestinis gracilib. sterces nullum reperitur: sunt enim
viae dediti bonis chyli, ex quib. melsarica & huiusmodi venae
ad secum alimentum trahunt: vnde Auicennam in
hac re hallucinari, qui sterces formam substan-
tialem in stomacho recipere contendit, certum
est, quem quoque sequuti sunt eius enarratores,
praecipue Iacobus Forliuensis, ac Alexander Be-
nedictus: veluti Beante eos Cornelius Celsus. Ceter-
um occurrit dubium non vulgare in praesenti, An
ventris vulnus a ex toto debeat sui, vel potius in illis
orificiis aliquod sit relinquendum? cui respondet Pe-
trus ab Argelata, non infelix chirurgus, quod ex
toto ventris vulnus debeat sui: quia aliter intestina
multo alterarentur. Sed dicit forte aliquis, Imo op-
positum agendum videtur: quia si non aliquod orificium ibi
maneat, sanguis concretus abfcessum faceret. Re-
spondet Argelata, ventris partem esse exsanguem, & qd
periculum illius sanguinem natura ad emunctoria e-
mittere poterit, & eo magis, si a medico cum medica-
mentis sanguinem dissoluens, aduina fuerit, inter qua
ea quibus leprosi in palam obuires. Sed de curatione
vulnerum potius: nunc n. de prognosticis signis
sermo noster est. Et ideo, si coactius fueris a ma-
gistratu super aliquo vulnere fectum ferre, e-
iusq; euentum, quantum eis permittit, praedicere,
in primis (et etiam docet Tagantius) annotandum
tibi est, in schedis tuo chirographo obsignandis,
quod ex mandato ipsius magistratus, vulneratum
inuiseris, & vulnus seu vulnera omnia, si plura fu-
erint, diligenter & accurate inspexeris. Deinde
vulnus aut vulnera: nomi. re expresso ac prop-
rio, vna cu affectu loco exprimere d. bes. Pulstre-
mum tuz censurę causam, ac iudicii per te lati, ratione
te subicere oportet. At vero interim te admoni-
tum velim, ne iudicium tuum in hac re precipites, sed
mature, prudenter, ac circumspecte omnia definias.
Quandoquidē (vt ait ille) omne in praecipis vitium
sternit. Et vt a seniore illo Hippocrate, medicę artis
primario auctore scriptum est, iudicium est diffi-
cile. Itaq; tamen si terminus vltimus vulnere sit
quadragessimus dies, primus vero intra septē dies
consistat, & medicus iuxta formam & naturam a-
cutorum morborum, ad decimum quartum pro-
tendatur: in suspectis nihilominus ac dubiis vul-
neribus expectandus est dies septimus, priusquā
aliquid de illis decernas ac iudices. Solent enim
vt plurimum intra id tempus apparere acciden-
tia tum bona tum mala, qd post accepta talia vul-
nora superuenire consueverunt, febris, inquam,
syncope, mensis alteratio, ac perturbatio, spasmi &
id genus alia. Sed et interim diligenter considera-
da sunt virtutum actiones ex pulsa, vomina, &
mutuambus: & aliis id genus, quae foras excer-
nuntur. Contemplari etiam oportet labo-
rantis appetentiam, tolerantiam, vultum sine asse-
ctum & faciem, & cōsimilia. Ex his itaq; & con-

similibus praesagiis, quae ab Hippocrate & Gale-
no memoriae prodita sunt, diligenter perpen-
sis & examinatis, robur virtutis, morbi magni-
tudi-
dini conferes. Deinde tacitus apud te omnia
recolliges, vt praesagire possis, ac iudicium ferre,
num moriturus si aeger ex accepto vulnere, an
tandem conualliturus. Qua in re caute ac pru-
denter te geres. Nec est quod dicas, si non fuisset
vulneratum, numquam intersisset, quantumvis in vo-
luntate peccasset. Sed nec satis fuerit, si dixeris,
vulneratum mortem numquam obtinuerunt fuisse, si
sibi confidisset, ac omnia effecisset secundum ratio-
nem: scriptumq; esse ab Hippoc. Aphor. 1. quod
non solum medicum praestare se oportet oportuna
faciem, sed & aegrum & assidentem, &c. Quan-
doquidem nō solum famz tuae cōsulare, & te ab
obloquendum calumnia vindicare debes, sed
nihil etiam vel dicere coram magistratu, vel scri-
pto annotare, aut renuntiare, qd cedat in damnum
vel detrimentum laborantis & con sanguineorum,
aut liberorū eius, culpā omnē sic in cū reiciendo.
Eorū namq; qd fortuito cōtingunt, tamen si nulla
sit praeservatrix, est tamen ars aliqua curatrix. Si
quidem vt variis periculis nostra corpora expo-
sita sunt, ita & modis plurimis, vbi in ea incide-
rint, seruari possunt. Itaq; vt scribit Auicenna lib. 1.
de extract. f. 1. 1. 1. licet vulnera quaedam sua
natura lethalia sint, non tamē ob id relinquendus
est vulneratus absq; auxiliis, quin omnia aggredi
ac tentare debet chirurgus, quae ex arte & lecun-
dū rationem fieri possunt, dummodo saltem ab
assidentibus amicis & cō sanguineis ipsius & gro-
tantis obnix rogatus fuerit, ac de futuro rei ex-
itu corā eis, antequam vulneratum attingat, praes-
gauerit, vt se ab indoctorum & obloquutorum
calumnia & maledicentia defendat. Pleriq; enim
præter spem medicorū, modo quodam mirabili
ac stupendo, morte interdum euadunt, ac sanita-
ti restituntur. Igitur cū saepe etiā præter ex-
pectationem quædam cūeniant, curatio aggredienda
est. Quod si vulneratum ipsum omni auxilio desti-
tutum relinquere mus, & inde mors sequeretur,
impii ac inhumani merito & diceremur & ha-
beremur. Sed his omisiss, reliqua vulnere in-
dicia perliquamur. Igitur præter hæc te nolle
oportet, quod vnio in paribus instrumenta-
ris semel continui diuortium perpessus, est im-
possibilis, vt Galenus asserit lib. 1. de cap. 1. 1. 1.
Cuius assertionis ratio est, quia abscissi omnino
poris, seu meatibus, venis inquam, neruis, & ar-
terius, per quos veluti per canales quosdam, ali-
mentum, sensus, & vita in ipsum membrum or-
ganicum diffundebatur, promissimē expirant,
exhalantue tum spiritus, tum virtutes, ob sub-
stantiæ scilicet quam habent, tenuitatem, (quod
non contingit in animalibus nisi quia imperfecta vo-
cuntur, & quae etiam in plantis ipsi) non autem
propter impotentiam, aut repugnantiam me-
dicamentorum, vt recte asseruerat Haly. in Com-
mentario loci nuper ex Galeno citati. Adhæc vnio
in parte carnea possibilis est, etiam iuxta primā
intentionē, vt dicunt in osse vero ex secunda dun-

*Vulnera
non sunt re-
linquendi
absq; auxi-*

*Plurima in
morbus præ-
ter actua-
tione cau-
santur.*

Vnio in par-
tibus organi-
cis semel di-
uisa est im-
possibilis.

taxat intentione. Vocatur autem hic prima intentio, quando partes diuise, atque iniuicem distantes, rursus vniuntur, & coalescunt, vt prius vnitz erant idque absque medio heterogeneo, sed ratione quadam ac beneficio nutrimenti, facta scilicet modica quadam conuersione ipsius alimenti in catnem omnino vniiformem & consimilem priori. Secunda vero intentio hic intelligitur, quando ea, quæ diuila sunt, & vnionis diuortium perpeffa, alia quapiam interueniente substantia, seu glutino quodam alligantur, atque iniuicem coniunguntur. Porro huiusmodi medium, cuius interuentu partes ossis fracti seu diuisi adalligantur agglutinanturque, Latine *Callos*, Græce vero *porus sarcoides* nominatur: qui quidem ex succo paulo crassiore fit, quam is ex quo os conerefcit. Causa autem, propter quam fractum os nequeat coalescere, prima saltem intentione, est ipsius ossis durities, cum mollium tantum corporum (vt *Galenus ait*) in vnum coeundi sit habitus; vt tum in externis videre licet, nullo nec lapide eum lapide, nec testa cum testa coeunte; tum vero in nobis ipsis. Ridendus igitur erat ille Empiricus, qui cum rustici lotio ad nos veniebat, cum Alcmæriz adhuc habitaret; atque admodum glorioso, sed prorsus inepte iactabat eoram omnibus, præsertim hominibus rusticis & idiotis, se potantem vulneraria habere, quæ etiam si pariter vni oblata esset, eam poterat consolidare. Cui ego ridendo dixi: Stulte, id tu iusticia persuaderis: mihi nunquam persuaderis, scienti quod ei consolidari non possit, sed in eius loco callos fieri potest, non tamen hoc modo vt tu inepte garris, et id foci integrum abscessum esset. Sed omisso eiusmodi imperito impostore, altera causa est quod os coalescere nequeat, imbecillitas fasciæ talis alteratitica, quæ alitrix nuncupatur (iste enim articulus sunt exsangues ac frigidi) non autem inopia materiæ seminalis, spermaticæ, vt quidam putauerint, ac vt etiam sentit Tagantius. Ossa namque præsens semper habent alimentum spermaticum, quod quidem iterant & in suam coeunt ut substantiam, ac sibi assimilant. Nervi autem, venæ & arteriæ (inquit *Auicenna*, *Galenus auctoritate fretus in s. Therapœut.*) medium fortiuntur naturam inter carnem & ossa. Neque enim tam facile coeunt vt caro; neque tam difficulter conglutinantur vt ossa. Siquidem eorum natura medicoritate obtinet inter mollium & duricem. Proinde de vnienda eorum sectione, vique de sperandum non est, vbi tum ipsa sit patua, tum hominis corpus natura molle. Si vero sectio magna fuerit, & in duro corpore, nulla prorsus eius glutinandi spes est. Vnde *Galenus loco supra citato* adhuc modum ait: *Videretur autem, experientia quoque ipsa rationis subscribere.* Cum & in pueris & in mulieribus, propter corporum humiditatem & molliorem, eam (arteriam intellige) viderim glutinari; & in viro iuvene agrestis, cui paululum erat incisæ. Quia autem eam

inciderat, inquit ille, medicus admodum iuuenis erat, & operum artis parum peritus; venam enim se incidisse putabat: nam cum brachium hominis, venam incisurus deligasset, contigit attolli veluti in gibbum arteriam: atque ita hanc pro vena diuisit. Hanc autem incisionem *Galenus* coriole coniunxit, conglutinavit & perfecit. Verum brevis sane (vt dictum est) incisio erat. Quod si vtique magna atque effatu digna fuisset, nulla certe ratione perferari potuisset. Quod *Hippocratis* testimonio confirmatur, sexto Aphorismorum decimonono sic inquitur: *Cum difficillime fieret os, aut carillago, vel neruum, aut gena particula tenuis, vel præputium, neq. ang. uer. neq. coalescit: hoc est, neq. talis aliqua regeritur substantia, qualis abscessus est, neque vniquam diffusa corporis labra agglutinantur.* In hoc autem aphorismo, vox *difficillime*, diuisionis magnitudinem significat. Difficilia namque (vt ait *Galenus in commentis*) diuisione habent vsq. ad finem peruenientem. Ceterum nihil aduersus prædicta pignat obicere, quæ de ossibus puerorum adferri possent, quod scilicet coalescere possunt, vt lib. art. medicinalis *Galadri* inquit, quia molliora habent & virtutis robur, ob propinquitatem suæ natiuitatis. Sed nec prius asserta infirmat, quod de dentibus obici sciet, quod scilicet renascantur, non solum in pueritia, sed etiam in aliis ætatibus. Quo nam non generantur (inquit *Alibertus*) ex materia ordinata, sed ex superfluitate, non quidem a virtute prima conformatrice, sed nutritoria, inducente actum generatiua. Postremo indicat *Hippoc.* lib. aphorismorum, quod vulnera in corpore eorum, qui aqua intercutem labrant, non facile sanantur. Non prius enim curantur vulnera aut vlcera, quam ad cicatricem perducantur. Non possunt autem ad cicatricem perducere, nisi sufficienter exsiccantur: quod non facili facile est in iis, quos aqua intercutem male habet, ob humiditatis immoderantiam, vt docuit *Hippocrates* in lib. de vlcerebus: & *Auicenna* his verbis: *Solent contenti vlcera, & id genus alia, facile ac cito curantem accipiunt, cum in particulis sunt, quæ bona prædita sunt temperatio: contra vero, si membris a cacochymia occupauerint, plus in eis remittuntur curationi, nec nisi tempore longo possunt ad sanitatem perducere.* Sed multo adhuc difficilius curantur, quando corporibus eorum incidunt, qui vel hydrope laborant, vel lepra (id est, elephantiasis) aut aliqua alia praua temperatura. Præterea in quinto aphorismo *Hippoc.* sic ait: *Vlcereb. frigidum quidem mordax, eorum obdura ac, dolorem insupportabilem facit, inuicem obdura, frigora fibrilis, contraxiones, distensionem.* Adhæc insignes cœtui solutiones male curatæ, præsertim circa iuncturam, maciem inducunt sequenti particula. Et hoc quidem, propter obstructionem, & virtutis debilitatem, vt iam semel dictum est, & infra adhuc dicetur. Plurima adhuc aha iudicia diligenti animaduersione obseruanda sunt, quæ etiam de vlcerebus communia sunt. Itaque finem tractationi de iudiciis

Callos, porus sarcoides.

Quæ si fractum non consolidat.

43

Nervi, vena & arteria, si ipsa aut diuisa interducat eorum.

Difficilis quæ diuinitur.

44
Ossa puerorum si facile consolidantur.

Alimentum

Vulnera bydroperorum non facile sanantur.

Maris particula ex vlcere quo modo fit.

Arteriam incisam aliquid quando vniunt.

Lib. 1.
De vul-
nera miora
ha sunt vel
se.

Lib. 2.
De vul-
nera miora
ha sunt vel
se.

Periculosa
vulnera.

Malum
vulnus.

Qua vul-
nera miora
ha sunt vel
se.

dicis vulnerum imponamus, si quæ de his doctæ, breuiter atque ornate scripsit Celsus, subiecerimus: *Serrarius*, inquit, nō potest, cui *basiteretur*, cui cor, cui stomachus, cui iecur in porta, cui in spina medulla perueniret: cuiq; aut pulmo medius, aut iecur, aut renus in iugum, aut ventriculus, aut septum transversum vulnerat; cuiq; circa faucem grande vena, vel arteria præfusa. Vix autem ad sanitatē perueniunt, quibus vlla parte pulmo aut iecur in crassum (quod Græce *μυελος* vocant) aut membrana, quæ continet cerebrum, aut lienis, aut vultus, aut vesica, aut vllum intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Hi quoque in præcipiti sunt, in quibus vsque ad grandes, intusque conditas venas in alis, vel poplitibus mucro defodi: Periculosa etiam vulnera sunt, vbi cunctæ venæ in vires sunt; quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt. Id quod euenit non in aliis tantum, atque poplitibus, sed etiam in his venis, quæ ad anum testiculofque perueniunt. Præter hæc malum vulnus est, quod cunctæ in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vuln articulis, vel inter digitos est; item quodcunque musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem læsit. Tutissimum omnium, quod in carne est: & hæc quidem loco vel peiora, vel meliora sunt. Modo periculum facit, quodcumque magnum est. Hæc tamen de iudiciis vulnerum: quæ etiam manifesta eadem exēplis iam subseribendis. Quare ad vniuersalem vulnerum curationem nunc properemus.

OBSERVATIO IX.

De signis vulneris infixi extrahenda.

QUOD si sagitta vulnere infixæ esset, chirurgus decoret radicem vinicula cum vino, & misceat eum succo rad. ranae & mellis: & egregie iuuabat. Quemadmodum alius anagallidem tritā & mixtam cum succo rad. ranae & mellis imponit: quo emplastro attractiuo commode utebatur ad sagittas tum spinas educendas. Alius sequenti utebatur: *R. fermenti, mellis ana ʒ. ss. rad. narcissi ʒ. ss. vini ana ʒ. ss. acervus veteris sine sale ʒ. ss. sili ana ʒ. ss. si in fixum erat ferrum, addidit ʒ. ss. magnæ subtilissimæ pulueris.* Quidam & ammoniacum & rad. ranae tritum, & rad. narcissi cum melle vena apponebat. Vel *R. fermenti, mellis ana ʒ. v. visci quercus ʒ. j. ammoniaci dissoluti in aq. fannæ ʒ. j. ol. anagalli qd. misce.* Vel *R. ammoniaci, & albi dissoluti in aceto ana ʒ. v. visci querc. ʒ. ss. fermenti ʒ. ss. simul misceto.* Aut *R. rad. lilii coctam in meliceto, & medullam feruentis: mel & axungiam veterem simul commisceat: & si ferrum adhuc in hæret vulnere, adde puluerem magnetis. Vel fiat hoc exempl. *R. pul. magnetis ʒ. ss. oculorum hirund. ʒ. iij. aristolochia longa & rotunda capiti lacertorum ana ʒ. j. mellis ʒ. iij. ex his fiat emplastrum Radix populi quercus trita, & optime incorporata cum vino maluæ, vel a. to potenti superposita extrahit etiam sagittas & alia infixa.**

SCHOLIA.

OMNIUM solutionum continuitatis, nemum vulneris, communis quidem curandi indicatio, est vnio, vt Galenus ait *lib. 1. art. med. cap. 90.* Et ea quidem est prima indicatio, omnibus nota, ab essentia ipsius affectus desumpta, quæ præcipit, atque insinuat, contrarium per lumen contrarium propellendum esse. Hæc autem prima ac generalis indicatio perficitur a duobus, nempe a natura, tamquam a præcipuo agente & causa effectrice, adiuta suis virtutibus, & alimento conuenienti: & a medico tamquam ipsius naturæ ministro, quatuor intentiones sibi iniucem (quod dicitur) labalternatas in animo habente, dum opus suum exercet, vt curationis finem propositum tandem assequatur. *Prima* iubet (inquit *Tagantius*, quem & nos hic sequemur, cum ex omnibus collecta, methodo optima disponat) extrinsecus incidenda (si qua forsitan labris vlcis intercidant) amouenda esse. *Secunda* præcipit applicanda seu coniungenda (si extrema distantium partium. *Tertia*, docet ea in vnum iam commissa, & coacta, ita conseruare. *Quarta*, suadet ipsam partis læsæ substantiam tueri, ac salubrem seruare. His, & quæ nos non absurde superadi potest, quæ docet incidenda vulneribus succedere consuevit, corrigere ac propulsare. Primam intentionem curandi quam & *Tagantius*, sicuti & *supradicti* omnes attentiones, mutant ex *Guidone* assequemur, delatando vulnus, si non satis dehiscat, aut si eius labris aliquid intercidat extraneum, vt puta vel ossis particula aliqua pungens, & aspera; aut telum aliquid infixum, vel sagitta, vel mucro, vel aliquid aliud extrinsecus incidens, cuiusmodi sit spina, vel aruudo. Atque vbi satis diuulsa sint vulneris labra, digitis aut vossella, vel forcipe, aut alio id genus instrumento a te, vt res exposult, excogitato, quod infixum, aut labris vlcis intercidat, apprehendi debet, & leniter, ac (si fieri possit) citra dolorem euelli, vt in sequenti dōcebitur. Vt autem sagittas, plumbeas glandes, & globos ferreos, ac alia cuiuscunque generis tela vulneri ipsi profundius infixæ, aut artius inherencia, secundum rectæ rationis ductum, & ex arte possis eximere, inueniendum tibi primum est, quo instrumento id quam commodissime, quam citissime, & quam minimo dolore aut periculo possis efficere. Verus autem modus inueniendi talia instrumenta, habetur ex contemplatione naturæ ac diuersitatis tum læsæ in particulari, tum rerum defixarum. Itaq; ex horum duorum, partis scilicet læsæ, & rerum defixarum seu infixarum accurata consideratione & cognitione, tertium statim se offert: nempe modus euellendi tela in corpus infixæ: qui certe varius & multiplex est, nec certo describi potest, vt dicebat *Guido*. Ceterum infixarum rerum ac telorum tamen discrimina seu differentie, propemodum sint infinitæ, nec scriptis facile mandari possint (proinde & formæ præiicienda, ad hoslib.

De curatio-
ne vulneris
in vniuerso
sum.

Communis
sola vni-
ta curatio
di indicatio.

Intentiones
in curando
vulneribus
obseruando.

Prima in-
tentio.

De sagittis,
glandibus
plumbeis, &
globis ferreis
ac quibus-
cunque aliis
rebus, a corpo-
re vulnerato
extrahendis.
Instrumenta
ad vni-
onem vni-
ta.

Modus
inueniendi
instrumenta
ad vni-
onem vni-
ta.

Modus
inueniendi
instrumenta
ad vni-
onem vni-
ta.

*Sic telorum
differentia.*

*A materia
sumta diffe-
rentia.*

A figura.

*Spic ulato-
rum telorum
differentia.*

*Telorum dif-
ferentia,
sumta a ma-
gitudine
Numerus.*

Habitus.

Virus.

*Octo instru-
menta tela
atque infixa
alio rebus
extrahenda
accusmoda.*

telorum diligenter a chirurgus perquirere debet. Autem tamen conatur eas omnes differen-
tias ad octo reducere. Has autem senario numero
Tagantius etiam ex Guidone cōplectitur. Ita-
que differunt *tela*, quae nostris corporibus infi-
guntur, materia, figura, magnitudine, numero,
habitu, viribus. *Materia* quidem, quatenus ea
quae imponuntur & haustilia vocantur, aut lignea
sunt, aut ardua, aut flannea, aut plumbea; vel cor-
nea, vitrea; & quandoque etiam ossea; quoniam etiam
arundinea aut lignea conspiciuntur. Figura au-
tem evanit, quatenus alia sunt rotunda, alia
angulosa, nempe triangula, alia fulcata, alia tri-
sulca, hoc est, tribus ex partibus acie praedita.
Nonnulla item sunt spiculata, seu spiculis cineta,
quae vulgo barbulae vocantur; nonnulla spiculis
carent. Atque ea spiculatis, haec posteriora spe-
ciantibus seu retro vergentibus spiculis munita
sunt, ut dum extrahuntur, e contra defigantur:
illa in anteriora vergentia habere spicula, ut pro-
pulsata idem faciant, hoc est, insigantur, & laniet.
Sunt etiam quaedam, quibus utroque versum, ful-
minis instat, spicula exsistit, ut & dum extrahun-
tur, & dum intruduntur propellenturque, cor-
pus dilanient, & in obiecta insigantur. Sunt
item quibus ferrum quibuscumque cardinibus seu
verticulis ita mouetur, ut spicula in impulsione
contracta, in extractione explicantur, atque ita
telum extrahi prohibent. His annuere posse-
mus: ferrum illa triangularia acuta, quae furibus
hortorum clanculo sub herbis latenter obiciunt,
& equis in militia, ac murices appellantur. Ma-
gnitudine quoque variant tela, quatenus alia ma-
gna sunt, ut trium digitorum longitudinem ex-
pleant: alia parva, ut vni digiti longitudo; alia
vero medium inter haec locum occupent. Nu-
merus etiam in his diversitatem adfert, quate-
nus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita.
Totaque siquidem quaedam ferramenta, siue
ferrea frustula ipsis imponuntur, ac si innexa
sint, ut in teli evulsione facile lateant, & in imo
relinquantur. *Habitus* differunt tela, quatenus a
lia ferrum acutum ligno seu haustilib. habeat in-
fixum, alia concavum, a via ut haustili ferri tubulum
infixum habeat, atque hoc alia firmiter, alia
negligentius, ut dum euelluntur, reliquum intus
remaneat. *Virus* denique & facultate differunt,
quatenus veneno quaedam sunt oblecta, alia vero
minime. Atque haec quidem sunt telorum diffe-
rentiae. Nunc de instrumentis, quibus tela & res
nostris corporibus infixae extrahuntur, dicen-
dum est. Nam de sedibus, in quas tela ipsa pene-
trarunt, postea agemus, dum scilicet de modo
euellendi tela, aliaque infixa, sumta a sede affe-
cta indicatione, commentabimur. Itaque instru-
menta, quae a telorum aliorumque infixorum
differentiis, & a particularum in quas penetrant
varietate, excogitantur, inveniunturque, valde
multa sunt: octo tamen apud Guidonem &
recentiores chirurgos sunt magis communia.
Primum sunt *serpices*, seu, ut *Virgilio* loquimur, *se-*

nacula Ancenna, quae denticulatae sunt, & caput
habent ad instar lamae, 4. *Fen. lib. 4.* Secundum sunt
serpices Albucasi, in modum nostri aui, etiam denti-
culatae. Interim sunt *serpices* in modum cannae, siue a-
vandini, aut *serpices* calami comae, quos *Virgilio* *te-*
naculae canaliculatae vocant, ad *figuras* spiculis cin-
ctas (quas barbulae nomen habent) extrahendas accom-
moda. Quartum est *terebellum inmersum*, quod in
ferri infixum tubulum (quam dolium appellant) im-
ponitur, ubi autem sic tubulum immisissum, ferri ap-
prehenderit, leniter ferre signaculo educitur. Quintum
instrumentum est, *terebra* in longum porrecta, dela-
tandis ossibus. (quibus tela firmius inhaerent) appropin-
quata. Sextum sunt *impellentes canones*, & *impel-*
lentes furda, illud apud *Tragantium* sub septimo in-
strumentum ponitur, & est propulsorium instrumentum,
quod genus est, utroque capite & filibus siue *ser-*
dibus, siue *ferramentis*, hoc mare, appellant. In tela pro-
trudimus, donec ab altera parte apprehendit & extra-
hi possit. Septimum sunt *incisoria* ad ampliandam
carnem, ut *facilius* infixa extrahatur. A Tagantio *ex-*
cisorium culter dicitur, ad amplificandam carnis vul-
nera, quo facilius infixa extrahantur. Octavum est,
in modum arcus illius, qui *haustilem* vocant. Hoc au-
tem item telum excutitur. Ceterum extrahendo-
rum telorum, quae illata corporibus intus haeserunt,
modus est duplex, per attractionem vnius, alter per
protrusionem, seu impulsione. *Attrahit* fit ab
ea parte maxime, qua venit telum: sed interdum
etiam & ab ea in quam tetendit. *Protrahit* autem
fit in partem oppositam, & ex qua venit seu infixum
est. Horum autem modorum indicationes
desumendae sunt, tum ab ipsis telorum generi-
bus, quae supra commemoravimus, tum ex illis
sedibus, in quas illa penetrarunt. De quibus mox
dicam, si communia quodam praefiero in ex-
trahendis telis deservit observanda. Si itaque telum
in conspectu sit, sic ut se habet protinus extrah-
endum est; si in occultatum est, ita sciendum Hip-
poc. praecipit: Corpus vulneris (si tamē ipse po-
terit) in ea figura constitui debet, in qua erat co-
tempore quo vulnus accepit: atque ita quotē-
tenderit telum, specillo explorandum est. Si rē-
id non potest, iacens saltem illa debet collocari;
ut quam proxime fieri potest ad eam figuram
accedat. Si telum aliquod defixum primis con-
atibus commode ac salubriter euelli non possit,
sic consueque dimittere debes, donec circumposita
caro emarcescat, putrescatque. Deinde inter-
missum opus aggredere, telum ipsum quod in fixum
est modo huc modo illuc agitando, ac ma-
nibus vel forcipibus leniter ipsum contorquen-
do: ita enim lenius multo ac facilius telum extra-
hes: ut rite praecipiant *Ancenna*, *Virgilio*, & *Al-*
bucasi. Quamquam aliter visum sit Hēricio. Hic
enim voluit statim ac sine mora telum quocunque
modo fixa extrahi. Si armatus homo telo ictus
fuerit, nec possit leniter, ac facile telum mani-
bus euelli, vuln cratum protinus a suis armis exui
iubeto: & rite apparatus omnibus quae ad op-
pus eiusmodi conducere videbuntur, commisso-
que ac praefato (ut *supradictum est*) praeflagio, for-
cipe

*Altera ex-
trahenda
infixa
1. Attrahit.
2. Propellit.*

*Communia
quodam
extrahendi
telum obser-
vanda.*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cipe communia apprehensum telum (præsertim si fagitta est) ipsum leniter contorquendo extrahito. Quod si communia hæc forscipe nihil promoueris, fortiores assumito. Si telum carni infixum sit, trochanter est, ea parte, qua venit, recipiendum sit, nec aliter educi possit, amplifi-
canda scilicet pello aut nouacula plaga est, quo facilius id sequatur, quoque minor oritur, inflam-
matio, quæ maior quidem sit, si ab illo ipso telo, dum tedit, corpus laniatur. Item si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quam
telo postea exeunte seu transiente amplifi-
etur. Summa autem vtraque parte ita habenda cura
est, ne neruus, ne vena maior, ne arteria inci-
datur. Quod si horum aliquid detectum fuerit, ex-
cipiendum hamo retuso est, abduccendumq; est scilicet pello. Vbi aut satis incisus est, telum exin-
eundum est: tum quoque eodem modo, & eadem cura
habita, ne lubi o, quod eximitur, aliquid præ-
dictorum lædatur. Si autem telum ita firmiter ossi
inhæsit, vt nullavi extrahi possit, terebello (vt
vocat) directo diuisione non amplificabimus, ac
modo infra scripto telum liberabimus. Telo ex
corpore euulso, non alia est vuln-
eris medicina, quam quæ efficit, si corpore ito nihil inhaesit.
Ligo vulnus ipsum, vt & cetera alia vulnera, tra-
ctari ac curari debet; hoc vno addito, quod qui
ab infixo telo alteratus est sanguis exprimi ac
educi debet, vt vulnus ipsum a putrilagine vin-
dicetur. Ac perfridum quidem debet *exto calente*,
maxime si doloris adeit suspicio. Si in illa in-
fectionem experiat, ad eam tollendam infu-
catis lanis, fomentis, cataplasmas & consimili-
bus vtetur: Si vero inflammatione vacauerit,
futuris (si opus fuerit) adhibitis impositoque
medicamento, quod cruentis statim vulneribus
iniici solet, curandum est. Ceterum his com-
munibus prælibatis, tempellium est, vt propria
quædam d. telorum extractione subiiciamus, &
quando, & quomodo attractione, vel propul-
sione sit vtendum; summa primum (vt *propellium*)
est iudicatione ab ipsorum telorum generib; se-
differentiis, de in ab ipsi sedibus affectis. Itaque
tela, quæ iaci ac vibrari solent, magna ex parte
sunt vel oblonga & angusta, cuiusmodi sunt fa-
gittæ, vel lana, vel reuunda; aut angulosæ, vt plum-
bea glans, vel ferrea: aut lapsa, aut simile aliquid,
quod perrupta cute integrum intus infedit. Te-
lum si oblongum est & angustum, cuiusmodi fa-
gitta est, & facile in corpus conditur, & altissime
infedit. Sæpius itaque alia parte, quam qua venit,
figitta educenda est, præcipue quia fere spi-
culis cingitur, quæ magis laniant si retro, quam si
contra trahuntur. Sed in aperta via, cura diu-
di debet, ferramentum ad similitudinem facto Græ-
cæ litteræ 4. Deinde vbi apparuerit, si mueroni a-
rundo inhæret, propellenda est figitta, donec ex
altera parte apprehendi & extrahi possit. Si iam
illa arundo inquam seu hætile, deedit, so-
tumque iatus ferrum est, mucro vel digitis appo-
hendit, vel forscipe, atque ita educi debet. Neque alia
ratio extrahendi est, vbi ab ea parte qua veni-

tra. *figit.* ubi refert sagittam in dorso occultatam, post septem annos consolidato vulnere ex radice coxae exiisse. Haec tunc telorum extrahitione, sumta ab ipsorum differentis indicatione: nunc de eadem re dicemus, sumta indicatione ab ipsis affectis fratribus. Itaque sedes, in quas tela penetrarunt, vel caro sunt, vel ossa, vel articulus. Atque in iis quidem partibus vel aliter telum infodit, vel in summo duntaxat, aut saltem non admodum alte & citra medium infixum est. Iam etiam membra penitus transisse cognoui, quem admodum iuveni eucnit Alemarix, cui in loco publico, in quo sagittarum sagittas ad seopum emittunt, cum caput extralimites securos extulisset, sagitta nulum perforavit, qui plus capite exlabat: at is optime curatus fuit. Adhuc vel membrum vnum duntaxat telo ictum est, vel particulæ plures simul confixæ sunt, ita ut particula vna telo traiccta, alteri affigatur. Igitur si in summa carne telum impactum est, aut certe magnas venas & loca nervosa non transit, nihil melius est, quam qua venit, id euellere. Similiter etiam quod alte infixum est. Obiectæ vero partes, id est, quæ ex diuerso respondent, si conuoluerint, vel ex sanguinis profusione, vel ex aliorum membrorum consensu & conforti lege periculum inuehant, euulsione, qua parte infixum est, eximi debet. Illud autem digitis, vel ipse vel alius arundine, seu hastili (*quod plerumque lignum est*) in ferri tubulum immisso extrahimus. In quibus vero alte telum in carne infixum est & plus est, hoc est, longius spatium, per quo à telo reuertendum, quam quod perirumpendum est, iamque venas nervosque id pertranfuit, breuiter eum parum admodum integre carnis ex aduersa parte superest, neque aliquid obstat, quo minus contra mucronem incisio commode fieri possit, melius est aperire, quod superest, atque ita propulsat telum educere. Nam & propius petitur, & tutius euellitur, & in maiore membro, si medium mucro transit, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrinque medicamento fouetur. Proterius autem debet, vel hastili ipso, si inhaereat, vel si exciderit, propulsorio instrumento, cauo quidem, vel solido (*quod & sardum quidam vocant*) prout res exigit. Porro si telum acumen (*quod & sp. vocant*) habeat, hoc autem speculo deprehendimus, propulsorii instrumenti scinam; si vero tubulum seu coneuatitatem habuerit, marem immittimus, atque ita ferrum infecto in instrumento protrudimus, quoad educi facillime possit. At si etiam in opposita, seu vterius telum processerit, nec ea parte ipsum possit extrahi qua infixum est, diuisi iis, quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, vel euellentes, ut dictum est, per eam partem in quam tetendit, ut modo diximus, propellentes, summa cura (*ut monemus*) sumper habita, ne vel neruum, vel tendinem, vel maiorem venam, aut arteriam incidamus. Turpe siquidem est, d. m. telum extrahimus, maiorem no-

xam inferre, quam telum ipsum effecerit. Si telum ossi infixum est, nonnihil attrahendo ipsum

eximere tutum est. Eo autem usque mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu, vel forcipe telum extrahendum est. Quæ ratio in dentibus quoque eiiciendis est. & vix vnquam ita telum non sequitur: sed si morabitur, excutit quoque, ictum aliquo ferramento poterit. Quidam teneulis (*ut vocant*) seu forcipibus alligant arcum, quem vulgo balistam nominant, & laborate bene stabilito, intantum ipsum instrumenti neruum, seu chordam remittunt, & ita telum extrahunt. Quod si telum altius in ossi exciderit (*quod cognoscimus si firmiter id infixum nulla vis mouetur, aut labat*) ex cisorio cultro, ossi, quod iuxta est, ex cimo, aut sic etiam terebra (*si crassum sit*) prius perforato, telum ipsum extrahemus. Sunt qui ab eo foramine terebra facto ad speciem literæ V contra telum os excidunt, seu si lineæ, quæ diducuntur, ad telum spectent; quo facto id necesse est, libet, & facile auferatur. Quod remedium, vltimum est. Alii terebra in rectum ac longum porrecta, quæ illis directa vocatur, ossi percussu rimas coniucentes, & telum infixum mordicus prehendentes, diducunt; atque ita facile quod infixum est, extrahunt. Inter duo vero ossa si per ipsum articulum telum pertruperit, circa vulnus duo membra scissis habentibusque deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, vt tendones, ligamenta & nervos distendant. Quibus extensis laxius inter ossa spatium est, vt sine difficultate telum recipiatur. Sed illud quoque videndum est, sicut in aliis locis seu particulis lupta monui, ne quis neruus, aut vena, aut arteria à telo lādatur, dum extrahitur, eadem scilicet ratione, quæ supraposita est. At si particulæ plures confixæ fuerint, hoc est, membrum aliquod telo traicctum, alteri affigatur; verbi causa, brachium thoraci, aut cingulis alicui alteri corporis particulæ, aut crura inter se, hoc modo faciendum est. Si non per totum vtrumque membrum penetret sagitta aut hasta, eam ab exteriori parte, perinde atque in vno confuevit, apprehensam extrahemus. Sin penitus ambæ partes transfixæ fuerint, dimidia ligni parte serrata & scata, eas ligni partes, quam facillime fieri poterit modo, sigillatim euellemus.

OBSERVATIO X.

De vulnere ibi venenato telo vlti. lli.

Cum in Turcico bello, uti Roma mihi narratum fuit a Gualtero Harstio, Amstelredamensi, medico Romano, preceptorum meo, plures vulnera ex telo venenato subito morerentur; tandem superuenit illic medicus, qui vulneribus poma vel mala cydonia dentibus contrita, atque ita fasciula ieiuna permixta apposuit, quo remedio omnes curati fuere, nullis remediis antea iuuantibus.

SCHOLIA.

VENERAMUS ad tela venenata. Si itaque venenato quodam telo plaga facta est, idem omnibus, quæ prædiximus, sed paulo festinantius actis, adicienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel a serpente aut quouis alio venenato animalante

Methodus
extractionis
infixa sum-
ta a sede af-
fecta indi-
catur.

Si telum sum-
ma carne
infixum est

Si telum al-
te in carne
infixum est.

53

Si telum in
opposita
parte pro-
cesserit.

Si telum ossi
infixum est.

Si telum al-
tius in ossi
exciderit

Si telum in
articulo se
intrudat

Si particula
plures con-
fixæ fuerint.

Si venenato
telo quon-
dam animalante

mante istis adhiberi solet. Ceterum quod ad chirurgiam attinet, totam carnem, quæ veneno iam mutata est, liquidum fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eam, quod a sana carne multum differat sit. Pallida enim supra modum sublivida, & veluti mortua apparet. Sin carnem totam a veneno immutatam circumcidere non possis, non alienum erit circa vulnus scalpello incidere, hoc est, scarificare. quo plus viciati iam sanguinis extrahatur. *Deinde* venenum ad mota vulnere cucurbitula extrahendum est. Si cucurbitula non addit, tum quodlibet simile vas, quod idem possit, vsurpemus. Si ne id quidem præ manibus sit, quæ tamen vix contingere potest, ut tanta omnium rerum sit inopia, homo aliquis adhibendus aut mercede conducendus est, qui vulnus exsugat. Sed illud ut intercat, ante debet attendere, qui vulnus exsuxerit, ne quod in gingivis palatoque, aliæque parte oris vicus habeat: hoc pacto enim & ipse tutus erit. & tutum hominem vulneratum præstabit. Siquidem venena (ut *visum aut*) non gustu; sed invulnere nocent. Verum priusquam hæc aggrediamur, telum ipsum, uti docuimus eximendum erit. Atque hæcenus tradita est methodus de telis & corpore extrahendis. Ceterum Nicodemus incantamenta & insuffurationes, quas & *con-*

Venena non gustu sed in vulnere nocent

incantamenta vocant, quæ a Theodorico & Gilberto referuntur, reiciamus, quæ enim mihi Romæ quidam eiusmodi exorcismum dederit, quo ferrum corporis infixum extrahi dicatur, numquam tamen eo vti volui: & ne pili quidem cum Tagauro facio, ut quæ meræ nugæ sint & Christiani hominem non deceant. Medicamenta autem rationalia, & experimentis certis, sine ulla præstigio aut demonis fraude, nos potius sequamur: inter quæ & recenseri possunt illa, quæ extrahendis iuxta dicata sunt, & quæ Guido vsurpare solet in spinis, piscium ossibus, lapidibus, vitri fragmentis, furculis & ossium frustulis eximendis: atque frequenti experimento se edoctum, medicamentum ab Avicenna descriptum inter cetera præstantissimum esse & efficacissimū.

Emplastrum Avicennæ infusa statim extrahunt.

Recipit autem fermenti, mellis optimi, aut alnearii sordiditæ (quæ Græcis *propolis* dicitur) singulorum libram semis, visci quercus quart. unam: ex quibus conficitur emplastrum, quod loco cui fixum intus inhzret, superponitur. Rogerius adserit, multiplici experimento comprobato, quod radix arundinis contusa cum melle, & apposita, infixa sine dolore extrahit. Pleraque alia sunt in Antidotario descripta, quæ vim habent attrahendi & infixa euellendi, cuiusmodi sunt, *dell'annum, thapsia, feg. apennina, amomum cam, aristolochia, rana composita*, & id genus alia. Medicus Imperatoris infixa extrahabat cum pinguedine *salpæ*: & ad omnia caroi infixa hanc pinguedinem expertum medicamentum esse referebat. Similia medicamenta & quædam ex supradictis, etiam reperire est apud Paulum Aeginetam.

OBSERVATIO XL

De Vulnere facile per incisionem in facie.

DVobis altercantibus vnus alium, facie scindendo, cultro vulneravit: sed commissis labris, factaque decenti ligatione, quia profundum non erat, adhibitis linamentis, quæ ad recedentia vulnera faciunt, facile deinde coalescit: & vulnus sine molestia consolidatum est. At alteri, vulnere magis hians, futura opus fuit.

SCHOLIA.

Veneramus ad secundam intentionem vulnere, quam nunc explicemus, quæ erat commissio dissidentium, seu distantium coniunctio, quam assequemur per orarum adductionem, seu labiorum vulneris inuicem distantium attractionem & applicationem, membrum ipsum læsum, quam fieri poterit, lenissime tractando. Dissidentium oramque coniunctionem seu agglutinationem præcedit ne cessario orarum adductio. Quæ autem diducta sunt, in idem adducuntur, aut vinculo ex duobus initiis circumdantur, aut futura aut fibulis, quas Græci *ἀρτήρες* vocant, impositis, aut horum quibusdam, aut omnibus. Quod si vulnus (ut *proposui*) simplex sit, hoc est, scilicet, continui in carne diuortium, cum quo neque affectus vllus, neque symptoma vllum ad sit, ne

Secunda intentio. Dissidentium coniunctio.

Lib. 1. Therap. Trifurca dissidentia ora vulneris in idem adducuntur. Vulnus simplex est sola partium coniunctio ad glutinans potest.

Deligatura. a. Sutura.

valde magnum sit, sola fasciæ orbiculatim circumdata, diductæ partes committendæ sunt: ita enim vulnus procul dubio coibit, & citra aliquam aliam extrinsecus adhibitam curam coalescet. Huius autem coitionis & coalescentiæ effectrix causa, sola certe est natura. At si magnum vulnus sit, aut deo vti diductæ partes in totum, atque exacte prædicta deligatura committi nequeant, futuris ipsis adducuntur: *deinde* ubi sic deligatur, aut futuris adductæ fuerint, glutinatorum prædixis vtetur, quæ collectam humorum proluuiem desiccant, & consumere quærit, aliam vero ne influat, prohibere. Plaga autem ea potissimum sui debet, quæ in molli parte accepta est, maximeque si difficilis auris ima est, ut *Celsus* ait, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter: vix enim his partibus deligaturam vulnus committit. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in vnum oræ facile attrahuntur, futura quidem aliena est, imponendæ vero fibulæ sunt, quæ oras paulatim tamen contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit: sere autem fibulæ latius vulnus esse patiuntur. 7. *erris* scopus, qui in curando simplici vulnere chirurgus proponitur, est, ut diductiorum oræ, ita vt in vnum per adductionem coniunctæ sunt, conferantur & maneant. Conferuantur autem optime huiusmodi extrema, quæ in vnum coacta sunt: si dem sere auxilium, quibus & in idem adducta sunt, nempe decenti ligatione, appposito mē-

Fibula.

Intentio, commissio, conseruatio.

bri situ, & futuris, si necessarii videbuntur. Porro bisariam simul manent, & adglutinantur, quæ commissæ sunt: alia enim per se, alia ope aliorum subsistunt, ac manent. Per se quidem, quæcunque secum concreuerint, ac coalescent, aliorum ope, vt ea quæ colligantur, & quæ glutino aliquo tenentur: ac quæ concreuerint coalescant, omnino mollia naturaliter sint oportet. Talis sane est

Dupliciter conseruatio, manent, quæ commissæ sunt.

(inquit *Galenus*) tum caro ipsa, tum quæcumque carnea ex ipsa constitutione sunt. Quæcumque vere dura siccaque sunt, eorū diuise partes coire simul nequeunt, alienum enim terminum nequaquam admittunt, sed glutinum ali-quod vinculumve, quo commissæ maneant, requirunt. Et talium quidem sanatio in sequenti-bus præcipitur. Nunc de iis, quæ per se viriri possunt, in scriptum sermonem peragamus, & quomodo vulnus ligari conveniat primum dicamus ex *Guidone*, *Auicenna* & aliis, quos & ipse *Tagautius* sequutus est. Deligatur igitur modi seu differentie tres sunt apud *Auic. Fen. 4. lib. 4.* Nempe *incarnativa*, *expulsiva*, & *retentiva*, ita enim eius interpret & recentiores chirurgi eas nominant. Incarnativa, quæ magis proprie

Quomodo vulnus ligari conveniat.

Triplex generis deligatur.

1. Incarnativa seu ad glutinativam deligatur.

ad glutinativam dicitur, recentibus tum vuln-eribus tum fracturis accommodatur. Debet autem fascia in hoc genere deligaturæ fieri ex parte aduersa loci vulnerati, ducendo atque inhi-ciendo alterum fasciæ principii versus partem su-periorem membri, alterū versus inferiorem. Ea vero latitudine esse debet fascia ipsa, vel semel .58 iniecta, vt non vulnus tantum, sed vsque ad ali-quid vtrinque etiam oras eius comprimat, quantum videlicet videbitur necessarium. Si ab altera parte caro magis recessit, ea mediis attra-hitur, si æque ab utraque, transuersa compreci-deretur oportet, aut si id vulneris ratio non par-tetur, media primū inicienda est: & tum in utram-que partem ducatur. Ceterum arctior esse debet ligatura super locum læsum, quam in paribus adiacentibus. Cauendum tamen semper est, ne vel nimis arcta, vel nimis laxa sit. Quandoquid-que laxior est, non continet, quod autem non continetur, elabatur. At vero quod vche-mentius est adstrictum, dolorem precitando ex-citat, & proinde fluxione præoriat & phlegmo-næ accessit, quandoque etiam gangrenam. Danda igitur opera est, vt vitato amburum incōmodo, vtriusque fruamur commodo. Id fiet, si quod ni-mium est, declinabimus. Ergo nec adeo arctare ligaturam debebis, vt iam comprimat, nec adeo remittere, vt laxa sit. Et, vt summam dicam deligaturæ terminus, sit bona laborantis toleran-tia. Ceterum extrema fasciæ acutissima sunt. Nam nodus (inquit *Celsus*) vlcus lacerat, nisi ta-men longe est. Et si necessitas desideret, plures fasciæ iniciantur, & modo supradicta reuol-uantur. Itaque hoc diligendū modo vulneris la-bra adamussim committuntur, & quo minus circa vulnus excutitur phlegmone. (cuius rei cau-ram imprimis habere oportet) prohibetur, vt lib. 6. *Method. Gal. annotant.* Sunt qui pannum li-neum duplicatum adaptant vulneri, & stringen-do acutius assuunt. Hæc de prima ligaturæ differentia. Secunda deligaturæ differentia, quæ *expulsiva* dicitur, antiquis vlcibus & sinubus (quos *cavernæ vlcera* vocant) proprie dicata est: hoc enim commodi præsistat in illis, quod a fundo ad os collecta humorum colluuium ex-trudit, & ne quid amplius in locum asitum confluat, valde prohibet. Hæc autem sit fascia

ab altero tantum principio reuoluta, incipitque ab inferiore parte membri laborantis, vbi arctior esse debet. Ab hinc ad superiorem partem facta circumuolutione, tam paulatim soluendo, dispensatur, si saltem os, per quod sanies emanat, ad superiorem partem porrectum sit. Interdum enim inferius spectat. Voco autem hic partem superiorem cum *Galenus*, quæ versus cor, aut he-par valorum suorum radicibus spectat. Rursus radicem vasis appellamus præter eius partem, quæ iocinori propior est, vel citius cordi. Por-ro eiusmodi ligatura adaptari solet membris in-æqualibus, id est, quæ non sunt æqualis crassitu-dinis: cuiusmodi sunt tibia, scindens ad fasciam ipsam singulo quoque palmi intervallo, & eam valde acutissimo, ab ea parte maxime, quæ gibba est, id est, vt dicitur, arcuata: laxè vero a par-te altera dorsali. Hoc autem genus ligaturæ vti-lissimum est in antiquis vlcibus, varicibus, & tibiæ tum inflationibus. Deligaturæ quæ retinet medicamenta, accommodatur membris, in qui-bus non potest fieri arctatio, seu strictio, neque alia deligaturæ, vt in collo & ventre, atque om-nibus abscissibus & dispositionibus dolorifi-cis. Hæc autem percutitur linteo, seu fasciā vnū finem, seu (vt dicitur) caput habente, vel quæ sit multorum capitum seu brachiorum, prout res exigat. Atque eius deligaturæ principium super locum asitum inicietur, & in parte opposita, vel nodus vel potius futura fiet. Talis autem deligatura leniter & citra dolorem, cum appetet tempus, solui debet. Quod si linteo nimis ad-hæreant, ea tantisper vno madefacito, donec se cile separari possint. Fasciæ vero ad vulnus deligandum lintæ id est, lintino constans, aptissima est, secundum *Galenum lib. 6. Therap.* talis nimi-um, quæ nec nimium mollis, nec nimium dura sit. Quod enim molle nimium est, & algæ ritu fra-gile, non tuto continet: quid vero durum ni-mis est, precitando offendit. Si igitur ex pannoli-neo veteri, non tamen nimis detrito, suauis, leni & mundo, eaq; latitudine & longitudine, quam natura patris desiderat. Vt si humerus tibi deli-gandus sit, fasciā, quæ latitudinem sex digito-rum habeat, assumas: si scimus, quinq; si tibia, quatuor, si brachium, trium digitorum. Si vero digitus ligari debeat, vnus digni latitudine fas-ciæ assumenda erit. Eius vero longitudo sit pro-ratione numeri incisionum, hoc est, pro necessi-tate reuolutionum. Hoc igitur, vt & multa alia, quæ scriptis mandari non possunt, medicæ ac chirurgi ingenio, quod (vt *Damasceus* ait) tum artem, tum naturam operantis magnopere adiuuat, committitur. Sed & ad hoc non parū confert cognitio conformationis ipsius par-ticulæ laborantis, vt quarto *Therap. Gal* his ver-bis expressit: *Deligare* (inquit) *commode egeram particulam non possis, nisi prius vel ex figura, vel po-situra, vel vtriusque indicationem perspexeris.* Qui integram huius deligaturæ tum fasciæ vnde cū-trinam desiderat, legat *Galenus de fasciis*. Vido *Vi-dio Florentino* interpretæ, cui multæ & variæ fi-guræ fasciarum adiectæ sunt. Sed hæc quæ non e-diximus

Et si inferius fuerit.

58.

3. Deligaturæ retinens.

Quæ fascia vulnus de-ligando aptissima.

Sic deligatur ad fasciā, vt continetur, neque ad frangat.

2. Expulsiva deligaturæ.

Barth. Blarerus expeditissimum conscripserit tractatum, quo & iuris communis & Camerae Imperialis huiusl. processum praxinque grauitur propalauit, nec non Cæsar Contard. Hier. Cagn. & Ioan. Oldendorp. egegiam in huiusl. ptaxinodanda nauarint operam, eo remittendum duxi laudabilis, quam optime congesta frustratione diuelleret.

Si tamen aliquis synopticam proecessu relationem ꝑ expeteret, huic verbis Alex. Raudensis excultissimi practici gratificari possem. Hic *respons.* 26. nu. 100. vol. 1. sequentibus scribit verbis. *Primum* (inquit) ac *præcipue* requiritur, quod præcedat summaria cognitio diffamationis iudici facta. Secundo, assignatio termini, cum quadam causa cognitione: Tercio, interlocutoria, quæ auditu ita denegatur: Quarto, valida parsu citatio, cum causa cognitione. Quinto, assignatio termini ad agendum: Sexto, duæ monitiones ad minus intra illum terminum, de quibus in actû apparcat: Septimo, impositio perpetui silentii: & hoc opinio est longe tutior & crebrior vsq. adeo, ut ex sententiâ non imminuat periculum priuationis in hoc remedio nisi expressa silentii impositio: Octauo, contumacia: Nono, pronuntiatio iudicii in termino sibi assignato contumacem esse: Et Decimo, ut doceas de interesse suo & se possidere, sententiâ habere. Hactenus Raud. Auctoritates ab ipso in comprobationem citatas, ne prolixior in transcribendo videret, non addidi. Nec ille pides etiam processum huiusl. synoptice exposuit Ferrar. Mont. de iudic. præexercit. lib. 3. cap. 9. per 100.

ARGUMENTVM.

Binam requiri citationem præcessisse sententiâ impositionis perpetui silentii.

CONSIDERATIO I.

Quamuis nonnulli arbitrentur, vnicam citationem ad imponendum ꝑ contumaciter emanenti diffamator perpetuum silentium, sufficere. Roman. Alex. & alii per Gabr. Rom. lib. sentent. 2. sit. de act. omib. concl. 6. sub nu. 21. Mynsing. obseruat. 26. cent. 3. Barth. Blar. in l. diffamari.

cap. 6. nu. 21. relati. Receptior tamen & verior perhibetur illa opinio, quæ binâ ꝑ requiritur citatio, Mynsing. obseruat. 26. 4 vbi multas in hoc congestit auctoritates. cent. 3. sequitur eandem Matth. Wesenb. conf. 66. nu. 52. Nic. Reuf. conf. 19. nu. 36. 37. li. 1. Alex. Raudens. *respons.* 26. sub nu. 100. vers. sexto, duæ monitiones ad minus. vol. 1. Robert. Marant. tract. de multa. alienat. sub n. 350. vers. tertio requiritur, vbi adseueranter lotibit, hanc opinionem esse & magis communem, & tutiorem, Casar. *Vrsin.* in addit. *Afflic.* decif. 264. sub nu. 1. refertque vterque Myns. & Blarerus ex Afflic. decif. 164. nu. 4. ita in Neapol. Consilio IVDICATVM existisse. Et iterum in S. Camera Imp. sic TENTVM oblectatumq. fuisse, iidem testantur: quorum assertionem corroborantur a consentiente Dn. Gaillio, nu. 4. scripta. Et binam requiri citationem comprobavit Benintend. Bonon. decif. 66. nu. 1. vbi asseuerat in eod. Consil. IVDICATVM esse.

Dissidenciam harum opinionum ꝑ conciliatorem se præbuit Ant. Gabr. d. sit. de act. conclus. 6. nu. 22. 23. Aut (inquit) præfigitur terminus accusatori ad instantiam accusati, & non comparente in termino accusato, citatio secunda, ad hoc, ut ab instantia iudicii accusatus absolatur, requiritur, & sic posterior receptior opinio procedit: aut accusatori terminus intra quem accusare, vel accusationem proficui debeat, præfigitur: quod si non fecerit accusator, vltior non requiritur citatio, & eo casu prior obtinet opinio. Alteram ibidem ex Afflic. d. decif. 264. adducit conciliationem, quam, siquidem eam, nec Afflic. ꝑtobet, nec ruti arbitret, non adduco.

Et hæc quidem conciliatio posset etiam posterioris opinionis declaratione ꝑ primam referre.

Declaratur posterior & verior opinio secundo, ut ꝑ fallat, quando diffamator ad primam sibi factam citationem respondisset, se nolle compateri: eo enim casu, alia seu secunda non requiritur citatio, quin magis ad perpetui silentii impositionem procedere inte possit nominatim Blar. in d. l. diffamari. c. 6. nu. 101.

Assentitur W. c. enb. *conf. 96. n. 26.* dixi infra circa materiam citationis.

ARGUMENTVM.

Mandata sine clausula iustificatoria, quando decernantur.

SUMMARIA.

- 1 Mandata sine clausula iustificatoria regulariter non decernuntur.
- 2 Fallit primo in causis fractae pacis publicae. Licet aliud hodierna Imp. lege cantum sit sub eod. n.
- 3 Secundo super pacto nuntiandi noui operis. Et quatenus hoc in Cam. Imp. procedat. num. 4.
- 4 Noui operis nuntiatio celeritatem desiderat. n. 10.
- 5 Tertio in puncto executionis rei iudicatae.
- 6 Quarto, ubi ex voluntate contrahentium partium mandata sine clausula decerni possunt. Declaratur. n. 7.
- 7 Quinto aduersus conf. ssum & conuictum.
- 8 Sexto ubi periculum in mora.
- 9 Septimo, in causa, quam notorie Christianismo aduersatur, atq. ita in fauorem Christianae religionis.
- 10 Fallentia plures remissive.

CONCLUSIO XIII.

REQVLA non modo de iure communi Romanorū, verum etiam Ord. S. Cameræ Imperialis existit, mandata sine clausula† haud decernenda esse. Vincent. Carot. *decis. cas. 19. n. 1.* ubi al. citat. Matth. Coler. *process. execut. part. 1. cap. 2. num. 242.* Ant. Sol. *in consil. antiqu. Sibund. decre. Carolus. gloss. 2. nu. 1.* de iure Cameræ al. est text. *tit. 23. par. 2.*

Fallit primo, in causa fractæ publicæ† pacis. dixi *sup. conclus. 4. numero 6. Col. de process. execut. cap. 2. numer. 248. par. 1.* Ceterum hanc fallentiam hodie in S. Camerali iudicio non obtinere ex recessu Imp. Anno 1594. Adduxit referendo

Dn. Denail. in synopsi iuris Camer. rubr. *mandata super pace publica. §. 5. vbi*, quod mandata ex Constitutione pacis publicæ, siue cum citationibus, siue seorsim, non sine, sed ex recepto stylo cum clausula decerni debeant.

Fallit secundo super operis† noui nuntiatione. Vincent. Carot. *decis. cas. 19. nu. 20.* Dn. Gaill. 1. part. *pac. publ. cap. 5. sub n. 10.* Videatur item Dn. Gaill. 1. *observat. 16. num. 12. 13. 15.*

Declaratur fallentia, vt mandatum hocce de iure Camerali, dum de opere† restitucō idonea cautio oblata sit, decernatur, ex memorial. An. 79. *refert Denais. in synopsi iur. Camer. rubr. mandata sine clausula.*

Fallit tertio, in puncto executionis† rei iudicatae.

Fallit quarto, si inter partes ita† conuentum esset.

Huius quartæ fallentiae illationes grauissimas videt studiosus, † in *Rectif. De. 7. pat. Ann. 1600. §.* Ob auct. auct. obligantes sūt D. *rschreibungen. & aliquot segg. 4. §.* ad §. *Weiter ist auch*, quas hic inducere prolixitatis causa esset.

Fallit quinto, in confesum† & conuictum.

Fallit sexto, ubi periculum esset† in mora, quo spectat & relata secunda fallentia. Nuntiatio enim noui operis† celeritatem desiderat. ad nos. Lancell. *traffa. attent. cap. 12. nu. 63. part. 3. Borgu. Canal. Finic. decis. 23. n. 7. & 8. part. 2.*

Fallit septimo, in re notorie Christianismo aduersante, vt quia† pat. n. 11. 12. clausula remanenti mandaretur de exhibendo filias suas.

Has quinque proximas fallentias recensuit, textibus & auctoritatibus confirmando, Ant. Sol. *ad decret. Carolus. gloss. 2. nu. 1.*

Fallit adhuc aliis modis a Dn. Gaillio. 1. *pac. publ. cap. 5. nu. 10. & Dn. Coler. d. cap. 2. numer. 249. & segg. colle. & 5.* apud quos† studiosus videre posset, quomodo omnibus sint ad manum. Carot. etiam d. *cas. 19. per tot.* occupatus est in recensendis casibus, quibus vel mandata cum, vel sine clausula decernantur.

ARGV-

Syr. lupul. 3 j. ag. bugloss. 3 j. aqua lupul. 3 j. misce.
 Excoctiuauit eundem syr. per quatuor aut quin-
 que dies. In secunda visitatione admouit dige-
 stium ex oleis abietinis & sy. eleorof. completi 3 iij.
 simul mixtis tentam imposuit, ac vulneri appli-
 cuit. Locum vulneratum & circa ipsum his oleis
 inungebat, pulueremque incarnatiuum super la-
 bra alpergebat, cuius hæc erat descriptio: *Re-
 sang. dracan. mumia. lumbrie. terrestr. ana p. a. fiat
 pul.* deinde duas pecias oleis supradictis infusus
 futo loco applicabat: & cum puluillis sine pluma-
 ceolis triangularibus & fasciis brachium & man-
 um super tabulam ligneam ligabat. Et sic per
 quinque dies inclusive (excepto quod vesperti-
 no tempore oleum rasuram omittebat, admini-
 strando tantum oleum abietinum solum) conti-
 nuauit. Sexto die vulnerem iam digesto, tale mun-
 dificationium adhibuit, quod etiam ad incarnati-

66 onem faciebat: *Re. myrrha. sarcocolla ana 3 j. thu-
 rus 3 j. olei abietini 3 iij. mellis ros. farina bordes ana 3
 j. fiat ad formam vnguenti, quo penicilla seu ten-
 ta illinabantur & imponebantur: super peciam
 deinde basium manus vng. extendebat, qua co-
 operiebat tentam & totum vulnus: & debito mo-
 do cum plumaceolis triangularibus tantem ex-
 primentibus vulnus deligebat. Octauo autem
 die, cognoscens, non amplius esse periculum de
 dolore aut spasmus, sciensque vnum ex facilibus
 esse iocisum, pro eius vniõne duas abstellas appo-
 suit, vnam ferream in parte inferiori, vbi erat
 osificium vulneris, quæ erat talis figuræ \square . Al-
 teram ligneam in opposita parte, & ligaturis stri-
 ctis ipsam ligauit, & emanente vulnere discooper-
 to, vt debite medicamenta, ligatura prima re-
 manente, posset applicare. Eodem quoque die
 præscripsit balneum sequens, ad exsiccandum &
 resoluendum humores, qui ad locum affectum seu
 læsum eos fluebant, & ad membrum roborandum:
*Re. salina. betonica. stachad. arab. hypericon. absyn-
 thy. maioran. ros. ana m. ss. myrrall. 3 j. balsamum
 m. j. crasso modo confusa atque incisa bulliant in
 vino nigro seu rubro, ad consumm. tertie partis,
 & modus administrandi talis erat. Imponebat
 peciam in tali vino (apposita tamen prius tenta
 illinita mundificato prius dicto) & vulnere appo-
 suit, & optime ligauit. deinde totum membrum
 per modum embrochæ vino isto fouebat, alter-
 nis diebus, donec sciret iam tempus cicatrizandi
 adesse. Pro sigillatione capiebat modo vng. de ca-
 rissa, modo de calce, etiam tetrapharmacum aut de
 betonica. Et ita laude diuina sanatus est.**

S C H O L I A.

*Vfus pul-
 uillorum seu
 plumaceolo-
 rum.*

Q V N T I A m hic mentionem de puluillis fe-
 cimus, corum vsum explicemus, cum ad ter-
 tiam intentionem quoque pertineant. Cum au-
 tem puluilli (qui vulgaribus chirurgis plumaceoli
 nuncupantur) ad multa viles sint, de iisdem obli-
 67 ter aliquid dicamus. Quandoquidem dissolutas
 partes faciunt & compriment, membri, quod
 lux vniõnis diuortium patitur, genuinum calo-
 rem fouent, & conseruant. Denique a graui mo-
 lestiaque vinculorum ac fasciarum pondere, vulne-

*Ratio nomi-
 nis.*

ratam particulam tuetur. Fieri autem quondam
 solebat ex pluma inter duos pannos candidos &
 mundos confuta, vnde & nomen illis a veteribus
 inditum est. Verum quoniã eos subinde mutare
 & innouare (quod valde tediosum erat) cogebat
 necessitas, magis postea placuit eiusmodi puluilli-
 los ex stuppis canabinis cõficere, præsertim dili-
 genter ac studiose pexis, emundatisque. Funt et-
 iam interdum ex lana vel xyle, quod cottonem ap-
 pellant. Pteriq; autem hodie loco puluillorum, pan-
 niculos ad mouent lenes, id est, non asperos, du-
 plicatos, aut triplicatos, quos hodie vulgares oo-
 stri chirurgi compressa vocant, alii vero frangiam
 adaptant. Porro duo vel tres, pluresve, prout res
 expostulat, apponuntur: aliquando quidem sic. *Compressa.*
 ci, ac nullo madentes liquore, nõdumquam ve-
 ro imbuti oni cãdido vel vino, vel posca aliquo-
 ties etiam oleo, iuxta ipsius dispositionis exigen-
 tiam. Inuocitur autem eiusmodi puluilli ex tri-
 plici differentia, quod ad figuram attinet. Alii
 enim triangularem, alii rotundam, alii vero qua-
 dratam habent. Qui figura constant triangulari,
 glutinandis vulneribus (vt placuit Ausenna) iunt
 dicati. Ita autẽ disponi debent: vt vons ex vtroq;
 latere orarum seu labrorum vulneris, constitua-
 tur, ita vt super plagam, ioter se iungant lateri-
 bus. Qui rotundam habent figuram, siccis alii
 superponuntur, natui caloris particule laxæ cõ-
 seruandi gratia, & vt saniosam proluant, ac for-
 didos ichores in se recipiant. Sed qui quadrati
 sunt, ideo apponuntur, vt per tam la sam a fasci-
 arum & vinculorum molestia viodicent.

O B S E R V A T I O X I V.

*Carpi. De altero quodam in raseta manus globosum
 tormentario illo & lafo.*

C A R P E N S I S nomine Peregrinus in raseta
 manus instrumenti bombardæ dicto seu glo-
 bo tormentario læsus atque ictus fuit, adeo vt de
 spasmo metus esset. Iacobus Carpus Carpiensis
 Bononiensis accitus, restricto sanguine, & adhi-
 bita cõueoienti phlebotomia, adhibuit oleum hype-
 riconis ad sedandũ dolorẽ, & ad præseruationem a
 spasmo. & ita per vñũ diẽ procedit, applicato ta-
 mẽ defensiuo in loco satis distante a vulnere. Alio
 die præscripsit digestiuũ tale: *Re. olei abietum 3 j.
 vitellorum anorum numero 1 j.* Modus procedẽdi talis
 fuit: in primis tẽtam seu penicillũ in aqua rosea in-
 fundebat, postea ita digestum, deinde vero ito oleo
 rosato cõpleto, & loco læso applicabat: & desuper
 peciã eodem digestiuo oblitam super ponebat.
 Deinde totũ manũ & brachiũ vnguebat oleo rosato
 calido. Vltimo emplastrũ applicabat tale: *Re. farina
 febrũ lib. 1 j. farina bardanũ lib. 1 j. olei resin. lib. 1 j. aqua cõ-
 mumis q. s. fiat emplastrum: & ita medebatur per
 quinque dies.* Postea præscripsit hoc vnguentũ, va-
 lens ad cõbustionẽ: *Re. corticũ interior. sambuci lib.
 1 j. eleorof. lib. 1 j. B. vitell. anorum cum album. num.
 xxx. pul. vitri lib. 3 j. B. cera alba lib. 3 j. aqua com-
 mumis lib. 1 j.* fiat Vng. secundũ artem. Et de isto
 Vnguento parũ supra tẽtam & peciã ponebat,
 & loco ad læsũ admouebat. Continuauit istud
 vnguentum simpliciter per 11. dies, donec illi vi-
 68 debatur

*Materia
 puluilli.*

Compressa.

Numerus.

Figura.

*Triangula-
 res.*

Rotundi.

Quadrati.

debatur mala interperies ab igne induta remota esse. Postea tentam in oleo abietino infundebat: & aliquando istud vnguentum cum oleo abietino miscebat. aliquid vnum absq; alio admovebat. Etiam prescripsit haumentum ex decoct. bord. nigra vsque ad crepaturam: cui addidit sacch. rubrum. Postea a misso illo vnguento ad ignem seu combustionem non confertente, solum tentam ex oleo abietino infudit, & super peciam vng. de calce apposuit. Videns postea vulnus absfessione indigere, prescripsit mundificationum dictum in casu illius Tarentini. precedente Observatione, constans ex myrtis, sacco oleo &c. sed cum non sufficiens esset, accepit vng. apolloniar per aliquot dies.

- 69 Deinde parauit balneum ad mundificandū humores ibidem retentos, & ad membrum confortandum, hoc modo: R. ros. myrtill. absinth. ana m. j. aristoloch. longa & rotunda, centaur. ana m. ℞. salina. betonica ana m. j. vni albi bucharia trita Bononensis, mellis lib. ij. bulliant secundum artem vlg: ad consumptionem quartæ partis, & coletur, in isto balneo pecias & tentas infundat absq; vnguento aliquo, & loco applicabat. Loco iam satis mundificato, iterum super tentam de oleo abietino cum melle rosaceo, modo sine melle, vulnus imponebat, super peciam vero vng. de resina. Pro sigillatione autem per aliquot dies apposuit ceratū de betonica: aliquando vng. de ceruina, scilicet etiam ambo simul, & post consolidationem prescripsit tale balneum: R. rad. thuli m. ij. betonica, salina, abietina, saturnea, absinthius, fusticha. rad. vicia ana m. j. rad. altheam. ij. bulliāt in lib. xxx. aquæ communis ad mediocritatem: coletur, & fiat balneum bis in die. Deinde sequenti inunctione inuoxit: R. propolis. humana 3 j. martianus 3 j. pul. humbracorum 3 j. p. c. c. Et ita Dei gratia curatus est.

S C H O L I A.

De penicillis suis intra in (quasi tentis vulgo appellatis) & linamentis formandis, aliqua etiam vbi modis plura.

In quibus vulneribus utendum in vinctis & linamentis.

- 70 In quibus vulneribus utendum in vinctis & linamentis.

cum phlegmone, aut quouis alio tumore præter naturam fatigant. Sexto in vulneribus, quæ per morsus fiūt. Talia namq; vulnera non sunt festinanter agglutinanda & ad cicatricem perducenda: quin potius longo tempore aperta & hiantia manere debent, quandoquidem morsus fere omnes (ut Celsus ait lib. 5.) quoddam virus habet, quod foras semper euocandum est, non intro repellendum. Sed de his suis loco dicetur. Septimo turundis & linamentis vtimur in vulneribus, in quibus persanādis circa ossa manus admoventur. Ostium in vulneribus, quæ iam vetustate in vlcera defluxionibus scaturientia degenerauerunt. Porro in omnibus aliis reliquis vulneribus, inducenda cicatrici studemus, absque eiusmodi turundis & linamentis. Aduertendum est, in iudicium non parum esse, pro ratione finis, cuius gratia fiunt, & admoventur: fiunt autem interdum, vt diximus, ad detergendas sordes vulnorum, atq; tum ex panni non asperi & præsertim veteri, lacinii, vel floccis euulsis formantur. Guido autem & tentas etiam heinas vocat. Nonnumquam vero ideo fiunt & in vulnosa immittuntur, vt ipsum hians, & apertum maneat. At tunc quidem ex stuppis bene pexis, & a sordibus recte mundatis, vel ex prædicti panni frustulis, efformantur, vel etiam ex xylo (quem catonem vocant) vt Rhazes facere solebat. Sed ex canna ænea vel argentea perforata fiūt penicilla ad eundem finem vt verbi gratia in naribus ad aeris inspirationem, & in aliis vulneribus, vt sanies & purulenta colluui per hanc velut emissarium feratur & foras egrediat, non autem intus retineatur. Quandoq; idem etiam hæc linamenta, inquam, & penicilla, pl. q. inferuntur, vt ipsius os magis dchifcat, & ampliatur, fiuntq; tunc aut ex spongiosis vehementer compressis & intortis, aut ex radice gentiane: hæc enim dum multum humorem, quo scaturit vulnus, combiberint, turgescūt, & ita magis hiantem plagam reducunt. Ceterum formalinamentorum æqualis esse debet, turundarum vero inæqualis, in modum clauiculi lignei, quem Latini impagum vocant, ne scilicet intro labantur. Hæc autem aliquoties quidem sicca, quandoq; vero quopiam delibuta vnguento admoventur, prout res ipsa exigat. & chiqua quæ ad eiusmodi operationes spectant, medentis consilio & solertia committuntur. Nunc ad quartam intentionem curandorum vulnerum, hoc prius præposito exemplo accedamus.

OBSERVATIO XV.

De vulnere oculi sinistri palpebra, lac. Carpi.

T HADDAVS quidam Boonienfis cum ense læsus esset in oculi sinistri palpebra, acitux Iacobus Carpi, ob nimium & intempestum dolorem & acutum, non potuit videre et n. acutis substantia in oculis esset, nec ne. Igitur pro prima visitatione nihil magni tentandum esse putauit: sed duntaxat albumen cum aqua rosacea mixtum aut quassatum vulnere inposuit, & defensiuum supra frontem, & vt dicta tenui vteretur vulneratus, mandauit, simul & sanguinem ex cephalica in

Omnia sua morsus ha. let quoddam virus.

Vbi & materia turundarum & linamentorum.

Linima.

Tenta canalis.

Impagum, Latini, Celsus Chond.

capit brachio, loco vulneri opposito, misit. Postea quoque & ventosas sine scarificatione spatulatum naribus apposuit, ut oculum ab apostemate leui inflammatione praeseruaret: idque ad septimum usque diem mane ante cibum fieri voluit: hoc enim securus non esse reddit ab apostemate: nam post septimum diem ab eiusmodi symptomatis liberi sunt vulnerati. Ceterum in secunda visitatione sumit *sif. albi sine apo 3 ij. aqua ros. 3 v. & cum albumine oui parabat collyrium, & in eo pecias imposuit, quas super locum applicabat tres quatuorve simul, ut totum locum affectum cooperirent. At in alio loco non laeso, ob propinquitatem loci affecti, posuit similiter pecias infusas in *albumine oui, cum aqua ros.* Quae continuabat per vnum diem cum dimidio, ea ter quaterve in die renouando, iuxta doloris necessitatem.*

73 Secundo de administruat *castia extrallam* cum *zacch. & deinde syr. sequentem: de syr. de end. 3 j. mellis ros. 3 lb. ap. end. cicchora, betonica ana 3 j. misce.* Postea applicuit loco laeso *aleum rosatum* completum: ante tamen appositionem ponebat duas pecias sive albo infusas. Demum animaduertens magnam oculi inflationem, sequens emplastrum prescripsit: *de ros. m. ij. stannum chamoemilla, betonica, absinthij ana m. j. santal. rub. 3 j. omnia pistentur simul, & coquantur in aq. q. i. Cui adde post bullitionem vini eius, fiat emplastrum;* quod oculo appositum est, post pecia vnguenti capitalis impositionem. Oculo detumefacto, iterum apposit *sif. album, cum aqua ros. & super illud vng. capitale:* & ita processit per aliquot dies. Sed quia oculus & caput erant infrigidata, & aliquo modo tumefacta, propter conculcationem humorum ex medicinis frigidis, apposit supra oculum *ceratum de betonica, & supra frontem emplastrum supradictum:* quae remanserunt per vnum diem, licet necesse fuerit ea remouere, propter nimium dolorem ex cerato inductu, & hoc fortasse propter nimiam eiusdem attractionem & resolutionem vehementiorem. Ideo reuertebatur ad vnguentum suum capitale. Deinde ad consolidandum imposuit *vng. de ceruina camphoratum.* Quibus remediis sanatus est.

SCHOLIA.

Hoc exemplum, licet non solum locum pertineat ad quartam intentionem communem vulnerum curandorum, ut particula laesa substantia cohaeretur, & a dolore, phlegmone, & aliis prauis symptomatis custodiatur, etiam pertinet ad vulnera oculorum & palpebrarum, sed quia postea propria reinedia, quae ad vulnera oculorum tum palpebrarum pertinent, enumeratur summus, nunc potius quartam intentionem vulnerum curandorum ex phlegmone: nam ad eam ordo nosse perueniret. Quarta itaque intentio erat (ut diximus antea) in curandis acceptis vulneribus, particulae laesa substantiam conseruare, ac prohibere ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio prauo symptomate (quod vulneribus ipsis accidere solet) infestetur. Hunc autem scopum assequimur, admotis emplastris & linimentis, ex oui candido, & aliis huiusmodi refrigerantibus, ut recte do-

mus *Rhazes*, primis siletem diebus: postea vero vino hyptico particula perpendenda (at in oculis potius *aqua ros.* in principio conuenit: verum nunc loquimur in communi de omnibus vulneribus) & figura aptissima collocanda est. Apertio quoque, eaque interdum ex aduerso, in vulnerata parte molenda est. Necessaria etiam est nonnumquam sanguinis missio, item & purgatio, ut non solum exemplis iam multis supradictis, sed etiam dicendis mox declarabimus. Sed & proba victus ratio (quam statim praescribimus, & postea subuenimus) in primis est obseruanda, si quartum hunc scopum cupis assequi. Porro nihil aduersus haec, quae commentamur, pugnat, quod plerique obiciunt, vulnera scilicet in quantum vulnera sunt, his tam variis, tamque multiplicibus auxiliis non indigere. Hoc enim dictum solum locum habere in paruis occasionibus, & eueratis, id est, bono habitu praeditis corporibus. In magnis vero occasionibus, & in plethoricis corporibus, vel vitioso succo repletis, necessum est ad prauorum symptomatum (quae recentibus vulneribus superueniunt & consueverunt) precautionem, praedictis vii auxiliis.

Quod Galenus innuere videtur, lib. 6. meth. medendi, his fere verbis: *Fungamus quempiam ad nos venire, cui tantum cutis ac si puerilis, hunc hominem, si iuste cui facile (ob boni corporis abundantiam) vlcera sanescant, etiam si cura medicamentum nulloque membro, ad opera consueta dimittas, nihil sentiet mali: si ex eorum numero sit, qui d. sicut feriantur (quia scilicet vel plethorici sunt, vel vitiosi, siue cui prematur, vel acris sit sensus, vel bonum quodvisdam, omnibus prematur) primum quidem idcirco, post etiam si ipsi particula infestabitur, tum phlegmone. Porro in omni membro carnoso, quod lux rationis solutionem patitur, si rui, venae, & arteriae reperiuntur, quae praua quaedam accidentia inducere possunt, nempe dolorem, phlegmonem, sanguinis profusionem, conuulsionem, & id genus alia. Quibus summa diligentia medetum occurrere oportet. Occurrit aut. in facile, si ea praesenserit, & praecognouerit, ut primum libro praefationum sensus est. Hippocrates, ad hunc modum scribens. Nihil perinde medico conuenit: est ei quomodo 74*

ut sanata praesentat: ita enim (ut Galenus hunc locum interpretans ait) *de sanguine obusum si malis.* De sanguinis vlcere tractat, & de vlcere, quod itaque sanguinis missio conuenit in vulneribus potissimum magnis, id exemplo ostendimus, tum auctoritate Galeni & Hippocratis, observatione vnde de *cordis palpitacione in vlcere iunene*, qui post sanguinis distractionem a palpitacione curatus est, & postea minori periculo a vulnere quoque persanatus. cuius historiam reperies ad longum a me descriptam, lib. 17. obs. & curat. medicinalium nostrarum, obs. 1. praeter ea quae ibidem diximus: *Omnia recens facio vulnera, nisi in ventre sit, expedit* (inquit Gal. lib. 4. meth. ex Hipp.) *ex ipso statim sanguinem plus minusve effluere.* Qui propter hoc modo phlegmonem minus intrabit, tu vlcus ipsum, tum quae circa loco posita sunt. Itaque si medicum imitator esse oportet, non naturae tantum, sed subinde nos monuit Hipp. & dictum eo-

C 4 iam eo-

73 Quarta intentionis vulnerum curandorum, quae est substantia cohaerere.

In valueri-
bus in quibus
sanguis non
mutatur
esse.

Vulpera tri-
faria m. v.
gus reddun-
ter.

**Reassembling
the American
Jazz Standard
in Washington-
D.C.**

Sanguinaria
in vacuatur
ex parte tu
maribus and
Kary.

Lib. 4.
 100-101.
 So far as vi-
 dentur
 a. ad cen-
 traria rone-
 lendum.

മുൻപോട്ട് പോകാൻ
അവർക്കുവേണ്ടി
കൃത്യമായ അറിവ്
ആവശ്യം.

Vasa fuerant
da clibus ex
parte vob.
merito indi-
catur.

iam eorum, quæ cum sua sponte veniant, confertur in recenter autem acceptis vulneribus, præsertim magnis & prævalidis expedit (*vt diximus*) sanguinem effluere: his certe si minime, vel minus quam par sit, effluxit, quod deest, ipsi à diis oportet, sanguinem scilicet ex vena detrachere. Porro trifurium vulnera, & reliqua omnia alia vitæ, magna grauius redduntur, *vt Galenus lib. 4. method. medendi*: nempe vel propter afflicta partis præstantiam, vel propter affectus vim, seu magnitudinem, vel propterea quod sunt *cæcorie*, id est, maligna. Cuiusmodi sunt omnia, quæ cum in articulis accepta vulnera sunt. Hæc enim *ostrea*, *ingluarium*, *cavum fionis*, & *delirij* periculum adferunt, quod scilicet ibi tendones, & nervi, & carne vacua atque officiosa sunt.

Vulneris igitur magnitudo, vna cum virium robore, mittendū linguē indicat: quamquam quāsi vulneratus est. prorsus redundatū linguē sitis expers. Quo fit, vt in artis operibus virent, qui in sola sanguinis abundantia, ipsius detractionem consulunt. Porro nos linguē detrahimus in recentibus & nuper acceptis vulneribus, non solum ne pars laesa & circumposita loca (vt *superius dictum est*) phlegmone tententur, sed vt impetum quoque ruentis sanguinis cohibeamus, & nimium profuuium impediūmus: vt in rustico illo fecimus, cui circa Moſam flumē nobile (nimirum colocoque illud in mari se flumē) habitanti arteria in capite incisā erat, neque

pria cſi, obſcurior fuerit, & ad mediũ aliquam
aperiendum accedat, omnino tibi conandum eſt,
vt eam, quæ à propria diducitur, potius incidat.
Fit vero interdum, vt eas quæ inferiores ſunt
cubito iunctura, eas ſcilicet quæ in vlna cinnamũ,
nihil ſecare prohibet, vbi nimirum quæ in cubito
ſunt, non apparent, ſi d eas certe, quæ in r. cſũ
ſunt, id eſt, e directio fitz, & a venis quas in cubito,
ſi apparuiſſet, illoqui iſeraiſſis, diducit.
Porto quemadmodum prædictæ omnes partes,
vbi ſic vulneratae ſunt, vt ſanguinis, ob cauſas
ſuperius adductas, egent detractiõne, in cubito
ſi etia vena iuuantur, vt didicim eſt, ſic quæ reni-
bus inferiores ſunt, illis quæ per poplites & mal-
leolos decurrunt. A perpetuo quidẽ in omni-
bus, dũ ſic reuolllere ſtudes, aut vacuare & phle-
gmonem prohibere, vena, quæ e directio eſt, ſecun-
da venit. Manu tamen vulnerata (vbi eſt eandẽ

inopuerit pliegmore laborare) sanguine valenter ac nimis copiose in eam irrueat, cras quod e dicto est reuulsio nis gratia tibi scarificari debet. Altero vero crurum sic ex vulnere male habentes, reliquæ cruris scarificabis, aut in eo poplitis, aut maleoli venam scabis, vel ceteras (*ve carisulis Actius*) ex brachio quod e dicto est sanguinem detrahas. Si autem venas, vel partes illas diaceris, reccus vultu accipiet, quod sanguinis emissionem desideret, vel propter ipsius aff. ctus magnitudinem, vel ne pliegmore tementur, venam in cubito interiori incidet, debet, tametsi renes ipsi ambigant, quibus partibus, le prioribus ne, an inferioribus adscribi debebat, *ve Galeum annotat libro de tor ad ratione per sanguinis missione*. Verisimile enim est, plus sanguinis ad ipsos ex superioribus partibus, quam ex inferioribus confluere. Non negauerit tamen, quibus & ex curiibus sanguis commode detrahi possit. Ceterum in hac re tamardua, tamque magni in ate medendi mometi, nihil vinquam moliri debet chirurgus, citra periti alicuius medici consilium, vt iam alibi semel, atque iterum monuimus. Atque hæc de sanguinis missione dicta sufficiant: nunc de purgatione quoq; molienda in vulneribus dicamus, hoc duxat ex more nostro) interposito exemplo.

OBSERVATIO XVI.

*De adolescente sexdecim annorum, casu si ipsum in
pectore vulnerante.*

ADOLESCENS fixdecimannorum, famulus. **M.** Rugiter aduocatus Haghani, cum cultum abiq; vagina in laco sub viti habere, neque eius meminit, cum altero ad lecti. nec colluctans, se ipsum vulneravit in pectore, & lingua ad copiose & vulnera emanavit, vi chirurgi accitus vix compescere eum potuerit. Hac autem potione ebibita, cum metus esset fingimus in intus concretum latitare, per me & Conciatium Ericium, medicum Haghanum, descripta, optime habuit. *℞. folior. colubae 3 iij. infunde in aqua plantaginis, ruginis colubinae, kumel. catibendo (nam alius utique adstricta erat) & forti expressioni adde electuaris de jucco rosae 3 iij.*

- 19 Nuntiatio valde operatur aduersus iam funditus collapsa dirutaque aedificia.
- 14 Lites nonnulli contrarium velint.
- 15 Nuntiatio non tenet, nuntiator ubi super cassis, sue sibi prohibendi competere, litem esset contestatus.
- 16 Quamvis dissensiat Beroni.
- 17 Noui operis nuntiatio tollitur idonea cautione.
- 18 Modo nuntiatui se non offerret intra trimensem tempus de suo iure aedificandi vel le probationes perficere.
- 19 Declarationibus hoc ultimum explicatum proponitur.
- 20 Minori an detur restitutio aduersus lapsum trium mensium probationis & interpretanda cautionis praescriptum, licet sint contraria opinionibus, affirmatiue tamen concludit Fachin.
- 21 Noui operis inhibitionem per iudicem factam, postea cautione remissam, reuocari non posse.
- 22 Quam opus nuntians facultate, an fruatur emphyteuta, & an dominus duret ut ipse, remissum.
- 23 Num opus an recte nunties firmitatem habens remissum.
- 24 Num opus an denunciari possit in publico aedificanti, remissum.

effectus eo maxime tendere constat, quo & opera non perinanes denuntiationes (vt ipsissimis tex. l. vn. C. de noui oper. nuntiat. vetbis loquar) prohibeantur, & recte denuntiantibus consularur.

Conclusio est apertissimi iuris per t^{am} denuntiationem, siue iure, siue iniuria opus nouum fieret, inhiberi aedificationem. l. 1. in princ. l. prator ait. 20. §. interdictum. §. ait prator. ff. de oper. noui nunt. tex. c. 1. quod est, denuntiatione noui operis, siue iure, siue iniuria aliquid construatur, legalibus debet constitutionibus. de polit. ext. cod. tit. Et ex modernioribus conclusionem respondendo, post Crot. Iaf. Bald. Pract. Papienf. Flor. & Bar. nuncupatim induxit Io. Petr. Surd. conf. 121. nu. 16. Plures Dd. referre super sedeo, textus quum habeamus claros. Et per modum attentati destructionem post denuntiationem aedificatorum t^{am} iungi ex Baldo docet Lancet. trall. ardens. part. 2. cap. 20. limit. 22. num. 11.

Inferitur ex conclusione, vt adhuc nuntiatui ab aedificando desistere debeat, quamuis nuntians de t^{uo} iure non probasset. And. Fachin. controuerf. iur. lib. 8. cap. 44.

Declaratur illatio vera, quando nuntians esset dominus, vel saltem possideret: non vtrique autem, t^{am} vbi nec domus nec possessor esset. ex Alex. Surdus induxit. conf. 154. sub n. 23.

Declaratur item vt fallat in casibus, quibus ex t^{ra} legum praescripto aedificatio interdicta esset ad nos. Fachin. d. cap. 44. §. quantum argumentum inde ad fin. & huc etiam referenda est limitatio conclusionis prima.

Extenditur conclusio, vt opus, post denuntiationem factum, destrui debeat, etiam postquam lis super aedificationis negotio aduersaria contestata esset, & quidem ante omnia, priusquam, scilicet, de iure vel non iure aedificantis t^{am} per sententiam constiterit. Ita cum Menoch. Lancell. Spanochio & assentientibus statuit And. Fachin. lib. controu. iur. §. c. 55. aduersus Iason. suaeque opinioni ad stipulantes. Et est huius extensionis separatus casus ab eo, de quo m. 13.

CONCLUSIO XVI.

INTERDICTI, & de noui operis denuntiatione, & ad cautionem idoneam vel factam, vel oblatam, remissione, praxin, vt quae Doctoribus & commentatoribus diffuse luculenterq^{ue}, nominatim t^{am} vero Roffredo Beneuente. tract. ord. iudic. part. 2. rubr. de interdicto noui op. nunt. & seq. rubr. de interdicto, vt liceat aedificare, cum nuntiatum est, si satis dederit. Specul. tit. de non. oper. nuntiat. Pract. Papienf. in forma libelli, quo agitur ad denuntiationem noui oper. Ioan. M. Oldendorp. in progymnasmo. ait. Ioh. Iaf. 2. tit. 7. proposita sit, haud referendam seu transcribendam duxi, sed saltem denuntiationis, & e contra cautionis effectus principaliores notabiliorique subicere statui. Vtriusque enim

Declaratur conclusio, ut noui operis
 8 remedium duntaxat competat aduer-
 sus ædificationem futuram non iam sta-
 tam. l. 1. §. 1. ff. de op. nou. nunt. in terminis
Wesemb. conf. 34. n. 51. & 62. in terminis item
*Marani. conf. 56. n. 3. Dambrund. in prax. ci-
 uil. cap. 15. vers. non itaque operis nuntiatio:*
 Plures qui cernere auctores, copia
 est Causa Fruiz *decis. 23. n. 16. part. 2.* quos
 citare esset frustraneum, quâdoquidem
 & hic perspicui sunt textus. ad notas in pro-
 am. n. 6.

Declaratio hæcce fuit effectu est etiam
 plurimum notabilis, eo, quod ea dunta-
 xat veniant demolienda, quæ post nun-
 tiationem factam ædificata essent, non
 9 † quæ ante. *in xia. d. §. l. 1. ita tamen, ut nū-
 riator pro demolitione instans, quid fa-
 cta nūtiatione super ædificatum sit, pro-
 bare babeat † necesse. firmas Borg. Canale.*
Finiz. decis. 23. n. 17. part. 2. eius etiam opi-
 nionisprehenditur Olded. *claf. 3. art. 7.*
vers. hoc opus it probare auctorem.

Limitatur iam conclusio primo, ut im-
 pune nuntiatus spernere nuntiationem
 possit, quando de non iure nuntiatoris
 11 † notorie appareret. *Dn. Gail. n. 4.* Acce-
 dit auctoritate ductus Abbar. Barr. Iaso.
 Patif. Ruin. Cror. Dec. Socin. iun. Span-
 nochii Senens. Bologn. Bald. Berol. &
 Ploti, Alexander Raudens. *respons. 24. n. 12. vol. 1.*
 quam limitationem veram & communem ex
 Crorolaudat Ioan. Petr. *Surd. conf. 154. n. 20.* Confert declaratio
 supra sub n. 6. relata.

Limitatur secundo, & Ratuendum
 remedium noui operis nuntiationis ad
 restorationem & refectionem ædificii
 non pertinere, quin potius facta nuntia-
 12 tione nō obstante adhuc impune † nun-
 tiatus ædificium restaurare queat. *text.*
express. l. 1. §. si quis ædificium vetus fulciat. ff.
de noui oper. nunt. & Raudens. ex Remigio &
Brumo induxit respons. 16. n. 27. vol. 2. Ma-
 ranta etiam recipit *conf. 56. n. 4.*

Declaratur limitatio, ut locum sibi
 non vindicet, quando ædificiū iam ante
 13 fuisse funditus collapsū † destitutum-
 que. Eo enim casu nuntiatio teneret. E-
 iusmodi declarationem, sequutus Ca-
 Arenf. Alex. Ias. Alber. & Afflictus, in

facti contingentia respondendo stabili-
 uit Ioan. Petr. *Surd. conf. 121. numer. 22. 23.*
 24. & diserte etiā ex Decisionibus neote-
 riticis eandem recepit, rationibusque fir-
 mare adnūsus fuit, Marc. Ant. de Amat.
 Rot. Prominc. Marc. *decis. 64. numer. 38. inde ad*
nn. 44. Hoc idem ex Alberico (qui Me-
 diolani ita IUDICATVM existisse asserit
in l. 1. de nou. op. nunt.) & Iafone pro firma-
 mento statuit Academ. Ingoistad. *conf. 2*
*sub n. 27. de uerborum tom. 1. apud Stein. nou-
 ter Francos. impress.*

Contrarium † aduersus declarationē 14
 autumat, referente etiam eodem *Surd.*
d. loc. Bologn. in l. qui viam 14. ff. de nou. oper.
nunt. quo & Maranta conf. 56. sub nn. 4. vi-
 detur inclinare.

Limitatur tertio, ut fallat conclusio,
 quando nuntians lire iam super † causa, 15
 sibi nimirum ius prohibendi compete-
 re, contestata, iam primum nuntiatione
 non fecisset: tunc enim nuntiandi ius
 non esse, atque proinde post nūtiationem
 non destrui, asseuerat in facti terminis
 allegando Bald. & Ias. Ioan. Petr. *Surd.*
conf. 154. n. 22.

Betoum, *quest. fam. 3.* dissentientem,
 † sibi libus vitundamentis, idem *Surd.* 16
d. conf. 154. n. fin.

Limitatur quarto, ut inhibito noui
 operis cautione idonea vel facta, vel obla-
 17 ta remissa † seu perempta existimetur. l. 17
prator ait 20. §. 1. ibi vel vice nuntiationis
missa satisfactio de opere restituendo fuerit in-
terposita, & §. si quis. ibi. si quis paratus fuerit
satisfacere. deinde actor stipulari nolit, in
 ea causa est, ut remitti debeat. *ff. de noui*
oper. nuntiat. l. stipulatio. si. §. 1. ff. cod. cum
concordans.

Declaratur limitatio, ut nō obtineat,
 quando nuntiator replicando se offer-
 rer, probationem sui iuris intra trium
 mensium spatium perfecturus: hæc enim
 † oblatione facta, videtur nuntiatio, non 18
 obstante cautione ab ipso, de opere, si
 non iure ædificatum existerit, demolien-
 do, oblata, intra trimestre hoc tem-
 pus in ædificando petgendū neuiquam
 esse. *text. in cap. fin. de oper. noui nuntiat.*
 Quo etiam facit *l. v. C. eod.* & spectant
 scripta Dn. Gaillii. *num. 17.* Declaratio-

& magni nominis, sub Carolo v. Imperatore sup-
pedita faciens, mihi dedit, quo scipsum apuc-
nibus annis semper militiam sequebatur. nunc
senior factus curauit, quocumque modo la-
sus esset, & alios quam plurimos, nullo alio
utens remedio, vt ipsemet mihi referebat: imo
tantos illo exorcismo curauit, vt ad aures Cae-
saris valde catholici, perueniret: etiam milites
quocumque modo perfollos vulneratos, ab al-
lis medicis & chirurgis pro deploratis habitos,
quos ipsi curare non poterant, ille curabat: ita
vt Imperator eiusmodi curationes impias eidem
interdixit: neque ego, quamquam ceremoni-
as quibus utebatur, simplices esse videbantur,
tamen quia idololatriæ erant & interdictæ, ac
vix pietatis, religionique: Christianæ aduersan-
tes, hoc remedii genere (licet is mihi hoc dede-
rit pro arcano,) vnaquam vti volui, sed potius

83. alius curationibus, medico Christiano non pro-
hibitis. Sed vt redeamus eo vnde digressi sumus,
quod ad potiones vulnerarias attinet, etiam
nunc docti quidam iis vtuntur, quamuis addi-
bita meliori cautione quàm Empirici facere con-
sueverunt, qui indiscriminatim iis in omnibus
vulneribus vtuntur, qualis est hæc potio, con-
ferens vulneratis & contusis siue intra lætis, quæ
& separat sanguinem coagulatum, & inhibet ne
ultra alius sanguis in eodem coaguletur: R. *fyr.*
acetosi simplicis 3j. *aq. plantaginis, echinorea* ana 3
q. busimmissæ 3 j. *pd. infra scripta*, & fiat haustus
sumendus bis in die, R. *mummiæ, boli arm. ana* 3
j. rad. rubia maioris 3 *℥. rad. pulvis cribro tenuis*
sinio exceptus, minus tamen conuenit rad. *rubia*
trinit. si fibris adest. Sed & sequenti potu vul-
neratis quidam in pectore cum globo vel in-
strumento quodam Brandareo dicto a vulgari-
bus, curatus fuit: R. *solor. artemis. f. ac. consolidæ*
maioris, bugle, vngula caballina, hyssopi, cantium rub.
bor. ana m. j. & iij. vt libet, coquantur in vino &
aqua, addendo in fine mellis, q. s. & fiat potus.

Hæc autem potione vulneraria Dux Geldria v-
tebatur sæpissime: R. *solor. agrimonie, artemis.*
ana m. j. consolidæ maior cum rad. solorum salua
agrestis ana m. j. decoquantur in quarta (est po-
tule mensura) *vini cherevisi*, ad consumptionem
tertiæ partis, & detur mane & sero. Potiones ad
vulneca penetrantia & fistulas. Arnoldi de Villa-
noua: R. *pimpinellæ, absinthij, acacia, betonica, vi-*
træque plantag. ana m. j. coquantur in lib. 4. *vini*,
ad lib. ij. deinde addatur mel: sumatur cyathus
vni mane & sero. Vel fiat porio ex succo *beto-*
nica, marrubij, agrimonie, mellei q. iij. *vini, fenatu-*
rum, & de rad. eorundem, & fiat potio cum melle.
dehinc fistulam intra x. dies. si ex ea quotidie
sumatur cyathus vnus. Vel R. *casd. rub. rubia*
trinit. sem. cannab. ana 4 *℥. iij. vini lib. ij.* mellis lib.
lam. & ossa g. bulliant simul, & quotidie sumatur de vino
istoc cyathus vnus: dehincabitur fistula, & breui
liberabitur. Alia potio mirabilis, quæ dicitur
fistulam curare & ossa fracta de vulneribus pro-
ficere: R. *valeriana, cantium rub. fragaria, ab-*
rotana, tanacetis summat. & rad. *lapidibz acuti,*

tormentilla, rubia trinit. plantag. lanceolata, sma-
myse, vtriusq. garyophyllata, cardus benedicti ana
m. j. sem. fene. apij, petros. ana 4 *℥. sem. cannab.*
lib. 4. grosso modo puluerizata coquantur in
lib. x. *vini albi* vsque ad consumpt. mediet. ad-
ditis lib. iij. *mella* fiat apozema, detur quolibet
mane & sero cyathus. etiam hoc addunt, si ex-
periri velis num fistula, vel vulnus antiquum sit
curabile: R. *plantag. vtriusque, ped. columbini,*
calendula, consolidæ maioris, mellei q. iij. *primula ve-*
ris, valeriana, lapidibz acuti ana m. j. exsiccat o-
mnia, & puluerem conficito: de quo agro mane
meridie & sero quantum tribus digitis excipi
potest, exhibeatur. si statim cuomat, est incu-
rabilis. Sed & hæc potio, mirabilis ad vulnera
interna valere dicitur: R. *agrimonie, pimpinellæ,*
foliorum olea, centaury, minor. stachad. arab. sal-
via, pistilla, vtriusque consolidæ, arctoglossa, fana-
mundæ, id est, garyophyllata, rubia trinit. ped. co-
lumbanigallæ & *li. adunth. tanacetis, lingua anas, he-*
dera terrestr. fragaria, buglossi, gentiana, betonica,
verberna ana m. j. bulliant in tribus quartis vini,
ad quartam vnam. postea adde mellis 4 *v l i i.* co-
lentur in modum claretii. Alii conficiunt ex *py-*
rola, betonica, garyophyllata, consolidæ, diabolæ mor-
sis, saucula, bugle, peronica, in ceruina, vino aut
aqua, in duplici vase, cum melle: alii ex iisdem her-
bus succum extrahunt, & cum *sach. aut melle* fyr.
optime conficiunt. Sed hæc sunt de potionibus
vulnerariis. Restat, vt nunc victus rationem
adiciamus vulneratis obseruandam. Vulneca
præmis septem diebus (intra quos ut plurimum ob-
securo esse solent a febre & inflammatione, vt & *Gus-*
do de lissimis annotatur, quem in omnibus sequens
est *Taquandus*) victum tenuem & parcum, frigi-
dum quoque, & humidum, præsertim si iuuenes
& plethorici fuerint, atque ambiens aer calidus,
inilituto. Vigum omnibus, dum febris, dum
inflammatio est, interdicto. Egregie ob hoc
etiam errant Empirici illi circumforanei nebu-
lones, & quidam imperiti tonsores chirurgiam
perperam facitantes, qui & subricantibus suis
vulneratis pouones vulnerarias ex rebus calidis-
simis in vino decoctis quotidie exhibent, & ita
febrem augentes, tum inflammationem, mor-
tem deinde sæpius accerunt. A carnibus duris
& valentibus, piscibus magnis, & prauum suc-
cum generantibus pane non fermentato (quem
et *ymum* vocant) male iubaeto & improbe co-
cto, eos arceat. Caieum, præsertim salum & vec-
trem, fructus fere omnes, allia, capas, sinapi,
salita omnia, & acris, nec non species omnes aro-
maticas, ne gustent, admoneto. Perices autem
pulsos & auiculas, quæ in dumetis vertant solent,
aqua rosarum alteratas: *psisanam* hordæcam,
quam vulgo *hordæcam* & *hordæcam mundatam*
appellant. item lac amygdalinum, & quod æu-
narum vocant iura quoque carniū simplicia, 85,
aut cum ouis preparata, illis in ebum permitti-
to. Ex oleibus *lacticam, portulacum, beraginem* Olera
(quæ *buglossa* est hortulanarum) præterea olus
quod Arabes *Asspanax*, nos vtro nomine parum
mutato,

Vulnera ex-
ternis et
internis.

Potio ad
vulnera
& contus.

Potio vul-
neraria Du-
xi Geldria.

Potiones ad
vulnera pe-
netrantia &
fistulas.

Potio mira-
bilis ad fistu-
lam, & ossa g.
fracta vul-
neribus
pessent.

Dracena
vulsi in
vulnibus
& contus
solent ob-
seruanda, a
medico pra-
scribenda.
Vulneca
trinit.

Carnum.

Caieum.

Aromata.

Auiculas.
Psisanam
hordæcam.

Olera.

talcimpofuit, conftans ex *aceto, melle, lixinia* quafimvl bullitis. deinde ab igne remotis. addēdo farinam fabarum ad fufficientiam: & aliud emplaftrum fimple huius fupra locum circumftantem pofuit. Vltimo ligauit cum fufcia ligatura conuenient. Sed ob virtutis debilitatem prafcriptis vitium paulo pleniorē, fcilicet panem coctum in iure carnis, alteratum cum lactuca, opphacio & vitello oui: & vt aluum exoneraret, fuppolitoria prafcriptit. In quarta vifitatione medicabatur cum flucilis madefactis in oleo fuo hypericonis, oleo rof. & abietino fimul mixtis. Deinde emplaftrum pradiatum appofuit, & locum circumftantem oleo rofato inunxit, & emplaftrum fuperius quoque dictum fuprapofuit. Deinde prafcripta dixtam paulo tenuiorē, vt pote panem coctum cum iure, abfque ovo, alteratum fem. *aceof. florit. borag. & buglofa.* & quia ventrem non deponēbat vulneratus, leniente chlyfteri vfus efl: & pro febre prafcriptit fyr. fequentem: *Re. fyr. de end. ℥j. mellis rof. ℥j. aqua end. boron. cubor. ana ℥j. msc.* In quinta vifitatione vt in quarta proceffit: fed tamen flucellos vnguento ex *cera, terebinth. oleo rof. maffich. & pul. lumbriarum* in vino lotum parato, illiniuit, & eodē oleo rof. vt fupra inungit. Poftca prafcriptit & tale enema: *Re. caftor. pro chlyfteri ℥j. mellis rof. ℥j. r. cocch. rub. ℥ij. olei viol. ℥ij. vitellum oui n. m.* j. lulis parum, cum decocto *ma. ua. bor. viol.* fiat enema. Tercio die, hoc efl, fexta & feptima vifitatione, eodē quali modo proceffit: nifi quod poftis flucillis addidit peciam illinitam pradi. to vnguento ex lumbri- cis. Quarto vero die parauit digeffium ex oleo abietino, vitello oui: & pofuit fuper flucellos, illinitos tamen prius vnguento ex lumbri- cis. Dixta fuit fuperius dicta. Digeffio aliquo modo vulnere, tale vng. prafcriptit: *Re. terebinthina lb. ℥j. mellis rof. ℥ij. farina borac. ℥ij. myrrh. farcocolla ana ℥j. cum vitello oui fiat vnguentum:* quo vnguento folum flucellos feu linamenta, dimiffo oleo hypericonis & vng. pradi. to ex lumbri- cis, illiniuit, & fuper flucellos pofuit peciam vnguento ex lumbri- cis illinitam, & fuper hanc emplaftrum confuetum. Dixta & enema fuerunt vt fupra. Et fexto die loco emplaftri fupra tibiam & coxam pofuit lanam fuccidam fupra tclam tomentatam, feu interbaftatam vt vocant. Septimo die eodē modo proceffit: fed omifit emplaftrum. Octauo vero die prafcriptit talem medicinam: *Re. mauna cilella ℥j. r. rhab. optimi ℥j. fucca gr. iiii.* diffoluantur in *aq. end. ℥ij.* & cum modico vini fiat potus. Dixtam vero craffiorē & pleniorē pro- cedente, & folita conceffit. Deinde lauabat vulnus vino maluitico calido: & poft lotionem impofuit ciftullos illinitos tali vng. *Re. terebinth. ℥ij. olei myrrini ℥j. cera, vernicia ana ℥j. gng. drac. 3. r. boru. maffich. ℥ij.* fiat vng. Supra peciam vero pofuit vng. *baftica mauna:* & fic proceffit per aliquot dies. Cum iam vulnus carne repletum eflct, vtebatur vnguento tali cicatricem inducēte: *Re. oleo rofati, fem. caftreana lb. j. terebinth. cera, luhurg. ana ℥j. cerufa ℥ij. r. boru. ℥j.* fiat vng. Et la-

uabat vulnus vino aluminato. Deinde vtebatur vnguento de calce, aliquando de *chylburgis*, modo vno, modo altero: lauando vulnus & pedem cum vino, in quo bullierant *rofa & myrr.* Et aliquando etiam vtebatur vnguento de cerufa cocto & crudo. Vnguentum autem album ex cerufa ad cicatrizandum hoc modo fit: *Re. oleo rof. lb. iiii. fem. caftreana lb. iiii. terebinth. lb. ij. cera aialb. j. r. boru. lb. ℥j. cerufa lb. ij. mife.* & fiat vng. Eo cocto vel crudo vtebatur: & fuper vulnus fpergebatur alumen vftum. Et fic, Deo dante fuccellum, curatus fuit.

SCHOLIA.

PERVENERAMVS ad quintam intentionē, quæ medico chirurgico proponēbatur in cran- dis vulneribus, quæ erat fymptomatum cor- rectio. Quintam itaque intentionem (*infequen- do veltigia pffius Guidonis*) quæ efl accidentium vulneribus fuperuenientium correctio & pro- fligatio, afequimur, remedia cuiq; propria, pro- ut res defiderat, admouēdo. Symptomata autem feu accidentia, quæ confueuerunt cūenire poft accepta vulnera, & folutam vnionem, hæc fere funt: *Doler. phlegmons, dyfcrafia feu intemperie, febris, prius, conuulio, paralyfis, fyncope, mentis alienatio, feu deliriu, durities atq; impotentia mēbris vuln- neratis.* Itaq; vulnera nunquam ad integram curationis fæpe peruerunt, immutant, atq; in- terpellāt, vt *lib. i. ad Glancon. & 12. methodi m- dendi Galenus* annotat. Itaq; operæ pretium du- ximus de horum fingulis ordine (*vt Guido fice,* & poft eum *Tugantius, qui ipfum Guidonem Latiniorem reddidit*) & continuata ferie pertrahere, a dolore fumentis initium, cum vulneratus hic, de quo exemplum attulimus, dolorem magnum in pede vulnerato habet: ac offendimus quo- modo Carpus dolorem illum cum oleo rofato aliiq; fedauit. De fedando igitur dolore in vulneribus, dicamus. *Dolor* omnīs, præfertim vchemens, etiam fi purum ab excrementis totum corpus fuerit, fluxionis caufa efl. Particula nã- que, quæ dolore affligitur, fuccum, atque in vul- nere languinem maxime ad fe trahit, copiofo- rem fcilicet, quam fit illi ex vti: vnde & phleg- mone in ea frequenter excitatur. Proinde fuma cura protinus adhibenda efl, vt dolor demul- ceatur, ac in totum, fi fieri pot efl, fedetur. Dolo- rem autem eodem modo fedamus in vulneribus, aut faltem mitigamus, facto ad particulam lafam fo- tu, vel ex rofaco, fi praflo fuerit, vel, fi eius copia non fit, ex oleo cōmuni quod modice inaleurit. Quibus fi non candidū, vel potius luteum (vbi ma- gna non fuerit inflammatio, feu vehemens cali- ditas) adiciatur, præftantius illud adhuc auxilium efficies, neque ita vulnus inquinabis. Quod fi tam vehemens dolor exfliterit, vt neceffitate coactus fueris, aliquantulum vulneratum ac do- lentem particulam flupescere, oleum *papaueris* admouebis. Et fi maior cogat neceffitas,

De quinta intentione, qua medico chirurgico proponatur in curandis vulneribus, qua est fymptomatum correctio. Symptomata, quæ vulnerati accidunt.

20 Symptomata, quæ vulnerati accidunt, quæ efl fymptomatum correctio.

Symptomata, quæ vulnerati accidunt, quæ efl fymptomatum correctio.

De fedando dolore in vulneribus. Dolor phlegmons, & fluxionis efficitur.

Dolorem fedando in vulneribus.

optimum mentum, vel mandragora (ve quidam recte confiluerunt) iudicis. Quatuor illi celebres magistri ad eum finem laudant *radicem filani* tritam, & *anagallis porci* excepta. Theodoricus plurimum commendabat emplastrum ex *filis malve collis*, & *en mortari* incutitur, cumque furfuris entibratur commixta. Quod si rofici momentum prædictis adieceris, melius adhuc medicamentum reddideris. *Medula* etiam panis tritici in aqua fermenti macerata, ad sedandos dolores (*ut supra diximus*) si caciissima est. Porro si dolor admodum vehemens est, nec vllis quantumvis generosis auxiliis mitigatur, vel nunc tunc lasum esse significatur: proinde tunc ad ea quæ postea ad vulnera nervorum scribentur, tibi et currendum erit. Sed de his, quæ dolorem leniunt si placet desideres, vide *lib. 6. Tagaeni*, de materia chirurgica. Sed nunc ad curationem aduersus vulnerum inflammationes & abscessus veniamus.

Inflammatio in vulneribus, tum maxime timenda est, cum vel os, vel nervus, vel cartilago, vel muscularis lesio nem accepit, aut vbi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem mature suppressere non oportebit, sed pati fluere, dum tutum erit adeo ut si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat: utique *inquat Celsus lib. 5.* si corpus iuvenile, & robustum, & exercitatum est: multo que magis, si id vulnus ebrietas fecit. Quod si nimis fluxus videbitur, præcidendus erit. Nā periculus pñctusve, præsertim in eius capite, mortiferus est: præcisus vero per tracheæ, sanitatem recipit, hoc est, ab inflammatione & consensione vindicatur; aliquis tamen ex particulæ motibus vitabitur. Verum melior est (*ut Galenus ait 3. Methodo*), laqueo quam mors. Sic & nervum punctum sæpe cogimus transcurrere præcidere, quoties scilicet, vel consensiones, vel deliria, vel ambo magna & grævi sanabilia insuperantur vulneratui cerni ius. Porro, si iam inflammatio, aut tumor aliquis præter naturam, in vulneribus concitatus fuerit, curari debet iuxta methodum de phlegmone a nobis additam, scilicet *libro primo Observat. Chirurg.* in quo de tumoribus præter naturam sanguinis abunde disseruimus. Ceterum tamen si pro locorum differentia (*ut lib. 4. de loc. affect.* Galeni) curationem quoque variari contingat: Auicenna tamen omnibus discriminatum partibus, & capite ad pedes, emplastrum mirabile eo commendatum, & monet, quod consistat malo punico dulci, incotto in vino styptico, & postea in mortario subacto, atque in emplastri formam redacto. Ceterum si enatus tumor nec reprimentibus, nec per halitus digerentibus, medicamentis cessit: ipso momento, seu maturantia, ad mouenda erunt: cuiusmodi ea sunt, quæ de tumoribus præter naturam agentes, ad maturanda apostemata vtilia esse, supra retulimus. Huius rei gratia iubet Rogerius fieri scutum ex *malua*, *abjunctiva*, *artemisia*, & *forma trinita*, vna uncia illius: quibus & mellis momentum addiciendum est, axungæ vero quod satis est, vid. bitur. Quod si pars

per vulnus vacuetur, aliud loco commodiore illi emolliendū erit emollitum, ut exempli in *Ægidio* illo in abdomine laeso, cui perperam chirurgus omentū elapsum per vulnus abscederat sine ligatura. Sed de tollenda in vulneribus interperies, quam *dysserias* vocant *calidæ*, quæ vulnus occupaverit (*quæ ex robore & vesicatione facile deprehenditur*) aliter si locum in frigidare oportet, non hyosciamum quidē, aut mandragora, quoniam plus iusto refrigerant, sed *rosæ potius* & plantagine, atque vnguento albo, quæ præter id, quod delescant, moderate etiam refrigerant. Si autem frigida interperies locum obsederit, quam molliorē, & cutis humidus color ostendunt ipsam excalfaces, *noo rosina*, vel *pecaut asphalti*, (quod *Damianus* *ioduri*, *stereus* appellat) sed *vina & vnguento nigro*, aut *susca*, vel eo quod *basilicon* vocat. Quod si eiusmodi symptomata vulnus, seu plaga degenerare faciant in vlcus, recurrendum erit ad ea, quæ de vlcere sequente libro traduntur. Porro si burnida vel sic adfuerit interperies, suo quoque contrario profigienda erit. Etia in compolis interperiebus ages, ut *suo loco postea dicetur*. Quod si febris vulneratum apprehendat, vlcus reingrante, qualem in calidis præter naturam tumoribus descriptimus, laboris vti debet. Sed accersendus erit huius rei gratia peritus aliquis medicus, qui & congruam illi victus rationem præseribat, & reliqua aduersus febrem auxilia ex arte instituat, habita ratione ætatis, temperaturæ, regionis, temporis, consuetudinis, & id genus aliorum. Ceterum ne febris quidem ipsa terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa vero perniciofa est Celso (*lib. 5.*) quæ vel leui vulneri superuenit, vel vitra tempus inflammationis durat, vel delirium mouet, vel si oris rigor, aut distensio, quæ ex vulnere orta est, cum non finit.

OBSERVATIO XII.

De quadam vulnerato in cubito brachii sinistro, totum ei cum suis nervis incisum esset, & ex dolore metus esse de spasmo: Jacobo Carpo.

ON 11. is studiosus Mantuanus, anno 1724. die 13. Martii vulneratus fuit circa cubitum brachii sinistri, ita ut totum os cum suis nervis incisum fuerit: unde & ex dolore nimio metus erat de spasmo. Carpo vocatus, in prima visitatione reducto osse ad suum situm seu locum, & tuto vulnere, appositisq; medicamentis, nullo fieri phlebotomiam diueritiam. In secunda visitatione tetras & pecias infusus in oleo suo hypericoos vulnere apposuit: deinde super futuram hunc palutrem aspergebat: & *thuris, mamma, sene, dracena, boli arm.* mixtus ana *pa.* Postea cum oleo rosato totum brachium inunxit. & modo de spasmus fieret, oleo libricorum, quæ & ego vti soleo. Et brachium cum astellis plumaceolis esse stupam in quodam instrumento ligneo, pluribus toraminibus perforato, locavit, & firmavit. Deo de prescripti styli upi sequentem: & *fr. di. end. j. j. jr. rel. 3. laquear. erd. cuboreæ, emplasti ana 3. j. melle.* Omni die exhibuit remedia càmune. Dieta erat subtilis,

*Emplastrum
Theodoricus.*

Rosaceum.

*Medulla
panis.*

*Inflammatio
quæ
nervum
vulnerat
vbi accedit.*

*Si, si, si
laqueo quam
mors.*

*Emplastrum
Auicenna
ex malo punico
dulci.*

92

[illegible]

SCHOLIA.

Qui in fit spasmus seu convulsio, & quibus causis fiat, & quibus signis internoscatur, & quæ eius sint præagia, abunde diximus in *Scholiis Obs. 18. de convulsione universali, lib. 1. Obs. 1.* *Observationum medicinarum nostrarum, in quibus Scholæ hæc etiam offenditur quod convulsio, quæ fiat ex vulnere, fiat per consensum, cum necros ipsos attingat, ut §. ap. 2. & a. method. quæ, declaratur, cum inflammatio nervos attingit, putredo oritur & intemperies, quæ cerebro communicatur, & quia convulsio nec ex vulnere eiusq; causam & curationem recte & abunde explicavimus observantia 23. eiusdem libri, de convulsione ex vulnere, præsertim in *Scholiis eiusdem obs.* non opus est eidem repetere, quibaddere posses & catum illum de convulsione lethæta casu ab alto, descripta *obs. 24. eiusdem libri* adeo villi, quæ de convulsione vulneris? Tagautius ex Guidone, tum aliis mutuavi, hic non opus sit refricare: nã omnia fere locis iam citatis ad vnguem enucleavimus, etiam additis exemplis. Hoc tantum addidit, quod in spasmis sicco convenientiori curatio est, *testis Aesculapi, ipsa tina, et inunctio olei humidæ* & tunc confertur balneæ ex oleo & hydreleo, partesq; convulsæ ex calido foueæ: uti Lucretia ex bord. in d. viol. nenuph. & similib. & in quibus capita ex extre-*

mitates agnoscant, hederae, vitulorum & arietum, pinguium, & adhuc althaea rad. & cydoniorum semen incocta sint, cum olei parte. & a laucacris inungendo oleo viol. amygd. dulc. oleo communis, adipis recentis gallinae, hedi, vel vituli: tum ceruix, spina, & scapula inungenda. Sed *bordeum, felis filia & nonapharia* magis conueniunt, ubi febris addit. Alimenta sint forbitiones ex chodo, *Alimenta.* alba, lacte bordeate, pulvis molibus, agnicis, hedi tenuioribus, iure aliquo affusis, item omnia frivola. Somnus conciliandus. Indendi clysteres ex lacte, & ex eodem conficienda gargarizata. Aegritamen illi curantur, ut 7. method. docetur. Si sit plenitudo, vacuatio a toto corpore conuenit, & sanguinis missio. & caecochymia tollenda p purgatione, & viscosi humores euacuandi cum hydrae pectoris, agarici: ideoque clysteribus acribus alius subducenda. Menfes quoque, si mulier est, pessis, & suffutibus euocandi. Gargarismi, apophlegmatismi, erethina, & sternutamenta acriora adhibenda, quaeque pituitum per os & nares educit. Abundant repurgato corpore, ceruicem, axillas & inguina oleo lili, castorei, flicato, laurino, ex pulg. addito caeteros momentis, & euphorbis inungito: & laenam mollem ac succidam facto litu superimponito. Probat ur vng. Rogerii etiam a Guidone, & Tagautius possunt olea haec iuvare: vulpinum, laurinum, ruscaceum, chamacelinum, de sinipero, & terebinthina, benedictum oleum plumbisporum: stuporib, & quaeunque sudorem euocant; multitudine, thormica. Cauendum frigus: ideo in conebui calide manendum. Vinum per initia minime gustandum, eo quod fluxione inpropter: sed cinis loco mulsa bibenda, in qua decocta sit, felina, radus acori, cum momento nucis muscatis. Victus tenuis sit, primis saltem diebus, calfaciens, & exsiccans. Conuulsioni per societatem, ut a dolore, anodyna & sedantia dolorem administranda, ut dicetur de vulneris neruis. Si ex morfu sit, vel alicuius venenosi animalis, conuulsio oborta sit, theriaca parti affictae apponenda erit: & cubitula designanda: quorum quaedam, quibus nonnulli cucurbitularum vice vtuntur, extrahunt & euacuant, sunt & qui ore virus extrahunt, vt diximus. A stomacho, ab aciri humore erodente fit fiat conuulsio, vomitus irritetur, & stomachus roboretur intus & exterius. Porro in omni conuulsione, a quacunque causa, cerebrum semper roborandum: ideoque caput abrasis crinibus oles libacis fouendum: similiter ceruix, tota spina dorsalis, axillae, & inguina inungenda: hoc enim spasma conuenit humido. Hora paroxysmi bonum est, vt laborans contineat inter deutes vimē seu baculum salignum, ne os plane claudatur, atque lingua a dentibus mordatur, aut dilaceretur. Vitium est, si nihil aliud fieri possit, vt necrum, iam mufculum, ex quo conuulsio orta est, transferueris praecidamus, vt Galen. & Razo conuulsiuunt, praestat namque vnius particulae actionem amittere, quam totius corporis. Meliorque est, (vt Galen. ait) lesio quam morus. Itaque hoc patet quidē conuulsioni esse sanaueris: alique tamen

*Communifit
ex mandatis
que con-
mendant.*

Musculi
ant. nervus
interdū per
transversum
præcedens.
Lasso quam
post. possum
operanda.

ex parulcul motibna vitiaueris. Vt autē ei quod vrgeret, & vnde primum maximumq; homini imminet periculum, succurramus, cogimur sic nōnumquam alium insauabilem affectum relinquere.

OBSERVATIO XX.

De paralyssi pollicis & ex incisione musculi:

Laurentius Brunneck.

QUIDAM cum motum pollicis perdidisset ex incisione musculi, vsq; adeo, vt nullam potentiam in pollice haberet, Laurentius Brunneck chirurgus doctor sequens ceratum admonit: *Re-mediūlagenui sem. lina. ad alba ana 3. ammoniaci, serapii, in vino albo per nallēm dissolutorum ana 3. f. thuris, mastici ana 3 ij. olei vniū 1 j. cera 2 lb. fiat ceratum secundum artem, de quo vnguento paululum extendatur supra corium, ad quantitatem membri lassi. Quo remedio melius se habuit vulneratus.*

97

SCHOLIA.

POSTHINC exemplum egregium cuiusdam correpti paralyssi ex icū & vulnere in capite & in ceruice, cuius deinde manus perpetuo resoluta fuit. *lib. 12. obs. 1. curat. medicinalium nostrarum, obs. 1.* Duo quoque exempla posuimus illorum qui ex icū teli alio in caput, etiam pericranio vulnerato, in apoplexiam leuem, & deinde in paralyssim deueniunt, a qua tamen postea per se diuina grātia curati fuerunt, vide obs. 29. *lib. 11. obs. 1. curat. medicinalium nostrarum.* Habes & mirabilem casum illius testoris, qui cum in pollice se ipsum lauciasset, incidit in paralyssim linguar, & obmutuit: a qua tamen nostra industria egregie sanatus est: vide huius historiam *lib. 12. obs. 3. obs. 1. curat. medicinalium nostrarum.* Paralyssis autem, vt locis citatis, & praesertim *lib. 12. c. 12.* diximus, id est, *neruorum resolutio*, latus vnum aut alterum, vel partem quampiam, nō autem corpus totum, infestat plerumque: interdum etiam vulneta, & contusiones insequitur, (*ut in illis exemplis supra citatis ostendimus*) sed capitis maxime, & totius spinar dorsi, vt multis exemplis Galenus aperuit, *lib. 3. de loc. affect.* Ad de causis aliis tum signis ac praesagiis in propriis locis, tum citatis diximus. Sed quod paralyssis sit agre sanabilis, iam etiam recensuimus, deinde quod senes vix vquam a paralyssi liberantur. Tremor quoque & febris si paralyssi superuenerint, bonum, & quae ab icū vel casu non vehementer neruū atterente, contundenteve excitata est, curationem interdum recipit, vt Pausanias Syrophiastē apud Gal. *sub finē 3. de loc. aff.* Sed ab insigni & effatu digna neruorū contusione vel diuisione orta paralyssis, prorsus insanabilis est. Recte quidem & conformiter ad Galeni sententiam Auenzoar adstruxisse visus est, subitae mortis periculum imminere, si nerui anhelitus, hoc est, respirationi seruientes, aliquibus vulnerati, aut quouis alio modo insigniter affecti fuerint. in ipsa n. statim perit respiration, quo fit, vt p̄socrati repente moriantur. Si membrū resolutum non imminuatur, nec emarefcat, colorque eius non immutetur, spes aliqua curatio-

nis subest. Si vero contabescat, & gracilecat insigniter, colorque natiua pereat, atque a seipso plurimum euariet, malum portendit. In curanda autem neruorum resolutione (quae paralyssis dicitur) ex accepto vulnere, vel causa alia extrinsecus incidente oborta, praemissa totius corporis vacuatione, vel per purgantia medicamenta, vel per sanguinis detractionem, vel per vtrūque, vt res exigat, facta item, vt decet, humorum in partem resolutam influentium auersionibus, praescriptaque victus ratione congrua (*qua omnia periti alicuius medici consilio fieri debent*) topicis remediis aduersus illam seculo pugnare debet chirurgus. Idcirco, vt chirurgus in dietetica & pharmaceutica non erret in laborantis perneciem (*ut nostri chirurgi & tonsores plerumque faciunt*) periculum adhibebunt medicum, qui haec peragat. At forinsecus varia adhibentur praesidia in paralyssi ex vulnere, aut alia externa quauis causa, vt *anaplastra, cataplasmata, vnguenta, illitum sicut, cucurbitulae, & alia id genus.* Guido tamen vno liquore longe optimo descripto a Mesue in passionibus cordis vititur, quo spina tota inungitur: & ita sit: *℞. myrrha electa, olei hepaticae, spica nardi, sanguinis draconis, turris, mummiae, opobalsami* (alia ex eum pla habent *opoponax*) *℥ss. olei carpopalsami, ammoniaci, saci coccoliae, croci, mastiches, gummi arab. styrac. liquida ana 3 ij. (alios 3 ij. f.) ladanū electū, succi castorei ana 3 ij. si. m. scilicet 3 lb. terribim. ap. ad pondus omnium puluerizanda puluerizentur: & omnia misceantur cum terebinthina, reponenturque in furnibulo seu destillatorio, quod *alembicum* vocant, & illa ingeniose ac lento igne, vt decet, distillentur. liquorem autem per destillationem sublimatum, vase vitreo forti ex cipe. Hic liquor proxime accedit ad verum succum balsami. Guido de Cauliaco quandoq; huius pretioso liquori addebat herbas dicatas *peralyssi*: & tum generosius atque efficacius multo (vt ipse testatur) experiebatur auxilium.*

OBSERVATIO XXI.

De syncope in vulnerato.

VIN quidam licet robustus, 32. annorum, anno 1539. mense Martio in pago Langedicio prope Alemaris, vulneratus fuit in curuatura brachii dextri, vbi venae & arteriae concurrunt quae cum laxae essent, ac vulneratae, tanta effluxit sanguinis copia, vt chirurgus M. Martinus ex Me denblich sanguinem vix restringere potuerit; adeo vt subinde in syncope incidere vulneratus ad quem & ipse accitus, naribus *acutum & aquam ros.* ad moueri, pilosque euelli, vt hi minem a syncope excitaret, praecipi: a qua cum excitatus esset, vinum ei ad virium imbecillitatem exhibuimus. Pulsus autem huic debilis erat, & deficiebat & virtute collapsa ob nimiam sanguinis profusionem ipse chirurgus de curatione & vulnerati vita desperabat. Sed tandem cum a syncope per me excitatus esset, & cum nulla febris adisset, ideoque audacter ipsi vinum propinascimus, deinde ad resauantia accessimus; & hac amygdalatum, ex duab. partib. *aquae melissa, bay. lass.*

*Paralyssi ex
vulnero
ratio.*

98

*Paralyssi ex
quibus
neruū ex
mutatur.*

Prophagia.

99

magitudinem, per quos etiā scūsus huie particulae, quam vili rei quā corpūs partū acutior est. Ita quoque neru osis partib. inflāmati, eorū bro noxa promissimē et communica tur. atque ex illis promissus, quā ex aliis quibusvis delirium superuenire solet, idq; ascendente ad caput interdum per continuas partes, solo calore: interdum vero spiritu vaporoso aut fuliginoso. Hæc autem

*Peruosi
partium in
flammati
delirium
accidit.*

*Delirium ex
ficcitate fit.*

omnia, quæ sic delirium, aut phrenitidem inducunt, sicendi pollent Aueicennæ: quippe, quæ multo, eodemque acri calore participet. Quo fit, vt delirantis irrequisito fere motu agitentur. Vnde Galenus lib. 13. *Therap.* ad hūmodum ait: *Ergo cum humor qui in capite redondat, frigidus est, insensibilis est, immobilitatq; hominē opprimat: cum calidus est, perperius potius motus, vna cum rationis noxa. Accidit enim (velut demonstratum est in libro de his propriis tractantibus) ex frigore, segnitia, ex calore, immodicus motus, ex humoris vero vitio, dementia. Ceterum licet hæc ita eueniant; vulnera tamen inflācta circa caput, confusiones, prolapsus, cranique ruptura, tum alia magis circa caput, hæc inferre solent, si effusa digna fuerint. Sic puer nouem vel decem annorum, cognatus meus, nomine Iohannes Reynerus, Alcmarianus, cum ex domuncula gallinis destinata, qualis ædibus annexi solent, ab altero detruderetur, in eaput prolapsus est. eum cranii ruptura & confusio cū vulneris efflāuit, & ante tertium diem obiit. Ceterum si delirium, seu mentis perturbatio, post vulnus acceptum, hominem apprehendat, huius rei gratia statim accersendus & consulendus erit peritus aliquis medicus, qui potu, frictionib. & delegaturis partium extremarum, & maxime pedū ac tibiarum, & clysteribus huic rei aecommodis, fumos ac vapores vitiosos, a capite deorsum protinus reuelera studeat, vt recte præcepit Aueicennas, itidem & ceteri, qui hac de re scripserunt, potissimum si (ut sicut) per consensum delirium fiat nam capite ipso laeso, maius periculum (ut diximus) intert. Quod autem ad chirurgum attinet, læse particulæ dolor (si fieri potest) sedandus est. Vtile est etiam alapis gemas laborantis percutere, vt ipsa ad mentem seu ratiocinandi facultatem redcat. Galenus lib. 13. *Therap.* caput delirium in principio per-*

*Delirium ex
vulnere cu
ratio.*

*Vapores a
capite a
percuti.*

*Dolor sedan
dus.*

103

*Caput deli
rantium
oxyrhodino
profunden
dum.*

*Cerebrum
refrigeran
dum.*

*Radix hyo
cy.*

fundendum esse oxyrhodino, pulehre nos adinonuit. Vapores enim & humores a capite tunc repellendi sunt. Cum vero in summo inremento sunt deliria, perussiones ex *papauerum capitis* (consilio eiusdem) applicabimus. Odorem quoque ex frigidis rebus narib. obiciemus; ænars ipsius intus, vel fronte similibus medicamentis illinimus. Quippe sopire (inquit) ac stupescere principem facultatem oportet; cerebrum scilicet, quod supra modum incaluit, refrigerando. Sanitati magna ex parte resiliuntur Aueicennæ, qui perdit aliquot radicem *hyoscyam*, id est, *visi alba*, vel bibunt (ex liquore aliquo refrigerante & humectante) vel cum cibo quopiam eius saporem obtundente comedunt. Et ita quintam intentionem curandorum vulnerum absolimus: nempe

quæ de correctione accidentium tractabat: præter tria adhuc symptomata, quæ erāt *præuicius, durities, atq; impatiens læse particula*, quæ interdum vulneratis accidunt, de quibus suo loco abbi dicetur. Nunc igitur absoluta curatione vniuersi salū vulnerum, ad magis particularia descendamus, & primo de vulnere in carne accepto, & eius differentiationis dicamus.

OBSERVATIO XXXII.

De simplicibus vulnere in carne.

QVI simplex vulnus in carne habebat, exitum, statim huic candidū cui (ut fieri assuet) agitat *stoppa canabina* exceptum ac motum est. deinde & pulvis tiber inasperius, de quo scholio sequenti. qui pulvis & alteri profusus, ut ovulnere, cū *oui candido liquore* in primo apparatu: & loca circumiacentia oleo resacco inuncta fuerit: & hæc vique in quartum diem. deinde *stoppa visio styptico calore inuncta* appositæ sunt & alligatæ, ac quotidie mutatæ, sed huic vltimo vulnus paulo maius erat, percussim diuisum. Postea *linamenta* addita sunt, quæ labra agglutinant, & insigniter sicant, de quibus in scholio latius.

104

SCHOLIA.

VULNUS proprie Galen. 3. *method. medendi*, unitatis est s'lo utio, ex vulnere in carnosum parter relicto, eodemq; *va recentiori addiderunt* eruenta, & citra putrefactionem. Hic autem vulnus latius accipimus: nempe pro recenti plaga, nō modo in carne, sed etiam in nervis, venis, arteriis, tendonibus, membranis, cartilagine & ossibus facta. Itaque primum de eo vulnere quod in carnosā substantia acceptum est, differemus. Ceterum eiusmodi vulnus aut simplex est, & citra substantiæ deperditionē, aut cum aliqua substantiæ amissione. Vulnus simplex, & quod sine deperditione sit substantiæ, aliud *profundum*, aliud *superficiale* sicutam, seu in summo residens est: aliud vero *transversum* *particeps*, vt eum pars via diuisionis per longitudinem facit alte descendit, altera in summo corpore hæret, quod *inequale* Galenō dicitur: aliud item *magnum* vulnus, aliud *paruum* tum dicitur, tū vero cit. Quæ omnes differentiationis quantitate seu spacio diuisionis sumtæ sunt. Vulnus quod cum deperditione est substantiæ, aut sit cum amissione cutis solius, aut eum ablatione cutis, & carnis subiectæ simul. Porro eiusmodi vulnera, vel simplicia sunt, & sine vilo affectu, aut symptomate: vel accidentia habent, quæ rationem causæ non obtineant: tunc enim vlcera dicuntur *difficile sanabilia*, de quib. in sequentibus dicetur: sed solum rationem habent, sine qua non, vt *superius annotauimus ex Galenō lib. 4. Therap.* Cuiusmodi sunt *emperimus, dolor, phlegmone, paræsi*, & alia paulo ante commemorata. Non magnopere autem curo, si prædictæ eiusmodi differentię, dispositiones aut affectus dicantur potius, quam differentię, vel cōtra: quamquam Galenus lib. 3. *method. medendi* anxie satis disquisierit, quænam sint propriæ vlcerum seu vulnerum differentię, & quæ aliorum affectuum complexionis. Hoc enim parum nunc mihi confer-

*Vulnus quid
Galenus.*

*Vulnus quid
apud veteri
tores con
surgat.*

*Difficul
vulnere.*

*Specialis
præcipueque
intuitu: cu-
randa vul-
nerum cau-
sa accepta,
vna est.*

conferre videtur ad vulnerū curationem. Com-
moda namque morborum curatio, non ex uo-
minum, sed rerum recta opinione contingit, ut
scribitur primo Methodo medendi. Sed nunc aliis
omissis ad curationem vulnerum simplicium
in carne summorum acceptorum accedamus.
Vulnerum cuiusmodi curatio, præter iam
dictas quatuor, aut quinquæ intentiones com-
munes, vnam specialem præcipuamque habet:
nempe *sanguinis profusionem* cohibere. Quod sane
intelligendum est, nempe si nimis immoderata,

105 atque affatim effundatur, ut recte interpretatur *est*
Ancenna. Satis enim est (inquit) ipsum fluen-
tem ex vulnere sanguinem non omnino, ac
statim suppressere: sed si nimis abusu de prorumpat,
eius duntaxat impetum moderate infrenare o-
portet. Moderata namque sanguinis ex recenter
accepto vulnere vacuatio, non parum sæpe mul-
tis profuit: quandoquidem & phlegmonas & ob-
structiones & febrem subinde fieri prohibuit.

Quæ quidem symptomata, atque id genus alia,
vulneribus (nisi diligenter prouideris) superue-
niant, ipsa quæ soluta vniōis consolidationem,
& curationem magnopere impedire consue-
runt. Atque illud fuit Hippocratis præceptum,
quod & a Galieno confirmatur & approbatur, *lib. 4.*
Methodo medendi. sic enim (inquit Hippocrates) efflu-
ente sanguine vulnus siccius, proinde & sanius.
Nā siccū, ut idem ait) sano vicinius est, humidum
vero non sano. Porro si tantus fuerit ruentis san-
guinis impetus, ut cum iis, quæ sistendo sanguini
in vulncribus communiter ad moueri solent, co-
hiberi non possit, iis remediis suppressendus erit,
quæ in obseruatione *De vulneribus venarum* pos-
tea dicentur. Ceterum tamen et in genere dictum
sit, quomodo curandorum vulnerum intentiones
perfici debeant. modus tamen specialis, quo in
carne curari ea debet, in sequentibus dicetur. Hu-
ius autem inuentio habebitur ex differentiis vulne-
rum supra commemoratis. ad hunc modū. Vul-
nus illud simplex dicitur, Galeno, Hippocrati &

*Quid vul-
nus simplex
est? quæ sit
eius curandi
ratio.
Vulnus non
simplex.*

*Vulnus sim-
plex præter
causam
agglutina-
tionem.*

aliis medicis, quod sine deperditione est subtili-
tatis, nec vllum alium affectum, aut symptomata
adiunctum habet. Vulnus igitur simplex non e-
rit, si quæ vulnerata est particula, fluxione vexe-
tur, si malo succo vitiosa sit, si omnino extra na-
turalem temperiem fuerit, vlla cauitas ad sit, si ali-
qua cotis amissio facta fuerit. Itaque vbi simplex
vulnus, quodque solum consistit in carnosa parti-
cula, non adeo silem magnum incidit, dissiden-
tium labiorum commissiōnem seu coniunctio-
nem, quæ sola decenti sit ligatura, vinculo scilicet
ex duobus initiis circumdato, expositulat Ga-
lenus *lib. 3. Therap.* Quæ enim (inquit de simplici
vulnere loquens) dissident, atque inuicem distant,
si in idem ad amassum componas, citra omnē re-
liquam extrinsecam molitionem coalescent. Nē-
pe licuti in cauis viceribus, vt caro producat, ita
in simplici vlcere, hoc est, vulnere, vt oræ ipsæ
cum coalescant, atque agglutinentur, solacere
naturæ causi est. Diductorum igitur laborum
coniunctionem, seu agglutinationem præcedit neces-

sario, ipsorum coniunctio, atque in idem adductio.
Idem omnino de hac re sentit Razes quod & Ga-
lenus: vbi tamen communis obinuit, vt recu-
tibus huiusmodi vulneribus *omni candidum* (quod
albūmen vocant) aliquamdiu agitatū & leui sup-
pa exceptum ad moueatur. Nec abs re profusio,
cum & sanguinis profusuum suppressat, dolo-
rem sedet, refrigeret, & phlegmonas fieri prohibeat,
non solū in oculis, sed & in omnibus locis vul-
neratis, vt Galenus *est anellor lib. 11. de simplicium
medicamentorum facultatibus.* Autē omnia vero
cauendum est, ne dolor incidat: quandoquidem
dolor (ut iam sæpe dictum est) & fluxione pri-
oritat, & phlegmonem excitat. Quomodo autem
dolorem sedare oporteat, in præcedentibus satis
est explicatum. Porro cuiusmodi oui cādidū liquor
ante tertium diem amoueri non debet. Nam,
ut Galenus ait *lib. 3. Therap.* parua vulnera ei-
usmodi naturæ sunt, vt post orarū adductionem
& commissiōnem seu coniunctionem, vnius diei,
aut duarum dierum spatium adhuc requirant,

*Oui candi-
dum quare
vulneribus
ad mouen-
dum.*

*De vulnera
magne, per-
cussim diui-
sa, in summo
resistente.*

quo proba fiat vniō & agglutinatiō. Quod si hoc
pacto vulnus non adglutinetur, curandum erit,
vt nunc statim subicietur, de vulnere magno
percussim diuiso, in summo resistente, hoc est,
superficiali, & in minime profundo, in quo
non sola sufficit deligatura ad oras ipsius appli-
candas & coniungendas. Si vulnus in superficiei
itaque corporis acceptum ad tantam magni-
tudinē percussim carnisve diuisum est, vt sola de-
ligatura oræ ipsius nec adduci nec committi pos-
sint, sutura aut fibulis (quas Græci *σπινθες* vocant)
eas ipsas dissimulas coniungendas esse, præcepit
Galenus *lib. 3. Methodo medendi.* Atque hac iola
partium dissidentium coniunctione vulnus glu-
tinatur. Apud recentiores tamen chirurgos tere
omnes in ualuit consuetudo, vt his vulneribus ap-
ponatur pulvis ruber, quem *incarnatum* & *con-*
seruatum vocant, post suturem vulnus. Recipit
autem partes duas thuris, & sanguinis draconis partem
vnam. Albucafis addit etiam partem calcis vineæ.
Cuius sententia suffragatur & Lanfrancus. Guido
autem loco *calcis vineæ* *bolū arm.* adiecit. Haly ab-
bas vero *similis* apposuit. Sunt qui puluerē hūc
rubrum appellatum, laboris vulneris agglutina-
tium, & suture conseruatium, hoc modo cō-
ponunt: *℞. bol. arm. terr. sigill. ana ʒ. vi. thuris, ma-*
stichis, sū coallia ana ʒ. iij. myrr. ba. aloē ana ʒ. iij. tra-
gacath. pist. sang. dr. ac. ana ʒ. iij. farina hordei sobarum
ana ʒ. iij. Sed interim summopere cauendum est,
ne vel pilus, vel oleum, vel quippiam aliud in
medo adductorum laborum vulneris interue-
nerit. Nam tum cuiusmodi vulnus sola dissiden-
tium partium coniunctione glutinari non po-
test. Hæc enim, quæ his interiacet, iam vniōnem
dispercunt: & earum quæ copulanda sunt par-
tium, coalescentia impediunt. Ex prædictis autē si-
gula cum oui cādidū liquore agitari possunt, do-
nec in corpus vnum coeant, quod glutinis in ista
creuitescat. Postea vero stuppi lenibus expiendū
erit medicamentum, & ita vulncri ad mouen-
dum, supra quod & aliz stuppe solo oui albo im-

*Medicamē-
tum optumū
erit vulncribus.*

*Pulvis ru-
ber.*

107
*Cauendum
ne quod in-
tra vulncri
intercedat.*

106

butz, & intra panguum lineū eodem madefactum liquore, immoluit apponendz sunt. Sed & supra vulnus nulla alia intercedente materia, pannus aliquis tenuis prædicto liquore imbutus, admoueri debet, ne scilicet diui remouentur stuppe. fortz iam factz puncta abumpant, aut dilacerent. Quod si loca circum vulnus adiacentia, rosacea inungerentur, factum bene existimauerim, vt in vulnerato, quem nos proposuius factum est. Hoc pacto enim læsum particulam a dolore & inflammatione vindicabis. Qualis autem futura, aut deligatura, quales item puluilli ex eiusmodi stuppis facti, hisce vulneribus percussim eximve in superficie acceptis, atq; in conspectu apparentibus, conueniant, & quo pacto fieri debeant, in præcedentibus abunde satis dictum est. Ceterum primus eiusmodi apparatus, vsque in diem quartum mutari non debet, nisi forte dolor aliquis vehemens superueniret, aut symptoma aliquid molestum incideret. Porro si post quartum diem transactum vulnus non coalescit, *vino aliquo styptico* calente ablucendum est. Deinde stuppe prædicto vino imbutz & expressz, supra vulnus ipsū apponendz & alligandz erunt, quas & quotidie mutare oportebit. Intra enim dies paucos hoc modo vulnus adglutinabimus, & persanabimus, Galeno etiam non attestante. *lib. 4. Therap. vbi Theasalus* arguit, qui vulnera in multos menses, & interdum in annum, aut etiam longius tempus protraheret & incurere sinebat, quz alioqui paucissimis diebus, vt sex, aut plurimum septem, curari poterant. Itaque primus apparatus recte decenterque fit cum ouorum candido liquore, & pulvere illo rubro, cuius paulo ante meminimus. Hic enim & sanguinis profluuium infrenat, atque inhibet, dolorem sedat, & phlegmonem ercat, vctat. Secundus vero apparatus, optime fit cum vino, vt supra dictum est. Vinum namque (vt Galenus ait *lib. 3. Meth.*) omnia vlcera, quæ vlcus est, (intelligit de vulneri) id est, quod citra aliam cum ea implexam dispositionem relucantem cōsistit) optimum est medicamentum. Vulnus omne, quæ vulnus est, siccat atque adstringi desiderat, præsertim si magnum extiterit. Atqui vinum, quale supra est memoratum, nempe *subanstrum*, hæc duo commoda præstat vulneri. Vinum igitur omnibus vulneris, quæ vulnus est, optimum est medicamentum. Maior est Galeni, *libro nuper citato* (id est *lib. 3. Methodi medendi*) vbi ait, quod eo tempore, quo diuisa vlcera seu vulneris partes, rite sunt conuulsæ, medicamentum oportet, quod parueniam faciat, & molece adstringat: vt & si quæ sanies iam subsit, hæc consumat, & si quæ in vacuum locum fluxura est, hæc prohibeat. Proinde medicamentum glutinans, vtrum plurius oportet, quam quod carnem produci, nempe ordine secundo. Minor vero ita deducitur, vinum, vt Galenus ait *lib. 2. simplic. medic. ex secundo ordine est essentialissimum, sed quod admodum vctatq; ex tertio, sicut mustum, quod vocant ex primo, caliditate autem omni proportione respondet siccatati, proinde vtrumque pro naturarum seu facultatum, (quibus ratione atati pullet) diuersitate, desic-*

cat & agglutinat. Non autem humectat, & refrigerat (exarosecat saltem admodum) vt Theodoricius talo existimabat. Atque id ipsum est, quod Galenus refert *lib. 4. Therap. ex senioris Hippocratis sententia* iniquens: *Vlcera madefacta, id est, ablucere, quæcumque ea fuerint, nisi vino non oportet.* Tum causam subiiciens ait: *nam siccatum sano vlcus est, humidum vero non sano.* Hinc Arnolus dicere solebat, quod eruenta & recentia vulnera, aqua ardente (quam & aquam viæ nuncupant) abluta, celerissimo ad sanitatem perducuntur, quippe quæ visumier desiccat. Post hanc autem abluentionem, quidam infra scriptum puluerem (qui in hoc casu magnz est efficaciz) vulnere inspergunt: *sc. myrrhe 3 iij. alo- Pulvis ei hep. 3 iij. thuris 3 iij. myse. stat. pul.* Sunt qui post amotionem primi apparatus, emplastrum & vnguentum admouet, quæ in promptu ad hanc rem parata habent: ac statim stuppe superponunt. Galenus autem in re propozita, plurimū facit emplastrum, quod *nigrum* appellauit: Auicenna vero *eng. de hmo*, quod tamen magis dicatur est carni regnendum, quam agglutinationi labiorum vulnere. Guido a Cauliaco in hac re vti consueuerat inuenio, quod constat prædicto puluere rubro, remixta cum *terebinthina lata*. Quidam vero terebinthinam ipsam cum prædicto puluere commixtam, & (vt dicunt) incorporatam, statim per initia euentorum vulnere admouent, atque in diem quartum relinquunt. Hæc enim oras vulnere coire facit, & futuram eo nomine cōseruat. Sed horem plurima formula apud Guidonem in Antidotario reperiuntur.

OBSERVATIO XXIV.

De vulneri profundi & occulto, quātum ad latitudinem eiusdem, et parte superiorem dicitur.

VIDAM vulneratus fuit a parte superiore dorsi in musculis scapulae, vulneri profundi & occulto, quātum ad eius latitudinem, sed non profunditatem, cum non penetraret ad interiora, sed in musculis sub cute occultaretur. Cum autem sinus versus inferiora tenderet, atque lenies collectæ ibidem sursum effertur, chirurgus non satis diligens aut industrius, non animaduertens, partem inferiorem vulneris versus cutem tendere, suspicionem dedit alii nobis. se medici consilio, aut auxilio egere, vt ita de curatione consilio habito, vulneratus facilius sanari posset. Quare cum me aduocasset, rem diu perpendens, tandem iussu chiurgo, vt tubo vulncri imposito, in eam partem sectionem faceret. Quo factum, vt & pus commode efflueret, & deinde impositis linamentis, vulnus ipsum facillime consolidatum fuerit.

SCHOLIA.

VULNUS in profundum penetrans, & reconditum, licet subinde futura & decenti ligatura curationem recipit: si tamen hoc modo curari non possit, vel scilicet, quia partes, quæ disiunctæ sunt, exacte ad invicem vique (ob naturam dissonantiam sibi coniungi non possint) vel potius

Quæ eruenta
vulnera
primum ap-
posita sunt,
ante quar-
tum diem
remoueri
non debent.
Quæ post
quartum
diem, si ra-
tione debeat.

Primus
apparatus.

Secundus
apparatus.
108

Vinum pro
alio ratione

De vulneri
profundo &
occulto, sicut
amissum
substantia
in carne ac-
cipi.

potius, quia in fundo collecta sit sanies, aut pus-
 tu, cui nullus patet effluxus, ipsum per effluxionem,
 Galeni consilium sequuti, curabimus. Ipsum vero
 effluxionem, tum ex eiusdem, tum ex contrarii
 loci diuisione, & situ sui figura partis accommo-
 da amolietur. Porro firum partis vulneratæ ac-
 commodum, seu congruum positionis figuram
 intelligimus, quando plerumque huius, quem orifi-
 cium vocant, semper deorsum spectat, fundum
 vero sursum, ita ut sanies ex ipso vulnere prona,
 & libere effluat. Itaque si vulneris figura non ad
 superiora extenditur, sed ad ima vergit, nec futu-
 ra, nec fibulis, nec deligata partes disunctæ, om-
 ni ex parte adammisus committi, ac sibi appli-
 cari possint, atque in profundo sistatur sanies;
 nisi prius ad effluxum ipsius vitiatum humoris, fe-
 ceris sectionem, nihil inquam proficiet, siue ear-
 nem generare, siue agglutinare volueris. Vbi vero
 conuenientem positionis figuram vulnus in
 parte laborante seruauerit, sectione noua opus
 non est, vt lib. 2. ad Glau. Galenus nos docuit.
 Itaque refert eo loco se finem in coxa enatum figu-
 ra ad ima vergente, sine ulla ex aduerso diuisio-
 ne cussisse. Cum enim sinus ipse versus genu quid-
 em terminaretur, os vero altius, circa mediam
 scilicet femoris regionem, consisteret; iussit molle cer-
 nical poplitei laborantis subici, vt inferiore situm
 haberet inguen quam genu. Hac igitur cõ-
 ueniente positionis figura in ista parte seruata,
 facile per os, ichores & purulenta colluies ela-
 bebantur & effluebant. Idem quoque in brachio
 fieri potest. Quædoquidem si os vulneris ad par-
 tem superiorem vergat, ita brachium collocan-
 dum erit, vt ipsum vulneris orificium deorsum
 spectet. Atque tum sine ulla facta ex aduerso sec-
 tione, vulnus poterit ad sanitatem perducì.
 Non secus quidæ ac si os prope cubitum esset, vulnere
 in superiora tendente. Quod si hæc conuenienti
 situs figura particula ista collocari nõ possit, nec
 ex vulnere ipso sanies elabi ex aduerso sec-
 tione molienda erit. Quod & hac sententia iterum Galen.
 oculis inuit circa finem lib. 3. method. meo-
 c. 11. Si vulnus (inquit) cauitatem altere cõditam, sub
 cute habet, cõsiderare oportet. Verum ea in su-
 periore parte sit, ita vt sanies ex ea profluat: pro-
 pterea in inferiore, sic vt illis sistatur. Eius igitur
 ex effluxus patet, eadem quæ aliorum curatio est.
 Cui vero non est, huic insinuat effluxum
 oportet. Eius autem (effluxus medendi) duplex
 ratio est (vbi expriment deligatura nihil pro-
 mouemus) alias tota cauitate dissecata, alias in
 fundo tantum aperta. Quando vero harum al-
 terutra sit ineunda, docebit tum locorum ipso-
 rum natura, tum vero vlcis magnitudo. Si namque
 ea loca ipsa dubium (seu fallacem ac periculosam)

*Spissio-
 parte opo-
 sita, quando
 facienda.*

*Sinus in-
 mare cura-
 tur, extrac-
 tum ex ad-
 uerso situm.*

turundas concavas (quas cannulatas concavas
 vocant) ex vitraque parte imponit. Quid vero
 dum hanc moliebatur sectionem, solebat vt se-
 ctione (vt vocant) quia melius inquit, sordes de-
 terget, & totum pertransit spaciū, minoremque
 inferre dolorem. Ipsum autem intromissorio ad
 formam acus ficto immincebat, vel hastulam si-
 gneam in cauum vulneris imponebat, & super
 eam tantis sectionem faciebat. Deinde sectione
 facta, mundificationem aliquod medicamentum
 leni stappa aut panno exceptum superponebat
 quod his in die mutabat.

OBSERVATIO XXV.

De cauo vulnere.

CHIRURGVS quidam hoc medicamento ad
 vulnus carne implendum, & ad deperditam
 carnem generandam feliciter cum linamentis vte-
 gebatur: & *serbenthina 5 iij. olei myrti 5 ij. resina
 pini, colophonia ana 5 j. thuris 5 j. f. sang. dr. 5 j. ce-
 ra parum.* fiat vuguentum. Si vulnus recens insti-
 ctum mundificatione opus habeat. Bononienses
 chirurgi, vt iam in supradictis exemplis pluribus
 ostendimus, oleum de abiete tepide infundunt,
 quod Bononiæ maxime in vfu est. Exsistat autem
 ex abiete. Vide Gal. de tuenda valetudine.

SCHOLIA.

DE cauo vulnere (de hoc enim dicere, insti-
 tutum nobis est; nam ad illud ordo noster
 peruenit), cum amissione substantiæ cutis vi-
 triusque & carnis subiectæ tantum, non etiam
 ossis, nunc agere decreuius est nobis. In cauo ita-
 que vulnere nõ ipsa modo perit cuticula (quam
 Græci epidermida vocant) verum etiam reliquæ
 cutis suppositæ natura vniuersa, & subiectæ car-
 nis portio aliquando non exigua. Quo sit vt ge-
 minus in eoeurandi finis sit propolitus: vnitione
 scilicet, & repletio, quoniam & affectus gemi-
 nus est, nempe vlcus siue vulnus, quod est vni-
 tis solutio, & cauitas, quæ ex amissa aliqua ani-
 malis propria substantia est contracta. Itaque con-
 tinui diuortium vnitionem, cauitas repletionem
 desiderat. Verum enimvero quoniam in propo-
 sito vulnere vnire non possumus, quæ dissident,
 nisi prius cauitatem impleuerimus, ordinem cu-
 rationis a cauitate impletionem ordinari necesse est.
 Omnis namque quæ præter naturam est cauitas,
 impleri postulat: quare & quæ in carnosa etiam
 accidit parte. Ipsa vero impletio inueniendū
 remedium finis, quo tenditur, est quem
 vel idiota, vel priuatus quisque etiam nouit.
 At vero vt quæ impleant, inacnas, & multa
 vlcus aut vulnus lanandum satisfacere
 putant, si kiant, quod carne est implendum.
 Non enim in hoc curandi ratio consistit; imo in
 eo inueniendū quod carne sit impletus. Cete-
 rum particularis indicationes, ex quib. inuenire
 licet, quæ cauitatem vlcis impleant, aut Gui-

*Veri Hippo-
 craticæque
 methacou
 sanandi ca-
 uo vulnere.
 112
 Duas indica-
 tiones vni-
 tionis præ-
 parantur in
 curando ca-
 uo vulnere.*

*L. 1.
 112.*

*Quæstio ip-
 so de ratione
 particularum*

in curando
causa vulneris
reparandum
est.

donem sunt quatuor. Prima ex ipsius vulneris substantia sumitur (talis & ordo erat Galeni. 3. Therap.) Secunda ex ipsius ægri temperamento, non corporis modo vniuersi, sed etiam afflicte particule. Tertia ab illis, quæ coniugata & annexa dicuntur, cuiusmodi sunt particule laborantis interperies, & circumdantis nos æris temperies. Quarta ex contrarietate indicationum, vt cum læta particula contrario est temperamento, cum toto, hoc est, cum corpore vniuerso. Talis siquidem ordo indicationum statuitur a Galeno lib. 3. method. medendi, in curandis vulneribus omnibus, ne dum in cauo. Porro nomine indicationis substantie vulneris, hoc loco inaudiuntur indicationes differentiarum maxime propriarum ipsius vulneris, de quibus abunde supra disseruimus, & in tract. de vlcerebus locupletius adhuc (si Deo visum est) disseremus. Itaque prima sanandi eius vulneris indicatio nobis insinuat, carnem eadem specie cum ea quæ perit, regnendam esse. Impleri enim non poterit quod canum est (vt Galenus ait) nisi sit eadem materia postulat, nisi substantia omnino similis ei quæ perit, regnatur. Atque carnis regnenda materia sanguis est: optisæ vero, seu est, & trix causa ipsa natura. Verum non satis est sanguinem diuise, nisi etiam & bonum (inquit) addiderimus. Erit autem sanguis qui in fluxu, & ex quo regnenda caro primordium habet, bonus, si nec qualitate, nec quantitate vitiosus fuerit. Sed nec satis etiam hoc loco fuerit naturam diuise, nisi etiam quorum natura sit, adiciatur, & vbi. Constat autem, quod subiectorum corporum, quibus superinduci caro debet, natura ipsa regnenda carnis optisæ est. Porro rationem optisæ habere non poterit natura substantiarum particularum, quibus deficiens caro restitenda est, nisi iustum & minime vitiatum calidi, frigidi, humidi ac sicci temperamentum obtineat, siquidem ex horum temperamentorum, cuiusque corporis natura consistit. In omni igitur casu vulnere duo illa primum consideranda sunt, nempe quod subiectum est, iustane temperie sit, id est, an secundum naturam se habeat, & præterea sanguis qui influxit, bonusne an modicus sit? Sanguis igitur & sanam esse partem lubiectæ, atque, afflicte, & sanguinis (qui regnenda carnis materia est) confluxum citra viliū vel in quantitate, vel qualitate vitiosū. Iis sane si se habentibus, nihil est præterea quod obstat, quo minus prima carnis generatio prospere contingat, idque nullius externi medicamenti opus. Quippe causis ambabus vnde nascitur præteritibus, nulloque extrinsecus quod impediatur, obstat, non potest prohiberi carnis generatio. Verum in ipsa primæ carnis generatione duplex (vt Gal. ait) prouenire excrementum necesse est: alterum crassius, alterum vero tenuius. Quod & in omni qualitate alimenti mutatione contingere solet. Hoc autem (tenuius inquam) in vlcerebus recentibus, quæ hic vulnera appellamus, Latinis *sanies*, Græcis *ichor* nominatur. Illud vero (quod crassius est) *gelæcor* (no-

bis sordes dicitur. Ac ex tenui quidem excremento vulnus humidum redditur, ex crasso sordidum. Eoque duplicibus medicamentis eget, vtque vt humidum est, siccanibus, vt sordidum, expurgantibus. Ergo cum nullo vnquam tempore natura cesset, certe nec tempus viliū erit, in quo non vtrumque medicamentum genus de sideretur, vtique quod siccet, & quod expurgetur. Verum non satis adhuc fuerit, cuiusmodi quidem generis esse medicamentum debeat, innescere, vt iam Hippocratica veraque methodo inuictum est: sed & species aliqua inuenienda est, quæ eiusmodi vulnere sit accōmoda & statuto ordine gradue circūscripta, vt carnem producere possit. Non omne namque medicamentum quod siccandi & detergendi pollet facultate, carni producere est aptum: sed quod modice, nempe primo ordine tum siccare, tum detergere possit. Quippe quod super hunc fuerit, ita vt non modo humoris qui influxit, redundantiam consumat, sed etiam affluentem sanguinem populetur, id refici carnem (vt Galenus inquit) seu materiam eius absumere, prohibebit. Itaque præsentis negotio aptissima sunt, *thuris lacryma*, & *herdacea* & *subacea*, & *erui farina*, & *iris*, & *aristotolus*, & *cadmia*, & *panax*, & *yemphylis*, quæ vniglo intra dicitur. Omnia vero hæc tum maioris minorisque discrimine inter se dissident, tum alia eorum simplices qualitates vincentes habent, alia compositas. Si quidem *aristotolus* & *panax* tum ceteris plus siccant, tum natura magis calent, *herdacea* & *subacea*, *farina*, multo his minus siccant, nec vllum calorem obtinent. *Thuris* modice calet, minus tamen illis siccant: adeo vt corporum quidam naturas omnino non siccet. *Eru* farina & *iris* horum atque *aristotolus* & *panax* medium locum tenent. Secunda indicatio curandi vulneris causi (quæ vt supra diximus, est) tum ex corporis totius, tum ex particule laborantis temperamento sumitur. Influxit nobis medicamenta, vel calidiora vel frigidiōra, vel humidiora, vel sicciora ipsi vulnere esse admoedanda nempe pro natura, ac temperamento & totius & afflicte particule. Scire namque licet duas esse primarum indicationum differentias, quarum vna ab eo, quod secundum naturam se habet, altera vero ab eo, quod præter naturam est, sumitur. Quod secundum naturam se habet, sui custodiam indicat, & propterea quod similia sunt, postulat. Quod vero præter naturam est, sui ablationem desiderat; proinde & contraria requirit. Perit enim quicquid in contrarium, & a contrario. Igitur vulnus (quæ præter naturam est) quod est humidius, eo sane medicamento quopiam, quod magis siccet, indiget. Corporis vero natura (præterea quod secundum naturam est) quantum est humidior, tanto, quod minus siccet, medicamentum postulat. Proinde, si qua sunt in diuersis corporibus vulnera vlceraque, quæ ad sit humiditas, quod in sicciora temperamento consistit, vtique magis siccari postulat, quod in humidiora, hoc sane minus, quod natura naturæ inter-

Prima indi-
catio.

Sanguis hu-
manus, materia
est regnenda
carnis.

113

Materia sub-
iacta par-
ticularum,
optisæ est
carnis regi-
nenda.

In omni er-
rore vulneris
causa spoliata
da.

In carne ge-
neratione
duplex pro-
uenire solet
excrementum.

Sanies.

114

Medicamen-
tum carni
producere
idoneum.

Ex 3. meth

Secunda in-
dicatio cu-
randi con-
vulnere.

Duas esse
primarum
indicationum
differentias.

est: nam productam carnem ei quæ profuit, similem esse oportet. Vbi igitur pristina siccior fuit, nouellâ quoque siccior esse conuenit. Quare vberibus hæc siccior postulat: quam doq. magis siccior fuerit, tanto quod admoventur medicamentis, magis sicciam facultatem habere debebit. At in humidior natura, tanto rursus illis, quæ minus sicciant, medicamentis est opus, quanto caro minus est siccior.

¶ Quo fit veritas, quæ cum temperatis & mediocriter naturis in consensu, in quibusdam tum vlcibus, tum naturis, pus quidem moueat, carnem non producat: in quibusdam etiam carnem producat. In humidior natura namque natura siccior & producere carnem potest, in siccior non potest, imo humectat, ac superatur a natura: proinde & putrefacit. Præterea in modice humidis vlcibus, tum recentibus, quæ huc vultus a & plagas nominamus, tum diuturnis & iam inueteratis carnem efficere potest, quippe quod moderate deficeat in his vero, quæ præ humida sunt (quod non satis deficiat) procul non potest. *Tertia indicatio nobis insinuat inueniendum esse remedium, quod proportionem, & statuto quodam ordine graduve, ipsis affectibus qui simul cum ipso vulnere incidunt, respondeat, illosque ipsos affectus prius summi oculos esse, quam ipsum vulnus carne implere tentemus. Itaque si intemperies vulnere accesserit, atque exulcerata vulnerataue caro, vel prius etiam ex quavis occasione, vel ipso vulnerationis tempore iusto calidior, frigidiorve sit affecta; utique medicam exigat, quæ non modo moderate siccet, sed etiam in tantum calfaciat, refrigeretve, in quantum subiecta caro a naturali suo habitu recessit. Fieri non potest (inquas Galenus lib. 3. de febribus) ut in vlcere, vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio (quæ omnia natura sunt opera) recte in quacumque cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Quo circa legitimi vlceratorum, seu vulneratorum partium temperamenta maior tibi sollicitudo erit, quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere, atque curare debet, prout quæ illa difficultas sit ad eundem arbitror. modum cuius si sine phlegmone sola subit intemperies, nullum horum fore prius sperabimus, quam illa sit sanata. Quod si hæc ita, ut dictum est, se habent, inspicere etiam convenit circumspectis nos aeris temperet. Si quidem*

Tunc in quibusdam naturis, tum vlcibus, tum naturis, pus quidem moueat, carnem non producat.

Tertia indicatio nobis insinuat inueniendum esse remedium, quod proportionem, & statuto quodam ordine graduve, ipsis affectibus qui simul cum ipso vulnere incidunt, respondeat, illosque ipsos affectus prius summi oculos esse, quam ipsum vulnus carne implere tentemus.

¶ Circumspectis nos aeris temperet. Si quidem in vlcibus, tum naturis, pus quidem moueat, carnem non producat.

dum naturam sunt, similem sibi indicatam sunt, quæ præ naturam, contrarior si modo saltem illa seruare, hæc summuere desideret. Porro am-bientis nomine hoc loco, & præsentis status, seu anni tempora, & etiam regiones cum Galeno intelligimus. Quarta indicatio particularis in sanando cauo vulnere, sumitur (ut superius dictum est) a contrarietate indicationum: non quidem earum, quæ in diuersis temporibus periciuntur, sed earum, quæ in vno, eodemque tempore ipsius curationis subinde offeruntur. Ut exempli gratia, si ægri temperamentum iusto sit humidius, particula vero ipsa, quæ laborat, siccior, aut contra, si hæc sit humidior, & totius temperamentum siccior. Pari modo in calore & frigore, quod contrario temperamento sit pars cum toto. Diuersa sane in his est ea, quæ a patiente particula accipitur indicatio, ab ea quæ ex ægri sumitur natura. Itaque hæc particularis indicatio, quam quartam in ordine posuimus, insinuat nobis medicamenta, vel humidiora, vel sicciora, vel calidiora, vel frigidiora, aut prout res postulat, media ac temperata eligenda esse, quæ ipsi vulnere admoventur. Statuamus igitur clarioris doctrinæ gratia totum corporis laborantis temperamentum humidius esse, eoque medicamenta desiderare, quæ minus sicciant, ipsam vero ægri particulam ex earum numero esse, quæ sicciores sunt, qualia sunt ea, quæ minus carnosa conspiciuntur: cuius generis sunt, quæ circa digitos & articulos habentur: præterea quæ circa aures & nasum, & oculos & dentes sunt: ac, ut semel dicam, vbi cerebræ cartilagines, & membranae, & ligamenta & nervi sunt, adeps vero & caro vel omnino nulla est, vel perquam exigua. In hæc quidem hypothesi si quantum ægri temperamentum iusto sit humidius, tanto particula iusto sit siccior, nec adiciendum, nec detrahendum pharmaco, quæquam est, sed tale adhibendum, quale si vlcus vulnere in medio temperamenti particula consistat. Sin frigidior debito particula fuerit, quam corporis temperamentum iusto sit humidius, utique in tantum intendi siccitatem medicamenti conuenit, quantum particulæ temperamentum, totius temperamentum excedit. Veluti si quatuor numerus sit pars exulcerata medio temperamento siccior, ægri vero natura gradibus humidior; manifestum est, particulam quæ nunc vulnata exulcerataue est, siccior vno gradu desiderare medicamentum, quam pars, quæ sit temperata ceteris partibus. Sed ut hæc omnia coniectura sola cognoscere possunt, ita longè in hominibus naturis, & medicamentorum fluctatibus contentis plandis, exercitationem postulant necesse est præterea, quod de indicationibus, quæ a calido & frigido sumuntur, dicatur, quandoquid ad portionem dictorum intelligi possunt. Vid. sic igitur clarissime, quæ huc thesaurus sit opus, quæ præ ac certa methodo curare vulnus causam vulneris Epilogus.

Quæ nomen ambicis intelligitur.

Quarta indicatio curationis vulnere cauo.

Hypothesis ex lib. 3. Therap.

¶

perpetuo verum est illud theorema: Quæ secun-

Nam postquam inuentum est, humorem omni no huc vito inesse, utique siccaus medicamentum parandum indicant. At quoniam ipsorum sic-

cantium, quædam magis ficcant, quædam minus, partim ex vulnerum diversitate, partim ex ægri natura, quod expedit, est desumtum. Itaque non modo de corporis natura meditatus sit oportet, quisquis coïnse & ex arte sanare vulnus cuiusmodi studet: verum etiam diligenter speculationem omnem de medicamentis didicisse, tum sicci humidique corporis temperamentum notas callere debet. Adhæc tum ambientis temperies (*que tum ad præsentis statum, seu anni tempora, tum vero regionis extenditur*) tum partium naturæ, tum indicationum inter se pugnantium cōtrarietas, eisdem consideranda sunt. Verum enimvero Theffalus, & plerique alii medici, qui etiam illum hodie imitantur, ista quidem nec inquirunt, nec norunt: sed, iuxta proverbium, mali futoris modo, vno calopodio omnes calcant, nullo naturarū, aut partium, aut id genus aliorum facto discriminē. Ceterum apud recentiores chirurgos in curando hoc vulnere, cōmunis hic modus observari solet. Sed etiam sanguinis profusione, & parte affecta ab inflammatione & dolore vindicata, vino calente vulnus abluitur: mox ipso perluto ac desiccato, pilulis aliquis carnem regenerans, aut vnguentum aliquot sarcoticū admovetur. Itaque linamenta isti sarcotici (*quorum libro 6. abunde apud Tangelium sit mentio*) imbuta, aut conspersa in sinum vulneris demittuntur. Post hæc stuppæ arizæ, vel quæ vino maduerint, superponuntur. Ac demum quæ medicamenta approbe continere possit, deligatura adhibetur, atque æstate bis, hyeme semel duntaxat, auxilia eiusmodi permittantur. Porro cuiusmodi medicamenta, quæ vulnere, atque vicium cavitates implent, medicriter, citraque morsum abstergentia sunt: de qua re videndus *S. simpl. medic. apud Galenum*. Gundo licinia inungit post ablutum vulnus vnguento carnis generatio aliquo, vide eius antidotivum. Quidam rād. *consolis maioris* & *medicæ* incident transperisim, & efficiant ad solem; & ex eo pulvere faciunt vnguentum cum melle & terbinthina. & plagæ recentis apponunt: vel isto pulvere utuntur, quem adeo expertum habent, ut vno die quasi subito consolident. Sed hoc empiricum esse & forte in parvis vulneribus locum habere: non autem in iis, in quibus deputata est caro, tam subito consolidabit. Vnguentum autem quoddam est, sine quo scilicet nolo vocitatum, in generando carnem apprime mobilis: & hoc est: *Resicis, myrrha ana ℥ij. sanguinis draconis ℥ij. pice Græcæ & nana ana ℥j. castoreæ ℥ss. stercorib. resina pini ana ℥ss. seu vaccini ℥ss. cera ℥j. sol. q. fiat Vng.*

OBSERVATIO XXVI.

De cicatrice in auctu: fac. Carpi.

VULNERIBVS carnes repletis cicatricem inducere solbat Iacobus Carpi, insignis chirurgus, ut in præcedentibus quoque ostendimus exemplis, modo cum vng. de cerula, modo de calce, modo cum tetrapæ armæo; aliquando

cum de cerula camphorato. Sed & hoc scquens vng. cicatricem inducit: *Res. terbinthina ℥ss. ol. ros. myrr. ana ℥ij. sepi castoreæ ℥ij. cera & iij. sulph. plumbi vss. melle. cerusæ ana ℥ss. corall. rub. ℥j. tinct. præpar. ℥ij. fiat vng.* Fit quoque vnguentum de tertia hoc modo: *Res. ol. ros. lib. i. cera albæ & v. cerusæ, melle. plumbi vss. ana & iij. fiat vnguentum solum dissolvendo: deinde lauentur cum succo solatri.*

SCHOLIA.

DE vulnere impleto, siue æquali nunc dicamus. Vbi enim vulnus purgarum impletum quæ carne fuerit, æquale tūc siue æquabile latum planum, atque impletum nominatur. Talia autem cicatrice tantum obducere postulant. Porro, ut ad cicatricem perducatur, amissam cuticulam, quam *epidermida* Græce vocavimus, desiderat. Hanc igitur tum regnere, tum sibi vniere oportet. Verum cum ex sanguine ortum habeat cutis, talis omnino, qualis erat, quæ prius, prius regnigini non potest: simile quiddam tamen cuti, & quod eius officium suppleat, restitui potest: non tamen plane cutis. Quando igitur, ut cutis regneretur, fieri omnino nequit, quod superest, efficere est temandum; nempe instaurare aliquid, quod cuti deperditæ simile sit, & carni sit veluti naturalis: aliquid tegumentum. Id enim est vulnus iam repletum, planumque redditum, ad cicatricem ducere: qui finis est, quem nunc hic tendimus. Huius itaque efficiendi ratio hæc est: Portio quædam subiectæ carnis nuper genitæ & restitutæ (*causula est, quæ summo tenus evidenter apparet*) sic alteranda est, ut non amplius caro permaneat, sed velut cutis evadat. At quo pacto, iniquis, ita alterabitur? Profecto alicuius alterantium qualitatium ope. Ergo (*ut Galenus ait lib. 3. Methodo med.*) quoniam cutis carne ipsa tumescit, tum etiam densior, si carnem siccabimus & adstringimus, tum etiam per similem reddecimus. Et hæc quidem est medicamentis, quod cicatricem inducat, summa. Verum ea non satis facit; nam & glutinatoria, tum siccabunt, tum etiam adstringent, sicut & epulotica, id est, cicatricem inducentia. Adiciendum ergo est, quo ordine graduve siccare debeat medicamentum, quæ cicatricem inducant, quemadmodum & de sarcoticis, & de glutinatoriis fecimus. Id autem ex ipsi rerum substantia facile invenies. Epuloticum namque, id est, cicatricem inducens medicamentum, non modo, qui in suis, humorem (*vel glutinatorium*) sed eum quoque, qui in ipsa carne subiecta continetur, consumere debet. Quo fit, ut multo profectio siccius, quod cicatricem inducat, quam quod agglutinet medicamentum esse conveniat. Itaque tres gradus desiccantium medicamentorum in curatione vulnerum statuendi sunt: nempe sarcoticorum, id est, carnem regigentium, quorum facultas ex primo ordine est desiccantium: agglutinatorium, quæ seundo gradu, vel etiam tertio resicant: & epuloticorum, hoc est, cicatricem inducendum, quæ siccandi facultate prædicta adhuc superant. Hæc enim

Præxi communi.

118

Vnguentum sine quo efficitur, ad generandum carnem valde nobilis.

De vulnere impleto suo agnato.

119 Methodum inducendi cicatricem. Cutis sicuti speciem est quæ prius, regnigini non potest.

Epulotici facit.

Tres gradus desiccantium medicamentorum in curatione vulnerum statuendi sunt. Sarcotica regigentium. Agglutinatoria. Epulotica.

enim non accidentalem modo & confluentem (que præter naturam est) humorum redundantiâ deficere, ac consumere debet, sed eum quoque humorem, qui secundum naturam est, & in ipsa

120 (ut dictum est) subiecta carne continetur. Quod & sequentibus verbis Galenus testatus est: *Glu- natum*, inquit, *est id quod proprie est, ut eis quod præter naturam est, redundantiâ consumat*; qui cicatricem inducet, non hoc modo, verum etiam, ut ei quod secundum naturam se habet, aliquid deradat. Priusquam igitur vulnus cicatricis possimus obducere, eo vique reficanda caro est, donec calli similitudinem induerit, & cuti similis euaserit. Quod

*Epulatio
proprio dicta
quam facul-
tatem ha-
beant.*

*Cicatricem
per accidens
inducens.*

*Calli viti-
a.
Consumi-
tione.*

line per se primario, ac proprie, hoc est, peculiari facultate, medicamenta effecerint, quæ adstringendi modice facultatem habent: & cuiusmodi quidem frigida, vt plurimum frigida sunt & siccata. Cuius generis reputantur galli immatura membra, id est, mali pueri seu granati cortex, balen- strum, qui sunt est sylvestris punicus fructus, flos ægyptiæ, vel eius loco acacia, rhus, seu sumach, & eius generis vniuersa, quæ modice adstringunt atque desiccant. Per accidens vero & secundario, carnem al-

terando, & calli instar indurando, cicatricem etiam inducunt calida medicamenta, quæ carnem detrahunt, ac colligunt sunt nata, Galeno lib. 3. simplicium cathartica, id est, detraherentia dicuntur, vulgo autem consumptoria cuius generis sunt chylitici, & æstus non totum, quod enim lotum est, vere est epuloticus; & æstus squama, & musci & scissum alumen, & quod vulgo vitriolum appellatur: quæ prædictis vere epuloticis, id est, primario & ex sua facultate cicatricem inducentibus, multo sunt valentiora: musci quidem & chylitici præcipue mitior autem æstus squama: atque etiam hoc mi-

tius æstus vitium, quod etiam si lauibis, vtique inquit Galenus minus mordens medicamentum habebit. Itaque si quando his vt ad cicatricem inducendam in aliorum penuria cogimur, parcissime ipsis vtetur: largius enim admodum mordicat, colligantque carnem, & vlcus cauum efficiunt. Summum igitur tantum specillum, hoc est, specilli cuspide, in eadem exactissimum leuorẽ nisi dimittimus, ac post velut tenuissimum quendam pollinem partibus, quæ cicatricem induci postulat, leniter eas contingentes, imponemus. Quod si illa etiam aduras, vt minus acris, sic ad cicatricem inducendam, reddes magis apto: vt etiam laues, adhuc sient mitiora. De his latius vide antidoritarum Gnidium, de quibus & locupletius dicemus in tractatu De viceribus. Sed nunc aliquid addamus de cicatricibus reparandis in vulneribus.

121

*De cicatri-
cium repa-
randis in
vulneribus.*

Deformes atque indecoræ cicatrices, tenere quidem adhuc & recentes, insinuat Razi, admodum diachylon aut hytharion, (vt vocant) nutrita. Cicatrices nigras tollunt, oleum in quo radix hyponum cauidæ, tum nigre incocta sit, dum succum reddat, impotum: calamintha ex vino cocta, argenti quoque spuma cum rosico albo lota. Crassiores vero & iam inueterate reparantur oleo balsamitæ appositum, vt radice cucumeris syluestris, quem aluminum vocant, tuita & appo-

sita. Quod si his aut similibus non tollantur, id totum quod supereminet, atque excrescit, cultro rasorio excindendum est, vel cauterio amouendum. Crustam vero resolosæ admodum gallinæ, aut anariæ adipis, vel etiam muschi. Hæc quidem in iis agenda censent recentiores chirurgi. Verum Cor-

Galenus.

nellus Celsus stultum esse existimat, si vel excrescitrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæc, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, supereminens carnem, excedentia medicamenta consilicem la sunt; super concavam implentia, donec vtrumque vlcus sanæ cuti æquetur, tum cicatrix inducatur. Sed de his alias latius, eum de suis tradabimus. At si vulnus (nam ad hoc quod

nunc intendimus etiam spectat) hyperfarcosum, id est, supercrefcentem carnem habet, morbus est ex eo genere, quod in quantitate magnitudine, vt partium spectatur, quemadmodum & cauitas erat, de qua paulo antegimus: ergo veluti vulnus cauum, non vnum est vitium, sed pariter cauitas & vulnus, ita vulnus aut vlcus, quod supercrefcentem carnem habet, non vnum est morbus, sed simul caro supercrefcentis, & vulnus vlcus. Prior morbus, qui instrumentarius est, nempe malignus, quæ præter naturam est, primam indicationem, quæ veluti materia est inuenientiorum remedium, nobis insinuat, ipsius scilicet exuberantis, & præter naturæ modum excrescentis, ablationem. Alter vero morbus nempe soluta vniõ, coniunctionem indicat. Porro ipsa agglutinatio, seu dissidentium consunctio, vt & carnis generatio, naturæ quidē opera (vt prius diximus) perficitur: at supercrefcentis carnis detractio, nullum quidem inquit Gal. lib. 3. Method. naturæ opus est, si doli medicamentis, seu medicamentorum ope perficitur, quæ vt hementer excrescit, & natura acris sint; cuiusmodi sunt acrimæ aut vitrioli seu vitriolum spiritus, radice affluatulo, um, hermodactili, stappa mixtum in oleo, in acrimæ ta & pennicula corpora, murtæ acris imbuita, cy-reficata: vnguentum viride, & id genus alia tum simplicia, tum composita, quæ ex sexto libro Tagauti requirēda. Ceterum id vnum semper memoranda fidei obseruandum moneo, ne pro diuersis corporum & partium temperamentis, varianda esse remedia. Eadem enim medicamenta quibusdam naturis carnem excrescentem absumunt, aliis vero cicatricem indurunt, aliis lolum glutinatorio minus præstant. Eiusmodi namque medicamenta, quæ carnem minuunt (sepulca Græcis improprie quidem appellations dicuntur) proxima sunt, tum quæ valenter detergent, tum quæ cicatricem inducunt. Ita vt non pauci inquit Gal. lib. 3. Method. medendi per errorem medicamentum, quod carnem minuit, vel pro eo quod sordem deterget, vel pro eo quod cicatricem inducit, accipiant. Exempli gratia musci & chylitici (quæ

*De vulnere
supercref-
centem carnem
habente,
quam Gra-
eci hyperfar-
cosum vocant.
Vulnus sa-
percrefcentem
carnem ha-
bent, non v-
num est mor-
bus.*

*Carnis det-
ractionem
medicamen-
tis perficit, ut
opera natu-
ra.*

122

*Sepulca, id
est, carnem
minuentia.*

dens malagma, super vulnus & contusam carnem daudum est. In ipso vulnere imponi debet digestivum (ut vocatur) *ex terribantina resina, & o-*

*Digestivum vuln-
eris im-
ponendum.*

*Detergentia
quoniam ad-
monenda.*

norum luto. Ceterum per ducto ad suppurationem vulnere, his quæ pus movent relictis, ad purgan-
tia & detergentia transendum erit, vt sunt tincta in melle linamenta, mundificatium ex apio, & id genus alia, quæ in Antidotario Guidonis tum apud alios inuenies. In omnibus autem eiusmodi vulneribus recte inditur turunda *melle rosacea*, siue *ung. ap. osi* nuncupato, imbuta. Supra vero id purgans detergentisq; medicamentum *stappa ari-*

*Stappa ari-
da.*

*Cor. Cel-
lib. 3.*

da dandæ sunt, adaptandæque est deligatura, quæ ad mota medicamenta probe destinet, donec perfecte expurgatum vulnus fuerit. Tum demum autem purum vlcus est, *inquit (Celsus)* cum rubet, ac nimium neque siccum neque humidum est. At quodcunque sensu caret, quod non naturali-

*Intensio cu-
randi vul-
neris conu-
fi.*

ter sentit, quod nimium aut aridum aut humidum est, quod aut pallidum, aut liuidum, aut albidum, aut nigrum est, id purum non est. Purgato vt decet vulnere, carne ipsius implere oportet, quæ secunda erat, in curando hoc contuso vulnere, in-

*Si caro con-
tusa multo
sit lamata.
si labra vul-
neris fuerint
dura & cal-
losa.*

tentio. Carnem igitur modo quo supra dictum est, generare oportet, & iam impletum vlcus ad cicatricem perducere. Quem scopum facile assequeris, si turbidam in dies paulatim imminueris. Ita enim solius naturæ opera, ac citra vllum me-

*Siccontusa
caro in gan-
gram de-
generat.*

dicamentum, vlcus seu vulnus carne implebitur, & cicatrice obducetur. Quod si caro multum sit dilacerata, & sutura vtilis videatur, conglutatur laxa quadam sutura, labia retinente. At si labra vulneris ab ambiente alterata fuerint, ac dura, callosaque appareant, scilicet illa (modo nulla alia obliuiscens dispositio) carni amouendo, renouare oportebat: deinde confluere. Porro si cæsa contusaque caro enumeratis modo auxiliis, ad suppurationem perducere non possit, videnturque in gangram, ac partis corruptelam degenerare (quod ex tarda difficultate, maturatione, & fæcio, liuido aut nigro læta officio colore, deprehenditur) vnguentum

126

Ægyptiacum nominatum, *exp. de curat. gangraenæ* descriptum, aut aliquod aliud simile in medicamentum, quod ad eiusmodi corruptionem & mortificationem sit idoneum, protinus erit ad mouendum. Quod si alia quædam symptomata vel affectus huic contuso vulnere superuenierit, vt dolor, phlegmone aut quicvis alius tumor præternaturam, aduersus illa congruis (quæ suo loco dista sunt) remediis erit pugnandum. Hæc sufficiunt obiter dixisse de vulnere cum contusione. Aliud autem exemplum contusionis capitis cum vulnere, iam positum est *lib. 9. obs. 1. & curat. medic. nostrarum cap. seu obs. lib. 17. & lib. 11. obs. 2. g. ex actu telæ alto in caput, cui contigit & obtumescencia, licet postea curatus fuerit, ibidem ponunt alia duo exempla contusionis capitis ex telo cum vulnere. Sed nunc ad contusiones accedamus, quæ frequentissime quoque eueniunt sine vul-*

OBSERVATIO XXVIII.

De contusione absq; vulnere.

VI ille, qui dum canem fortiter percuteret, ex improviso cecidit super coxam, insignem dolorem ex contusione cum pateretur, *oleo rosæ* & *myrrino* in primis locum affectum vt inuingeret mandauimus: ex quo dolor omnis tandem cessauit, nulla subsequente inflammatione aut partis collisione nigritie. Soleo autem in contusione ex casu aut collisione vel offensione, ne fiat inflammatio, ecchymosis, seu sanguinis aggregatio sub cutem, vel circa partem contusam & collisam, modo nulla sit carnis ruptio, vt ab initio sola *olei rosæ* inunctione, cum *myrrino*: quæ multis ita profuerunt, vt non opus fuerit aliis remediis. alioqui postea inungere soleo cum *ung. alabastrino*. At cum ego ipse contusionem haberem in genu, cum dolore, *oleo rosæ* vsus sum, in quo summatim est hypericonis, vt sit in oleo hypericonis, maduerant: ac eodem modo vt *oleum hypericonis* conficiatur. Ita quoque pncipitium annorum, filiolus Adriani Fryckij Delphensis anno 1563. 25. die Aprilis, cum ex cursu vehemētiore duorum capum magnorum alterantium in terram proiecitus esset; in occipite contusionem animaduertimus, non sine magno dolore, vomitu quoque ilico superueniente, ac etiam ipsius brachiorum ac manuum tum crurum, vt animam statim agere videretur, adeo vt quis cerebrum læsum ex concussionē vehementi dixisset. Cum itaque ab omnibus in agone esse putaretur, etiam ipse met mortem præ foribus esse suspicabar, ac metuebam, cum ipsissime per quatuor integras horas perdurasset. Sed tamen ne puerulum sine ope relinquerem, locum contusum inunxi oleo rosæ: nucham vero oleo vermium terrestrium; & iussit frictions fierent in extremis totius corporis. Quibus administratis, rediit tandem ad se hic puer, & a spasmo mox liberatus fuit. Interim *botanicam vniuersam* coctam in ceruicia continuo bibendam dabam: & postea locum contusum vnguento *alabastrino* inungere feci. Atque his remediis a dolore tum contusione mox conualuit, & nunc hoc tempore cum hæc transferiberem, anno 1570. die 4. Octobr. optime & pancreatici viuit. Doctor lalon medicus Zelandus, suo tempore magni nominis, qui & de vteris librum edidit, in offensione, & contusione, absque vulnere & casu (vti *Demetrius Constantinus consiliarius regium in Hæc-Cæmis nobis aliquando narrauit*) nauitis in mari degentibus, quibus remedia ad manus non sunt, imperabat, vt pepis in muria (*longina vulgaris apud nos Pekel dicitur*) calida, immerium & expressum apponerent, etiam si ex alto cecidissent: nec alio remedio quam hoc, ad offensionem, contusionem & casum vtebatur. Quidam contusionem pedis hoc emplastro curauit: *stercoris vacini, absinthii ana m. j. stor. m. f. steracis chamomill. 3. j. cum oleo chamomill. fiat emplastrum*. Ad contortionem quoque & contusionem, quando materia iam fluxa est, egregie commendatur

Lana succida, in fusa in decoctione vini ex cinimio & absinthio & chamomilla.

S C H O L I A.

128 *Contusio.* **D**E contusione in carne, sine vulnere exteriori notabili, quæ dicitur a Galieno 4. Therap. ecchymosis, & ab Auicenna (ut ait Guidon cap. proprio) in primo canonis sen quarta, *Asas*, nunc dicamus. Quia autem illa quæ scribuntur de contusione, de ecchymosi seu ecchymomate (quamquam & de eo mentionem fecimus supra, lib. 3. obs. & curat. chirurg. nostrarum de iunioribus præter naturam, fibulis obs. 4.) id est, sanguinis subter cutem effusione, & coitu, quod vna cum contusione, ruptione quæ, cute integra manente, hoc est, non vulnerata incidit, a Tagutio quoque memorantur lib. 2. de plagis cruentis cap. x. & forte eadē sunt eum in. quæ a Guidone tractantur, eosdem autores in hisce quoque imitabimur. Ecchymoma itaque (ut etiam locum citato duximus) id est, sanguinis subter cutem effusio & coitus, solutæ contusionis genus quoddam est, quod plurimum (ut lib. 4. method. ait Galenus) vna cum contusione, ruptioneque incidit. Quocirca non fuerit a proposito alienum, si propter affinitatem, quam habet cū prædictis vulneribus, pauca nunc quatuor de eo dicamus. Itaque incidit in iudicium hoc vitium eum sola contusione, citra carnis infulculatæ, in profundo hærentis corpore, ruptionem, quod Græci *Rheima* appellant, ut ex violento ictu, vel graui calu. Aliquando vero cum sola ruptione, absque villa contusione carnis (quod Græci *farcolabla* & *Telasma* dicunt) consistit: ut cum motu quopiam valente & confertim facto, citra graue aliquod extrinsecus incidit: ut caro disrumpitur. Nonnumquam etiam cum vtroque & cum graui ac duro quopiam corpore, quod extrinsecus super incidit, vel casu ab alto, non modo carnis musculorum partes, sine cutis diuortio contunduntur, sed etiam ex distensione violata, & confertim facta, abrumuntur. Tunc enim venis exiguis, in ea sic contusa ac rupta carne, diuortium expertis, sanguis exilit, unde ipsum ecchymoma sub cute collectum nascitur. Cuius apparentia notæ sunt, tumor mollis, & talis cedens, tumidus & magna ex parte indolens. Fit autem etiam aliquando ecchymosis, ex officii valorum apertione, quam anastomosis vocant (ut alibi superius quoque diximus) ex ea quæ a nonnullis ab apertis dicitur, id est, a scissolano, ex fissio vel *erasmio*, vel *subfissio*. Porro accidit Anastomosis propter tum vas imbecillitate, tum sanguinis, qui ad os eius impetu facit, copiam adhuc ob acrem quampiam, qui illi extrinsecus incidat, qualiter Diapedesim ex tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine vero tenuato, ortur: accidit præterea interdum potest & ex gracilibus vasorum ore adsperto. Verum de ea tantum ecchymosi nunc agitur, quæ contusionem vel ruptionem consequitur, de aliis enim proprio loco alius egimus. Hanc igitur ecchymosin propter solutam vnitatem statim factam dolorem, & ob sanguinis in profundo conuersum, abscessus nonnumquam

insequuntur, qui magna ex parte per halitum digeruntur. Species autē ecchymomatosis sunt ea quæ *Species ecchymomatosis.* *Hypopias* Græci, Romani vero *Sagillata* vocant, & huius ex ictu provenientes. Græci *Hypophlogmata* nuncupata, quæ & interpreti Auicennæ vestigia percussionis, Latinis vero proprie *Purpures*, *Purpurae* dicuntur. *Ecchymoma*, quod cum magna ac violenta contusione incidit, periculo non vacat. Solet enim frequenter, si negligatur, non modo afflicta particula, sed & corporis totius corruptionem adferre. At si forsitan in contusione, quæ cum ecchymosi consistit, cutis a carne seiuincta, maneat pedula, raro vel nunquam adglutinetur. Proinde satius est, eam præcise incidere, & exsecraria medicamenta admoovere, vel absque deligatura locum sic excoriatum relinquere. Ac namque ambiens, cutis ipsius instaurationem non mediocriter adiuvat. Ceterum quia ecchymosis, seu ecchymoma, plurimum (ut Galenus ait 4. method.) vna cum contusione, ruptioneque incidit, idcirco in principio curando, plures crunt indicationes obseruandæ. Semper enim pro affectuum numero, etiam medicandi indicationes respondent. *Prima* indicatio est, fluenter ad locum affectum materiam vacuare, & auertere. Quod optime quidem fit auctore Auicenna, vna scissione, quam omnes etiam arte periti, in hoc affectu imperant, quamuis corpus mundum, hoc est, purum ab extremis fuerit. Secunda intentio est, dolorem sedare, & partem læsam, ne fluxionem excipiat, robur adferre, rebus frigidis & stypticis eam persuadendo, atque illincendo. Vnde Rhazes & Lanfrancus, partem eo vitio laborantem inungebant rosaceo, & post vñctionem puluere myrtillonum respergebant, ac mediocri strictione seu deligatura stringebant. Verum enimvero in communis vsu obseruatum est, vt per initia omni candidum rosaceo permixtum loco dolentis sic afflicto admoventur. *Tertio* curationis consilium eo dirigere debemus, vt sanguinem ipsum totum, qui subter cutem effusus est, dissipemus, ac re soluiamus, idque cōsistim, priusquam nigruerit, & in grumosam coierit. Quod factum quidem haud difficile erit, si & sanguis effusus tenuis, & prope summam cutem, non autem in profundo situs fuerit. Quod si diffusi non possit, tum intranscriptis digerentibus medicamentis, tum scarificationibus educendus erit: & si nihil hæc promouerint, affectus ciulmodi curandus erit more abscessuum. Itaque sanguinis si per contusionē, ruptionemque subter cutem dispersi, dissipati & vacuati, ecchymomatosis, quæ ecchymoma est, propria est curatio, ut lib. 4. method. modis his verbis Gal. tit. status est: *Sane, inquit, ecchymosis omnis vaccinatione proprio remedio curatur, ut indicat.* Quare calicetibus huius & modice

ficatibus medicamentis est opus, quale si ex nigris populis accipit. Quippe quæ vehementer siccat, digerunt illa quidem in principio euidentius, quam quæ sunt imbecillia, ceterum non illi ipsi vitii scirrhosum diffilique curam relinquit. Curandū vero est, vt ruptis, quæ in profundo hærent corpore, hæc tū vires habeant, magis intratas, tū ipsa magis acris,

Curatio ecchymomatosis, quod vel contusio vel ruptio excutit. *Prima intentio in curando ecchymomatosis est, fluenter ad locum affectum materiam vacuare, & auertere.* *Secunda intentio.* *Tertia intentio.* *Propria ecchymosis curatio.* *Quoniam ecchymosis vaccinatione proprio remedio curatur.*

Ecchymoma a quibusdam nonnullis non videtur.

Ecchymosis nota.

Anastomosis unde nascitur.

Lib. 3. therap. Diapedesim unde nascitur.

C. caribula
n. ut in quibus
ecchy-
moma
sunt.

Ecchymoma
super cutem
venit ad
stringendum
dilatandum
admi-
nistrandum.

Potiones quae
in ecchymomate
accidentibus
propi-
antur.

Situm ec-
chymoma
per halitum
dissoluitur.

Cuius rati-
o fuerit
iudicanda.

ocria, magisque dissimilia sint, cum vt semel dicam / tanto efficaciora, quanto magis a cute ad profunda recessit ecchymosis. In talibus sane nec incurbitur vsus fit inutilis enim instrumentum ad violentum attractum, a medicis est excogitatum. Vtrum enimvero quoniam tunice vesicularum, ex quibus sanguis exiliit, contusa sunt, per initia sine (vt Gal. & Paulo visum est) non nihil ex adstringentibus quae digerunt, admiscere oportet. Contusa n. illa venularum tunice, aliquam de tensionem requirunt, vt ad naturalem suum statum reducantur, & ne noua materia ob dolo- rem attracta, ad locum contusum delabatur. Quod quidem si solum digerentem vim haberet medicamentum in principio applicatum, non modo id quod effusum est, digereret, sed & per con- fusionem aliquid sanguinis, qui contusa venulis continetur, extraheret, vt testis est Gal. lib. 5. de co- piosis medicam. secundum locum. Quando autem in naturalem statum venulae redierint, citra adstric- tionem ad sola digerentia medicamenta venire tempestiuum est. Porro in quibus fit modice ad- stringentium quiddam, nec non per halitum digerentium miscere conuenit, perspicuum est, imbecilliora primum debere assumi; validiora

131 autem inueteratis, & iis quae nigrescunt, admo- ueri. Ad inueterata igitur ecchymomata (Paulo Agrippinae meminit auctor, lib. 4.) radicata illitis po- des, quippe discutit ea, ubi erodere incepit, vel ipsius radicle fuscus, cum micis panis inductus. Ceterum ex moderate digerentibus, quae vulgo resiliuina domestica vocant, hae sequentia auxilia in communem usum veniunt. Primum constat vino, melle & sale. Secundum ex farina hoedei, calamintha & vino conficitur. Tertium recipit ceram & cuminum. Quartum fit ex floribus chamemeli, meliloti, stoechade & cumino, om- nibus in vino decoctis. Quintum fit ex maluis, fursur, absinthio, cumino aut anetho, aqua vel vino incoctis. Sextum fit ex farina hordei & foenugraeci, croco, & momento auripigmenti, om- nibus quidem aquae calaminthae incoctis. Solent & potiones quaedam institui, quae si assumentur, sanguine concretum, & extra vasa effusum (vulgo mortuum vocant) dissipare ac resolueret creduntur: cuius generis est ea, quae constat bdellio co- llo, centauro, & syr. acetosi. Atque hinc et aliae quae- dam consimiles, quae in casu ab alto (vt Obstatum. Scholae sequentibus dicemus,) offensione, & vio- lento membri tractu, aut distensione, offerri co- sueverunt. Cum autem totum ecchymoma dig- estum per halitum esset, sicque iam vehementius ruptum ipsum permittitur ac deligatura coniun- gere, omniaque in summa facere, quae vt vlcus coalescat, efficiant. Ergo si euocatum celeriter to- tum ecchymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro: si longiore spacio, sordes multa subnascens medium inter viceris libra spaciump occupabit, ita vt iam coire ruptio non possit. Atque inde adeo fit, vt qualibet deinde causa, nos hanc sui admonant: nam siue quae obruit, siue parum couocat, siue febris laboraret, siue licet re-

mentius fatigauit, eiusmodi ilico particulis dolet. Non enim (vt modo dictum est) in idem coire ru- ptionis libra, sed etiam prope sunt admoti. Quo fit vt leui momenta ea facile separantur, & me- dius inter ipsa locus superuacuo humore replea- tur. Et quid quies aliud, quam assidue noui ec- chymoma creatur, & primo illi (cum videlicet pri- mum caro esset rupta) persimile? nisi quod ex tenui magis sanie nunc constat, cum in principio & san- guine ecchymoma crearet. Ideoque facilius citius na- quam prius seu per initia digeritur. Nunc ad cas- sus, offensiones, distensiones & subuersiones ve- niamus.

OBSERVATIO XXIX.

132

De inuene quodam ex scissurae supra palum cader- te, ac se ipsum lacerare.

Fit vs ille Andrezanionis Alcmariani, iuue- nis mercede pulcherrimus, vixit annoribus, anno 1547. cum per vimineum septum, instar can celorum tortum, quo rustici nostri agrorum vias concludunt, saltaret, cecidit supra palum circa dorsum, sine cutis tamen lésione: vnde huic ex eo casu violento ingens dolor sequutus est circa renes ac spinam inferiorem, vt incedere non posset. Ideo locum dolentem inunximus oleo resacae, in pulvere myrris, & sanguine ex basilica, quia iuuenis & tempus verum erat, ne febris aut inflammatio superuenirent, in brachio dextro de trahere mandauimus. Deinde vt hoc decocto sequenti vteretur, iussimus: Re. brassica rubra, parietaria, malua cum rad. ana m. j. rad. asperagi, semiculi, liquor. ana i. j. seminis nardi vulgaris, id est, nigella (vnicuique confect ad usum ab alco, vt experti sumus) seminis anisi, semiculi, carui ana 3 j. s. sem. 4. frig. maior. ana 3 ij. coquantur in aqua communi ad lib. j. adde mellis res. solati 3 iij. misce. Re. mumia, spermatis ceti ana 3 s. habar. h. olei 3 ij. trachei. aligachengi sine opo 3 s. ligentur in puppa rara, & xprimenda dum potio sumetur. Prius autem sumebat cyathum vnum, cum mu- mia & spermatis ceti ana 3 s. deinde sumebat bis in die mane hora quintae vel sextae, & a meridie hora quarta, puppa semper expressa. Quarto die ita eundem purgauimus. Re. sulzer. sene 3 iij. in fun- de in decocto pellet alii 3 v. adde olei. de succo res. post fortiter express. 3 ij. s. oxymell. simplici 3 j. mumia, muci muscicae ana 3 s. fiat potio. deinde ad maio- rem resolutionem inuimus vng. sequenti: Re. vng. dialth. 3 s. olei chemomill. anethi ana 3 ij. mi- sce. quibus dolor sedatus est, & perfecte curatus fuit.

133

SCHOLIA.

C Assus & offensus, secundum Aulicenam, vt etiam allegatur a Guidone, laceratur & impe- diunt corpora cum concussione & attritione, a- liquoties cum dislocatione & fractura. Differunt tamen inter se casus, offensus, concussio, disten- sio, submersio & attritio. vt constat apud Guide- nem tract. 6. de cat. de infir. curi cap. 5. de casu, of- fensione, & distensione & submersione. Casus e- rum dicitur, quando corpus cadit & percutitur

Cassus

ad terram, aut ad lapidem, aut aliquam rem percutientem, & sic adolefcent nosfer ad palum ceciderat: & hic rufus ille labrandus, cum sœnem in horreum reponeret, scala prærupsa, cecidit in pectus, ac sanguinem caspuebat, quem & nos curauimus: cuius historiam vide lib. 16. *obf. & curation. medicinal. nostrar. obfer. 15. vbi* & agimus de Vincencio fratre laico, etiam ex scala cadente in pectus sanguinem ea spueſcit, ibidem a me curato. Hæc quoque refertur casus illius puellæ, quæ ab arbore d'clapſa obmutuerat, quæ tamen a me curata fuit lib. 9. *obf. & curat. medic. nostrarum obfer. 30.* Non minus casus erat, sed lethalis, cum coouulſione lethali, in fabro lignario, qui ab ædibus Iohannis Puro ceciderat, & tandem ex illo casu obiit, cuius historiam habes lib. 11. *obf. & cur. medic. obf. 24.* At offensio proprie dicitur, quando percutitur corpus ab aliqua re exteriori obinante. *Vt aliter,* casus est consusio corporis, offensio solius ventris. *Vt dicitur* casus, respectu exteriorum, offensio interiorum. Sic artifex ille, insignis in vitris parandis & effigiandis Delphis, Laurentius Richardus nomine, cum a crasso illo homine, cogomento caleario, ex casu in ventre comprimeretur, inferius per anum, tum superius per os sanguinem reddebat, ita vt interiora ex compressione læsa viderentur, hic tamen per me, affinito pul. rhab. munimia, nuce mosſchata, tum alia deſoſita ad casum vel potius offensionem facientibus, curatus fuit. Diffensio autem proprie est membrorum tractus cum fune & cathena. Consusio & compressio vario modo, quauis Guido hoc non posuerit, intelligi possunt: nam & per ille cum nauis sub ponte traieceretur, & caput non inclinaret, ad frontem compressus est, & postea delirauit absque febre, hic ta-

fumi vel aquæ præfocatio. Ceterū cum de his lo-
qui inceperimus, scire oportet ex Auicēna, quod ad
caſum & offeſionem ſequitur multa incom-
moda: *nempe anſioſi lacerti, cordis, & ſtemachis,* in
quibus moritur ſtatem æger, & nouimenta ege-
ſtionis, & vrinæ & vomitus atq; ſanguinis fluxus,
ſtrictura ſheltus, abſiſſio vocis & loquelæ, quæ
omnia ſunt mala, & valde metuenda, propter ſo-
lutionem continui, poſſiſimum in ætuoſum, pan-
niculoſum & venarum, & propter dolorem &
nouimenta, quæ principibus membris & neceſ-
ſariis communicantur, & quæ totum corpus maius
eſt atq; craſſius, tanto timoræ periculum ei ve-
hementius. Addit & Auicenna, quod *glan-
dula in capſibus & offeſionibus multiplicentur, quæ
operantur ſub ſuperficie de glandulis dictum ſunt.* Iudicia
autem ſolum & offeſionum ſequuntur iudicia
magnoſum vuloſum. Exempla autem quæ
dicta ſunt locis citatis, cum iis quæ dicenda ſunt
clariorē doctrinam hanc efficiunt.

OBSERVATION 225.

De casu ab alio, in quo timebatur contagio sine effectu membrorum interrogatum.

VXo r Martini cognomēto Mercatoris, Alemariani, cum ab alto e cubiculo cecidisset, eoq; assationem membrorum interiorum seu concussionem metuebat. dolor enim ingnis ad dorsum, lumbos tum ventrem tendebat. Iiuiē autem statim *manumia*, & *sterniaceti*, ana 3. *ss.* cum *ceruſia* *buſyara* calida propinquimus. mox vſiq;uentem potionem ſumeret. iuſſimus. R. *ſemenis cum ſate*, *ſcabioſe*, *rubie ſentorii*, *cantharis rubraru*, *ceruſie*, *petroſel.* *com rad. artemiſie*, *rubie*, *ſenicula*, *valeriana*, *agrimonia*, *bugliſ.* *borag.* ana. m. j. ſine *ingella*, *anſi* ana 3 j. conciet & reliqua conqualita coquantur iu *ceruſia* cōmuni *proliſ.* ij. col-tura faccharo dulcoretur. in qua & puppa pendeat frequens. R. *manumia*, & *ſterniaceti* ana 3 j. *muſcia* *muſſana*, *trochiſcalib.* *ſine a pio* ana 3 ſs. fiat puppa, & decoctum aromatizetur cum 3 iij. *conuom.* ex quo bis in die bibens ſanata eſt.

SCHOLIA.

Inturatione casum (ex locum citato paulo ante docui Guido) & offensionū & contusionum, generaliter si auiuandū verum, cum iisdem non sit dilatio, seu fractura, aut aliqua separatio seu contusio. Quod si ita sit, curantur ve in propriis locis explicatur. Sed quantum ad propriam viciniam; curationem, quantum habent intentiones curandi: quarum prima vitæ institutum præscribit: *secunda* materiam, ne fluat, diuerit & euacuat: *tertia* locum casum, ne materiam recipiat, vel inflammatio generetur defendit & firmat: *quarta* materiam fluxam carminat & resoluat. Prima igitur completur obseruando tenuem victus rationem, & sobrie viuendo, atque omitendo carnes, *ex vultu Anacremi*, qui & primo die nihil comedere iubet, & parum in secundo ac tertio, vsque quo ab apolimentis & inflammatione arger fuerit securus. Postea vero in crassanda est diæta, & plenior præscribenda. Adhibeat

9/10/06

Differences

Compass,
Compass.

534

4704

Submergence

Secunda
intentio.

bentantem & ciceris, & ribus, ad hoc vt interiora firmantur. Secunda intentio perficitur cum phlebotomia, & ventris lenitione, cum *casta* *syntula*, *chyliferibus*, & id genus reliquis, *rhobarbaris*, & *syrrap*, *res*, *secundum* *Rhasi*, qui in hoc obtinet principatum. Tertia intentio est, vt interiora ab initio talis exhibetur potio: *Re. boli arm. mumia, terra* *syntula* $\frac{1}{2}$ lb. fiat pul. de quo $\frac{3}{4}$ j. cum aqua plantaginis quolibet mane vsque ad $\frac{5}{6}$ vel $\frac{7}{8}$ diet, & supra locum adhibeatur secundum Auicennam istud emplastrum. *Re. ph. ysclo, oriza ana p. j. boli arm. sumach ana p. lb. vel $\frac{1}{2}$ lb. alumi. gypsi, calcis, extensorum ana* quartam partem istius, incorporando cum aluminibus ouerum: fiat emplastrum. Communis tamen vsus, authoritate *Rhasi*, est, vt omnia loca lassa, inungantur oleo rosaceo (*vt nos in hoc muliere quogue fecimus*) aut oleo myrrillorum: & de super aspergant myrrillos puluerizatos, vt supra de constitutione dictum est. Quarta autem intentio completur, si post principium detur talis potio. *Re. rhob. casti, rad. rubiacentauria, aristoloch. rotunda ana* $\frac{3}{4}$ lb. fiat pul. de quo $\frac{3}{4}$ j. exhibeatur quolibet mane per nouem dies cum $\frac{3}{4}$ j. syr. acrisi &

Communis
praxis.Quarta
Intentio.

Anagallid.

agna anagallid, & confide maris ut tantundem habet enim anagallis occultam quandam in eam vim iuxta Guilhelum de Saliceto. Ad eandem intentionem Americus de Alceio dabat potionem paratam cum vino & melle decoct. rad. *esmundi, sars, & canda equina & boderia* *terrestri* in, in quantitate vnius scyphi, dum intraret lectu: per sudorem enim tota materia expellitur: ideo & stupham & balneum deterio in tertium, aut de quarto in quartum prescribat, in quibus hanc ponebantur: *consolida maior, esmundi, sanamunda, hippia, ebulus, artemisia, abinthium, rosa, chamomili, melibolum, & pul. qui sub fecore reperitur, & ibidem cum melle fricantur, aut cum isto vnguento* Guilhelmi de Saliceto, quo & Henricus vtitur: *Re. cera* $\frac{3}{4}$ lb. *resina* $\frac{3}{4}$ lb. *terebinthi* $\frac{3}{4}$ lb. *olei communis* lb. $\frac{1}{2}$ *thuris, sanguis ana* $\frac{1}{2}$ lb. fiat vnguentum: de quo etiam omni die inungatur. Si autem aliquis locus notabiliter sit contractus, ponatur desuper faba cocta cum oxymelire, & crocus in eo maxime confert, aut *oxyrocenum*, seu apostolicum, aut *solia sambuci, ebuli, cyperi, & amarifera*, cocta & pista cum lacte acetoso, *vt dicit Amicenna*. Nonnulli vero in fumo calido eos sepeliunt, & ibidem sudando iuuantur. Halyabbas & Auicenna eos cum pelle ouina recenter excoriata culida, & sale trito inaspera inuoluunt: & si fortasse (*inguit Guido*) ita dimittantur, in die secundae curantur. Hoc idem testatur Galenus lib. 11. medicamentorum. Si autem officio in ventre facta fuerit, consulti Auicennae emplastrum quod sit ex granatis syluestribus coctis cum musco, in quo ludani, & res tantundem immisceatur, & *stucco, mastice, & papyri* *tertia pars, & olei* *lauri ana* $\frac{1}{2}$ lb. parando emplastrum. In distensione consueuerunt iuniores, iuxta consilium Halyabbatis, prius loco cum manibus & pedibus reformato, teulam lineam infusam in aqua frigida supra locum applicare: & ita confortato calore sudant corpo-

ra, & finantur. Sed si eadem non profint, ad curationem iam praedictam reducantur.

OBSERVATIO XXXI.

De offensione & casu.

QVENDAM qui ab alto ceciderat, & offensione afflictebatur, haec quae sequuntur, ex prescripto Florentiole (quibus ipse in offensione & casu solebat) egregie adiunxit: *Re. rhob. & rhubarbi tinctorum gr. xv. cum vino styptico* *fiant* *pilulae*, vel pulvis quibus utebatur in principio. Postea in processu exhibebatur illi medicamentum sequens: *Re. castiae recenter tritae* $\frac{3}{4}$ lb. *mumia* $\frac{3}{4}$ lb. *rubarbi tinctorum* $\frac{3}{4}$ lb. *rhob. electi* $\frac{3}{4}$ lb. puluerizanda puluerizentur, & dissoluantur cum calida in decoct. ciccorum rub. & fiat potus. Valet etiam & haec potio solutiva in casu & offensione: *Re. diacassiae* $\frac{3}{4}$ lb. *thapontici* $\frac{3}{4}$ lb. *stictici gr. vii. mumia* $\frac{3}{4}$ lb. *rubarbi tinctorum* $\frac{3}{4}$ lb. dissoluantur cum decoctione communis, in qua bulliant cortic. *myrob. curti* $\frac{3}{4}$ lb. fiat potus. Hic pulvis contra casum in vsu est apud Colonenses: cuius auctor fuit Zitaras medicus insignis, cum cuius filio nos Romae aliquando egimus: *Re. mumia, scabiosa, pilosella hypericorum ana* $\frac{3}{4}$ lb. *casti olei* $\frac{3}{4}$ lb. *amari, nucis muscatae ana* $\frac{3}{4}$ lb. *terra syntula boli arm. ana* $\frac{3}{4}$ lb. *rubarbi tinctorum*, $\frac{3}{4}$ lb. *stictici sem. nigella ana* $\frac{3}{4}$ lb. *fermatu* *ecti, rhob. ana* $\frac{3}{4}$ lb. *crochi* $\frac{3}{4}$ lb. *de gar. cumini preparati ana* $\frac{3}{4}$ lb. *misc.* Dosis est $\frac{3}{4}$ lb.

SCHOLIA.

SI quis ab alto ceciderit, & sine voce factus fuerit, cuius exempla etiam nos alibi posuimus locis iam supra citatis, & si loquitur quidem adhuc, sed aliena profert, metuendum est cerebrum aut aliquod principis membrum laesum esse. Nam excellentia intellectus, cerebri sanitatem denuntiat, *vt dicit Rhazes*. Idcirco prius examinandum, nesci quis, qui ceciderit, mortuus vel viuus sit, tangendo pulsum, vocando ipsum proprio nomine, pilos trahendo, & nares velicando: item pupillas oculorum respiciendo, num moueantur, ponendo flocculum lanae aut eorum carpinati ante os & nares, & scutellam aqua plenam supra pectus, an moueatur pectus: deinde prouocando sternutationem cum pipere & euphorbio, & id genus. Et si non est mortuus procedendum est ad curationem, fricando extremitates cum aceto & sale & ruta, prouocando sternutationem & fluxum sanguinis cum fetis aut paleis per nares. Et ipso viuidiore facto, clysteria prescribenda & phlebotomia, & alia auxilia superius enarrata, & si cerebrum sit in causa, inquirenda curatio ipsa in capitis contusione: & ita de aliis. Si vero fuerit mortuus, inquit Guido cap. propria, non tamen eas; sed fuge, & dimitte ipsum in pace. Ceterum Elidem Bononiensis, Praeceptor meus, *vt alibi dixi*, pro sanguine coagulato & corpore hominis expellendo, tum a casu, tum percussione, concussione, & c. ob quassatione sequenti remedio utebatur: *Re. mumia, rhob. electi ana* $\frac{3}{4}$ lb. *rubarbi tinctorum* $\frac{3}{4}$ lb. *misc.* cū decoct. *pulvis nigra* & $\frac{3}{4}$ lb. Vel capiat cū aliqua aqua equum iē-

Ad casum
ram eductum
expersis
viam.Si aliquis le-
uiter notabi-
liter, si con-
fractus,
quod facien-
dum.Si offensa
in ventre
antiquior.

In distension.

ti. At pulla integra coqui debet cum penis & visceribus, eadem prius strangulata; nec aliter ocellum debet: nam ita decocti plurimum præstat in boe. quadam proprietate occulta. Sed ante huius potionem præstat venam incidere; ventosus applicare, si opus est, ad diversionem: & in pauperibus uti poteris rhapantica, loco rhabarb. Sed cū exemplis res elarior euadat, præter multatam antea a nobis citatā, illud Amati de pueri cuiusdam & su, descriptum *centuria 3. curat. 9.* nunc adferamus.

139. *Ira cecidit alia, ex quo lapsu per duos nunquam e-*

Amati historia, de casu ipsam purtina.

mortuus sacris diebus, ad quem accedens ipse proximū eum totum conspexisset, & nullus vultus aut fraturam luxuriamve habere deprehendisset, ipsum in fonde vino styptico & bene calido immersa, ac paululum manibus expressa, comolui, & in leito optime cooperiri feci. quo remedio copiosissime sudans, & sanus fuitus fuit. Est autem huius generis remedium apud Hispanos in omni lapsu admodum frequens, & vñtatum, a scribentibus de casu & offensione prætermisum, quum tamen potissimum sit. si tamen æger cibare illo tempore aliquid potest, inter tam multa ab auditoribus scripta, & ab Angellā in sua Chirurgia citata, ad pulueres Mesuz cap. de Rhab. conferiptos confugimus, quos in potu tribuimus, & ita habent: *Rhab. bem acerbi 3j. mummia gr. ij. rubie tinctorum, vel ut aliis placeat, grani tinctorum gr. j. ff. omnia puluerizentur, & vino styptico excipiantur; & bibat.* Porro vinum stypticum in quo sindon imbuita fuit, sic conficitur: *vinum rubrum vel folum vini lib. x. cui superaddas rosum rubearum siccatum, versifmarum, summinum myrti ana m. ij. in cacabo vel calidario ad ignem fiat decoctio.* In quod vinum sindon vel stragula immergatur, & parum manibus exprimitur, & eo calide optime æger inuoluatur. Quomodo autem stypticum hoc vinum sudorem euocet, percontabitur forsā quispiam, cum sua adstrictione id corpus constringere potius quam dilatare, ratio distet? Nos huic dubio respondentes, dicimus ita huic vino cuenire, veluti oleo rasi concinnato, & inde rosacea dicto, quod ob contrarium a rosis stypticatē penetrantius sit, quā per se oleum esse cōsuevit. Sic & æteri, ob partes constringentes suas, subtiliores impellit, ideoq; magis penetrat. Vinum igitur hoc per expiramenta ingressum, commotus ex lapsu humores subtiliat, & extenuat, quos sic extenuatos & in vaporē resolutos, per expiramenta siue exiguos omnes ex corpore molis meatus (*vñt Græci vocant*) natura eiecit, qui postea in cute eōdenlati frigiditate, in aquam vertuntur, & sudor refultat. Vel si magis placeat, dicas naturam, roboratam vini stypticitate, ad cutem exteriorē, per eius poros, eos humores, qui membrum obfledere aliquid, transmittere, ex quibus sudor surgit. At & alterum exemplum de casu, cuiusdam Amati, in curatione x. sequenti positum & hic subiiciamus. *Ad arena Hispana, meretricis Romæ famossissima, quā domum infestantē curaret, quam paucis ante diebus milia & quingentis au-*

*reici ducati emerat, contigit, ut ex quadam parte auderet, a quo casu universum eius corpus cōsummatum fuit: mox variis in locis signa quedam apparuerunt, quæ Græci hypoplasmatia, Romanis sigillata & lunata vñt illi prommentiora, aut vibices appellantur. Ad hanc igitur accuri ipse, illico pedis venam sigillatam dactilam sicari feci, sanguisq; & vñt fuerit permixti, quæ sanguinis missione pulueris, prædicta curatione descripta exhibendos quosque illi dedit, & stragula vino rubro styptico confectio immersa, ac manibus expressa, cum obvolu sicimus, & in cubili optime cooperiri, quibus optime sudans, & intra quatuor dies sanatus fuit. Porro a vino iū diebus semper abstinuit, & pro vñt panacellam, vel panem lotum, succobro cooperitum, aut huius generis similem cibum accipiebat. Ceterum vibices ex thapsia ceræ mixta, remedio, si Plinio credimus, Neroni satis familiari, breui ex toto evanuerunt. Nam & ceruā raphani fuceo excepta ad eadem multum valet, vt albumen oui per leaut constringentibus pulueribus mixtum, vt cetera alia varia præteream remedia, secundum varia tempora morbi adhibenda. Huius morbi curationem profequitur Galenus lib. 5. de compos. medicam. secundum loca cap. primo: ex quo pauca hic subiiciam verba, vt notetice nolcant (*inquam Amati*) quanto errore detineantur in curandis vibicibus, quā illico morbi initio balanstia, cericibus granatorum, myrti & alais constringentibus remediis, & potentioribus vtuntur: quod quam a Galeno alienum sit, & a vera curandi methodo, hæc ipsa Galeni verba ex loco citato testantur, quæ ita habent: *Dactilum etiam antea a me est, quod ex discussis remediis in principio præstantur affuit, quæ modicum asstringendo vim compellunt, qualia sunt rasi & melilotum & cetera: non tamen ex eiusdem pharmacevum numero est myrtus, utpote vberius constringens: quapropter ego nunquam ex rasi (*inquam Amati*) auerem, præsertim si iam lauidis sui cōsuetudine.* Hactenus Galenus: qui myrtum pro his curandis vibicibus vituperare videtur. Sed de vibicibus videnda sunt ea, quæ diximus lib. 5. de*

remediis præter naturam schobo obs. 4. Huc spectant ea quæ conueniunt verberatis & percussis cū virga, & vbi verbera vel percussiones cadunt supra membrum aliquod: *he. sulphuris, salis ana p. 2. terātur, & misceantur cum dñplo mellis, & decoquantur ad spissitudinem, & supponatur locis affectis, confert attritionib. neruorum & lacertorum, propter calum vel obuiationem vñtientium. Alii vero inungūt loca percussa flagellis cum oleo rasi mixto cum pulvere bolæ arm. & myrti: nam mitigat dolorem, & locum affectum ab inflammatione aret. Transactis tribus diebus aut quatuor, inungantur oleo rasi, vel samburo calido, & postea in processu cum sequenti: *he. resina 3 iij. cera 3 j. ff. pone ad ignem, & liquefactis adde terebinthina 3 ff. olei communis lib. j. fenigraci, timarii ana 3 ij. bulliat aliquantulum, deinde cola.* & cum eo mane & vespere ante cibum inunge. Decoctio contra casum & hæc experta habetur: *he. nepeta, agrimonia, pileolla, calamus lib. p. perperph-**

Ad vidim.

De vñtibus in & percussis virga.

141. Ad attritionem neruorum, & lacertorum, perperph. Ad flagellatos, & vñt.

Decoctio contra casum experia.

Alia Amati historia, de casu.

140

B. pimpinella, melissa ana m. B. rad. valeriana, consida maioris ana & j. sem. anisi, feniculi, rubia tinctorum, nucis muscata ana 3 ij. fol. salic. ana 3 j. j. m. m. 3. rhabarbari 3 ij. fiat decoctio in s. q. aqu. prob. lib. j. dulcoretur cum melle rosato. capiat maneat cyathum unum.

OBSERVATIO XXXII.

De iis qui ex nimio pondere lenato aliquid mali in corpore sentiunt.

QUIDAM ob leuationem lignorum crassiorum ac ponderosorum incurrit pectoris conuulsationem, unde & dolore in ingentem patitur in pectore iuxta axillam, prope mamillam dextram, ut aegre tussire ac anhelum trahere possit. Cum autem iste dolor perduraret per quindecim dies, tandem vocatus est ad eum Laurentius Bruninck chirurgi doctor insignis: qui cum metueret ex vena aliqua trupta ex pondere leuando sanguinem concretum esse, phlebotomiam adhibuit in manu dextra ex saluella eiusdem lateris dolentis. Postea vltus est continuando hac decoctione: *R. calamentis, hyssopi, absinthij, nepeta, sanamunda ana m. ij. melissa m. iij. fiat decoct. in aqua communi, & cum melle fiat syr. longus.* Loco veto dolenti apposuit oxycroceum: & breui curatus fuit. Quemadmodum & in illo, qui ex Flandria adueniens, simili casu afflictebatur, appositio oxycrocei circa mamillam, dolor qui durauerat per sex menses, cuanuit. Ita & nuper alius, qui ex pondere leuando ingentem doloris dolorem habebat, vt vix se mouere posset. qui me consultandi gratia accesserat eum lotio. Cui hanc potionem prescripsi: *R. melissa, nepeta, hederia terrestris, vol. scabiosa, pilosella ana m. j. liquor. rosa & B. sem. anisi, nigella ana 3 j. fol. salic. ana 3 v. rhab. salic. agarici simon. ana 3 j. j. pica, squamantis, xanth. alb. ana 3 B. v. uar. pass. eumic. 3 B. coquantur in aqua communi pro 3 v. & fortiss. expressioni adde oxymelli simplicis 3 j. vel syr. acetosi simpl. m. m. nucis muscata ana 3 ij. misce. fiat potio pro duabus dosibus matutinis. Inunxit autem primo cum oleo rosaceo & myrrina, postea adiecto oleo chamemilli deinde appositum est oxycroceum. I hac etiam potione felicissime in conuulsatis vtioleo: *R. fol. salic. ana 3 ij. infundens in v. decoct. com. & fortiss. expressi. adde el. ct. de succo ros. 3 ij. m. m. m. nucis muscata ana 3 j. oxymelli simpl. 3 B. fiat potio, sumenda in diluclio.**

SCHOLIA.

IN omni corporis latione, ex hastiludis, casu, offensione, concussionis, aturione, ex pondere leuamine, percussione, aut quauis conuulsatione interna, praestat aliquando phlebotomia salutaris adhibere, si omnia iam saepius a nobis dicta consentiant. Quidam, vt diximus, pelle ouina recens dilaniata, sic conspersa agrum calide apud ignem inuoluunt, & dimittunt vt sudet: quia

tum ferre potest: sed mox deposita pelle oblinunt oleo rosaceo, myrris, & chamemill: & antequam pellem deponunt, dant hanc potionem: *R. rhabarbar. electi 3 j. m. m. m. 3. rhab. uict. er. ij. puluerizata ponantur in aq. ana & ij. v. v. albi & j. addendo & j. vel B. syr. acetosi simpl. & syr. poma.* Et si laxio sit inueterata, detur vinum decoct. melissa, calamentis, nepeta, valeriana, sanamunda. Hic potius ad soluendum sanguinem conglatum ex casu egregie commendatur. *R. pul. car bonum vssitum, latum ex tula arboris cochlear parum, & exhibeatur cum lacte ebutytrato, calide, ad quantitatem boni haustus, mane & vespere: & post duos dies haustum ceruisia calida, cum paruo cochleari olei oliuatum mane & sero sumat: & ita continuando ad duos tresve dies, si quis sit sanguis congelatus, per secessum exhibi, vt experientia probatum est. Dicitur & succus hederia, si bibatur mane & sero, sanguinem congelatum ex corpore educere. Alii quassatis, vt *Paulini*, butyrum antiquum igni appositum cum talicibus salinis colarum per pannum, cum calida ceruisia commode exhibuerunt, quidam, ne apostema fieret post casum, modo non adesset magna caliditas, 3 j. pul. rubia tinctorum dederunt. Sed & hic potius egregie conferte traditur iis, qui ex nimio pondere leuando quid mali sentiant in corpore: *R. butyro recens & ij. casis variis oleis 3 j. liquefiant simul v. praigrem, & exprimantur per pannum, aut lectacco excipiantur.* tunc *R. ceruisia Gedana aut al. terum optime lib. j. spermatis ceti, nucis muscata ana 3 j. misce cum butyro suprascripto, & fiat potus, capiat bis in die, deinde & haec applicentur loco affecto: *R. folior. vol. m. y. conuulsantur, addendo sursum irritum macris m. j. achungia, porcina 3 j. B. aqua vna, 3 B. vel parum plus misce, & appone.* Verum & hoc conditum a quibusdam in forma opiatate probatur: *R. m. m. m. 3. capill. Ven. melissalij, hypericonis ana 3 j. sem. amari, cyperi longi, myrrina ana 3 B. nucis muscata, rubia tinctorum, spermatis ceti ana 3 m. j. sem. nigella, trochis. de agar. costi dulci & amari, boli arm. terra sigill. ana 3 j. oxyrac. compos. q. s. fiat opiatate, detur ad magnitudinem fabae, vel 3 j. cum vino calide, vel paulo plus, pro vice, & omnis sanguis coagulatus se ipsum diuidet, & expelletur, vt probatum est sepiissime, modo deinde detur fenum decoctum cum pul. pas. lauauit duplicato rhabarbar. 3 B. vel 3 j. v. v. pro euacuatione. Ad contorcionem valet sequens: *R. olei ros. olei myrrina ana & B. cum albulumani oui conuulsantur: & inungatur locus: & desuper aspergatur puluis dactylorum, myrris, & ros.* Sequens quoque probatur ad fluxum sanguinis ex vulnere vel conuulsatione in interioribus: Radix ofonunde teratur, & cum ceruisia recenti detur vulnerato: statim facit sanguinem exire cum impetu, & istud fertur saepe expertum. Idem praestat fucus neptitae, si bibatur, & sine mora sanguinem expellere dicitur. Quidam cum cecidisset ex equo, mansit sine loquela per magnum tempus: deinde post sanationem permansit diu stolidus.***

¹⁴⁴ dus: quem Petrus cum syr. mellis & decoct. strachad curauit. Auicennæ auctoritate, seu prima, tertiū.

OBSERVATIO XXIII.

De submersione aquæ.

CVM puer ætatis sex aut quinque annorum (vta parentibus posita accepi) cecidi in aq., & fere submersus fui. Sed astantes cum me ex aqua contraxissent, super cupam rotundam circumoluerunt, vt ita aqua vomitu per os exiret, & ita liberatus fui. Attamen hoc ipsum non semper mihi probatur, cum aliqui hoc modo subito extincti sint, qui violentam illam motionem & capitis gyrationem, ac subsequētem inde vomitionem, totiusq; corporis interioris perturbationem tolerare non poterant.

SCHOLIA.

De submersione aquæ.

DISTINGVITVR paulo ante ex Guidone submersio nem esse vel sumi vel aquæ præsecutionem. Si igitur immeritus fuerit quisquam, consulit Halyabb. sermone sexto paritè secunda, vt pedibus suspendatur capite demisso, vt eo modo commodius aqua ab eo exeat. Post hoc iubet & Guido cap. proprio, vt acetum decoctionis piperis accipiatur, quo submersus sex plus gargarizet os suum, deinde aquam cicoris aliquibus diebus forbeat. Huius quoque exemplum alibi posuimus, de infante, puellula circiter trium annorum, quæ in vasculum aqua saponis plenum demersa fuerat. Ceterum si fumo aliquis dissolutus fuerit, aut præfocatus, si spuma ad os feratur, nulla via superest ad eius salutem. Si autem non spuma uerit (in enim Guido loquitur) oleum violarum gargarizet, & aquam tepidam decoctionis frumenti forbeat, & calida cibaria pinguis deglutiat. Sed nunc de uero ad vulnera: redamus, & de his dicamus, quæ mox fu sunt, aut ictu animalium venenatorum.

De submersione sumi.

OBSERVATIO XXIV.

De ictu ac vulnerebus illatis ab animalibus venenatis.

PLVIMA animalia (ut in Scholis sequi disti sumus latius) ictu nocent. Sic ego anno 1539. eū Louanii in initio studij mei artis medicæ, post solstitium æstiuale forte fortuna circa moenia ciuitatis, gratis addiscendi & colligendi herbas deambularem, ex apum aculeo fortiter ictus in extrema & molli eute indicis, ac carnem penetrante, intolerabili cruciatiore dolore; ita vt nec comedere, alloqui sanus, neque bibere, aut dormire possem; & aculeus cuti infixus ac latens, minime extrahi potuit. Quamobrem perlustratis quibusdam libris medicis (quorum copia mihi tunc adhuc rara erat) tandem incidi in cap. 90. Diosc. de lauro: idque primo per indicem curarum morborum in Dioscoride contentarum: quærens scilicet aculeatorum ictus remedia: & inueni, Laurum, malum, silymbrium, anisum, althæam, & similia conferre, & ad hunc casum vtilia esse quare recurrens ad caput 90. citatum de Lau ro, ita scriptum inueni. *Habet autem excelsissimam*

*riam naturam, & emollientem: unde decoctum eius baccari in muliebri infusio additū, vulnus, & vesicae curari cōuenit. Virentia filia sensim substringant, illata quoque ac trita vesparum apumque ictibus opulantur, &c. Hac auctoritate igitur inductus, altero die post puncturam accepi folia viridia ipsius lauri, & fortiter pistillo ligneo in mortario lapideo contudi, & emplastrum modo hora nona ante meridiem loco affecto apposui, & sensi statim attractionem vehementem, ita vt ante prandium magna ex parte dolor ille ingens cessauerit: quare dolore sedato, & viribus recreatis ex cibo quem tunc prius sumere potui, post meridiem deinde nullum vestigium doloris in digito relictum est: quare & hora tertia pomeridiana emplastrum cum amouerem, vidi aculeum profusus extractum & radicatus ab emplastro euulsus, ita vt supra carnem digiti vulnerati seu icti iaceret: eoque aculeo amoto denuo emplastrum per totam noctem admoui: qua nocte etiam opime dormiui: & mane abiciendo emplastrum, nullo alio medicamento utens, sine dolore tum sanus euasi. Multa itaque, vt diximus, animalia ictu nocent. Ita memini quondam Iacobum Teyliogium (a quo ad ipse audis, licet non interfuerim) curam in mari nataret, ac in littore piscis ille acanthius marinus dictus (a vulgaribus vero *Pieterman*) clam iaceret, ad eius pinnas venenosas cum digitem pedis offendi: sed ex leuissimè, tanto dolore affectus est, vt hominem ad insaniam conuerti dixisses. Adfuit tunc fortuito piscator marinus quidam, qui statim subligaculo ex brachialibus detracto digitem pedis ictum quam stricissimè ligauit & constrinxit, vt digitus pœne stupidus fieret (hoc enim vocemur remedium, ad ictum huius piscis venenatis ferunt) & ilico liberatus fuit. Refert Galenus, de loci affect. cap. eodem: Cum nuper illius esset a scorpione quidam, videretur mihi videre, inquit, quod grandis percussus sim, & subinde omnia ut frigidus est, sudore etiam frigido accedente: sed tandem debitus auxilium remedium, non sine negotio seruatus est. Sæpenumero enim infingente aculeum scorpione in neruum, aut venam, aut arteriam, manifestè videmus percussos vehementissimè infestari accidentibus. Atqui scorpionis aculeus, totam cutem penetrando, ad profundum usque potest penetrare. Expertus sum etiam, cum a *Alexandria* essem: Rusticus quidam non longe ab urbe in una manus digitorum draconis ictu percussus est: eius radice apud palmam validissimo veneno ligauit, accurrensque in urbem, ad familiarem sibi medicum totum digitem ab ipse disposuisse ad palmam usque abscondendum præbuit, sperans se inde nihil amplius male passurum. Neque frustratus est sua spes: quippe nihil aliud facti salutis euasi. Similiter alium noni, qui epoto & vespertino medicamento, reuerti prius digito, aperiens liberatus est. Vt prætere arusticum, cuius totum digitem vespere momorderat, qui salce, quam tunc forte habebat (erat enim agricola) ab ultimo articulo istam partem rescant, deinde undè illa in digito exeat, nullo summo medicamento sanatus est. Hæc Galenus. Sed & ego apud præceptorem meum*

¹⁴⁵

¹⁴⁶

¹⁴⁷

meum Elideum quoque vidi, cum aliquis ex nostris condiscipulis (*cum quo vna agrum quandam Iudaum inuiscabant*) a scorpione in loco humido supra pedem per caligam ictus esset (*habebat autem calceos in supremis partibus excisis*) præceptor iussit, ut ipse palma audacter scorpionem eundem percutiendo encicaret, ac mortuum scorpionem vulneri adalligaret, quod & fecit (*nam hoc vnicum & præstantissimum remedium esse, præceptoris suo & merito credebat*) & nihil deinde mali fuit. Eo autem tempore hæc vidimus Bononiz, cum præceptorem in praxi sequeremur. Refert & Amatus *cert. d. curat. 31.* historiam cuiusdam viri, qui a scorpione in manus digito punctus, cum & ibidem multum doleret & refrigeratus totus contremere, per totum etiam corpus dolores, cute tota quasi acu puncta, formicantes patiebatur. Ceterum & hic scorpionem, a quo punctus fuerat, ilico interfecit, eumque contudit, & consulum puncto digito superposuit: & breui a dolore liber fuit. Ad aliquot tamen dies, digitus totus excoriatus fuit, & quasi ab igne exultus redditus, quamvis ex toto sanatus. Scorpis itaque qui læsit contritus & super locum positus, iuuat, ut testatur Dioscorides, sic dicens, libro sexto, suæ medicinz: *Remedio erit scorpionis punctura scorpis ipse, qui læsit, contritus, & super locum impositus, tamquam iniuria vindæ, & perniciem, quem vixit corpore suo leni & subdit: Prædesti scorpis quicunqueque, erit, cum sile. ac leni semine, & alius hoc hæc impositus.* Sed & Romæ puerum vidi apud Gissbertum Horstium medicum Xenodochii S. Mariæ Consulatricis Romæ, præceptorem meum carissimum, cuiusque filium vnicum, qui cum luderet (*ut ipse præceptor mihi narravit: nam antequam Romam accesseramus, hæc euenissent, cum puer iam adolevisset*) cum vipera, quas in horto in vase magno lapideo ipse Gisbertus aiebat, valde alto & quadrato, ut inde exire non possent: verum cum torrida æstas esset, & canicula fulgeret (*quo tempore & arcesores, & aëdiores sunt vipera*) vna quidam ex viperis ex vase exiit, puerumque colludentem in manu momordit: quem repperit deinde mater, hortum intrans, semimortuum vipera non longæ puerose conuolante. Commouentur medici quam plurimi, nam Gisbertus facile primarius medicus Romæ, pater ipsius pueri, multa longius ad suos ægros diuerterat, ut reperiri non posset, quamvis tandem ad puerum & filium suum venerit, quem alii medici tractabant, eumque vtepotè inuidi obiurgabant, quod necis occasionem filio dedisset, ad viperas in horto suo reueruatas. Ceterum cum auxilia eorum non proficerent, Gisbertus filium arripuit, & vsque ad brachium, locum veneno affectum ex mortu cum sentibus ac rubi spinis scarificauit: & in sperfo aceto, ac aliis adhibitis alepharmacis, filium præter opinonem aliorum medicorum a morte liberauit. Ex

quibus etiam liquido constat viperæ virus diebus canicularibus magis incallescere ac inualescere, & vim suam maxime exercere. Hinc & Alanus inquit: *Vipera virus habet, qua cum calet & exandescit, venum illud, prohibet ne caleat.* Ideo autem vipera dicitur, quasi *vi parens*, quia non nisi ruptis visceribus parere dicitur, neque concipere sine maris interitu; nam dum concipit, caput, quod coitura semper in os sumit, abrodit. Neque igitur patrem neque matrem viuentem vipera prospexit, benignitate forsitan naturæ, ne tam lævus pestis nimium multiplicaretur. Porro venenosa sunt omnia illa animalia, quorum natura quam longissime distat ab humana temperie, aut opposita & inimica est speciei: qualia sunt serpentes, tyri, dracones, lepus marinus, & carni affata & statum suffocata, & pisces frigidi, & morticina carni & putride, & quæ a fulgure sunt percussa & mortua, & quæcunque patiuntur rabiem. Sed de his latius in Scholio sequenti. Refert autem Amatus Centuria 3. curation. 14. quod veris tempore præparante, æstas nempe inuente, duo iuuenes Ancona Anximum civitatem proficiscebantur: quorum, alter cum ab itinere itinendo grana duntaxat, viperam prope arboris cavernam offendit, magno quidem applausu, sed infelix successu. Contendebat enim in eam sicco, afformat, se viperam illam, matris suæ, absque offensa aliqua capturum: gloriabaturque nonnullis marmaratis aut susurratis a se verbus serpenti omnia tamquam stupore affecta illi obicere. Alter vero hunc deridebat. Tandem ad spersionem rei devenit: sed vipera plus iussu adæx, truculenta, immota semper mansit.

Demum cum in manum portressisset, ut illam, caperet, illa rabido & venenoso furore percita, oculo collo ipsius in manum digito momordit: qui cum sic commotus doleret, crassissime ora aëritum admovisset, forte ut sanguinem dentibus compresso digito fugeret, non vero ut mortem sibi conficeret, sed brevis infelix hic sua culpa mortuus fuit: neque medici auxilia illum quicquam, suaverunt: emissis tamen, in serpentis venenum ori admixisset.

Roma autem tunc Anconam nos recipiebamus. Hactenus Amatus: apud quem etiam videre poteris egregiam curationem cuiusdam puellæ a vipera morisæ, & lanæ, centuria prima, curatione prima, de viro quoque Anconiano, qui serpentem interfecerat, & ilico de capitis dolore queri cepit, febricitavit; ac demum in dies graviora omnia sensit symptomata; ac vndecimo die obiit. Vxor quoque Nicolai Secretarii Haghani, cum sepe cum simia domestica colluderet, digitum ei momordit simia, vulnusque infectum valde difficulter a chirurgo perfanari potuit.

61

qual dele-
ram creat.

Morsus canis rabiosi per initia nihil molesta adfert, praequam ex oculis dolorem.

Scorpiones
id est, quæ
funtentia
venerunt.

Campanile
sonant mar
fais & c.
vibrante.
résonance.

Geminam
efficitur, et
rationem, in
suis membris
et in se con-
tinuat.
Firmior
est membris,
vel in con-
tinuitate,
quod autem
in membris
est.

Secunda, ut hoc omnia totam eius, quod in se habet, in se habet, et ex
parte eius, in se habet. Aliqua auxilia non sunt, et ex parte, quod

qualitatem per contrariam qualitatem alterant. Scilicet exhibentibus nobis, firmitermentem calorem eger velin ipso demorfo loco, velin toto corpore sentiat, auxilia refrigerantia, *sic frigus sentiat, calefacientia.* Hactenus Galenus. Eius autem compendiosam dictionem & vniuersalem methodum sic interpretamur. Inter ea, quæ virus e profundo euocat, primo medicamenta enumerat, quæ calfaciendi facultate prædita sūt, deinde euacuribilia & cornua, postea vtro oris functionem, & postremo vñtionem, quæ vel ferro vel medicamentis fiat. Itaq; de his singulis nobis dicendum est, quo res perita magis cuiq; euadat, ac modus vñus eorum neminem lateat. Id autem in primis omnes scire volo, ea quæ modo ex Galeno retulimus auxilia, & id genus alia, quæ mox subiungemus, si primis dictis prætermisiss fuerint, frustilla postmodum adhiberi non enim virulentum illam materiam, quæ iam ad intima, neglecta curatione, pertransit, sat se euocare possunt. Quare nulla vñque adiectionis eorum foret vtilitas, sed incassum corpora doloribus scernerentur. Inter igitur principia morbus aut id est illud, hæc & similia deferenda erunt. Sed & priusquam hæc, quæ sic

2015-2016
 2017-2018
 2019-2020
 2021-2022

Copy false.

Female sex
gustified in
voluntary
camp.

155

tem in cupa vini violentius cultro excinderet, se ipsum paulo fud genu in fura læsit, ac arteriam vulneravit: cumq; ex saliendo sanguinis impetu efflueret, digito vulnere injecto sanguinem cohibuit, & me, qui non procul tunc ab eius adibus habitabam, tum chirurgum vocari iussit: & nisi ita cohibuisset sanguinem, procul dubio iam ex profusione interiret. vt & paucis ante diebus eodem tempore euenit Gualthero Renero fabro iuueni qui seipsum ita quoq; vulnerauerat: nam is ilico ex sanguinis profusione interit. antequam chirurgus ad eum venire posset. Ceterum vbi coram fororiorum eo sic vulnerato venissemus, adhibitis sanguinem restringentibus hic tandem aptis remediis per nos sanatus est. Quod si sanguis remediis restringi non potuisset, vitionem adhibuissimus. Hoc enim modo arteria in coxa vulnerata in iuene Delphensi cum remediis constringi non posset, curatus is fuit cauterio actuali, & ita a morte liberatus est. Similem fere casum refert doctissimus ille Beniuenus, libro suo *De abditis rerum causis*. cap. 49. ita scribens: *Orta, vt asfoli, inter comensantes lute, cum quidam & communis arripimus calicem in Alphonso Hispani familiaris nostri faciem praeuocasset, & incisa arteria, ac cute dilacerata sanguis copiosus erumperet, multa quidem, sed frustra, adhibita sunt medicamenta, cum eas arteria ipsius condito, vt incisa corae aut sanescere extra vitionem non posset. Quare cum sanguis ipse eo semper vehementius profunderet, quo plura astantes experirentur auxilia, & homo iam vultu exhaustus deliraret, ad nos tandem mittunt, rogantes, vt si fieri posset, amicum mortis eriperent. Venio igitur ad eum, vultum inspicere, virtutem explorare, nullum superesse profundum videri, praeter vitionem solum: quare ea qua potui diligenter incisi, arteriam cadentem ferro inuro, & statim suppressum est sanguis, quo imbuta, reliquum curam faciem suam & expectandum habuit ad sanitatem regressum.*

S C H O L I A.

De vulnere cum profusione sanguinis ex vena & arteria.

159

Gal. lib. 5. method. medendi.

Profusio ex vena v. l. arteria sanguis.

POSTEA QUAM de vulneribus, quæ carnosius paribus incidunt abunde satis determinatum est, nunc tempus videtur, vt Galeni doctrinam, atque institutum sequentes, de iis vulneribus dicamus, quæ in arteriis & venis sunt. Ergo si cui arteria venae magna vulnerata est, & copiosum sanguinis profluvium cõtinuo superuenit, glutinari id vulnus difficile quidem etiam in vena est, in arteria vero non solum difficile, sed etiam, quod fieri sicut nonnullis medicorum est visum) omnino fore tale non possit. Dicendum ergo de vrisq; est, vulnere inquam, in arteria aut vena accepto, & hæmorrhagia: ac prius quidem de sanguinis profluvio, quippe quod magis vrgeat: secundo vero loco de ipsius vulnris agglutinatione ac curatione. Sine prestat ex vena, vel arteria sanguis, aut tunica earum diuisa, aut resecrata earum ore (Græci *αἰματιον* vocant, vt etiam alibi diximus) aut (vt sic quis dicat) transcolatus, siue transmissus, vt in diapedesi. Vtrum quoniam in duabus pullerioribus causis solent magis nec-

dici, quos phisicos appellant, accersiri, hic duntaxat agemus de sanguinis effusione, quæ ex prima causa ortum habet, & vulnera consequitur, hæc namque ad chirurgum magis videtur pertinere. Ceterum sanguis profunditur interdum ex arteria, interdum ex vena: atque ex earum quidem aliquando vna duntaxat, nonnunquam vero ex pluribus, iisdemque, vel maioribus, vel minoribus. Sed & sanguis erupit accidit ex eo interdum vulnere, quod cum amissione sit substantiæ, aliquando vero ex eo, in quo nihil substantiæ deperditum est: interdum etiam cum effusione, interdum vero citra effusionem, quæ Græcis *Ἀἵματιον* dicitur. Item quandoq; iam profuit sanguis, & quandoque postea fluxus est. Interdum quoque causa huius profluvii sanguinis apparet, est, quæ in vena aut arteria diuorui facit, cuiusmodi est fistula, telumve aliquod, aut erosio præsens, & non ex vulnere cecitata. Hæ itaque sunt differentiæ præcipuæ profusionis sanguinis in vulneribus, a quibus curandi indicationes deducuntur. Porro causæ sanguinis fluxus, ex diuisione tunicæ venarum, aut arteriarum sunt, vulneratio, contusio, ruptio, erosio. Quæ autem vulnerant, ea sunt acuta, atque ad fecundum habita: cuiusmodi sunt sagitte & gladii. Quæ contundendo solunt, ea grauiora, duriora sunt, vt sunt lapides, aut quæpiam grauis moles. Quæ rumpunt omnia, id tensionis interuentu faciunt. Tensionem autem efficiunt, intentior actionis vehementia, succi abundantia, non vtique virium respectu, sed quæ cum a vase suo non continetur, etiam casus ab alto, & graue quippiam, durumque incidens. Erosio autem venis & arteriis intrinsecus saltem accidit, ex succo aliquo, cui mordens natura inest, vt est bilis flaua: vel atra superaffusa. Ex iis itaq; manifestum euadet, quod venæ vel arteriæ vulnerari non possunt, quæ cutis & caro vulnererent. Proinde suppressio iam sanguine, glutinandi, seu (vt dicunt) incarnandi indicationes, ab ipsis (carne, inquam, & cute) sumendæ sunt, vt in sequentibus dicitur. Signum venæ atque arteriæ incisæ, est sanguinis profusio. Quod si sanguis cum impetu, ac saliente profluat, & tenuis ac flauus cruentusque appareat, arteriam diuisam esse significatur. Si vero crassior & nigrior conspiciatur, ac quæ sine pulsu & citra salum effundatur, indicium est, ipsum a vena effluere. Hæmorrhagia, id est, sanguinis profluvium, omnium calculo, ac iudicio periculosa est. Nisi enim conflueret ac suppressimur, mortem adfert inuitabilem: Quippe quod sanguis (vt docet solus) naturæ sit thesaurus. Ad hoc syncope, conuulsio, delirium, singultus, in hæmorrhagiis malum portendunt, vt *Aesculapius post Hippoc. anatomen*. Porro subit admirari quod arteria per transfusum dissecta (quod *Atræidus scriptis prodidit*) promptius eualeat & agglutinatur, quam si secundo um longitudo in eadem diuisa. Ad nunc curationem profusionis sanguinis ex vulnere ponamus, hoc exemplo sequenti rem ipsam prius ob oculos ponendo.

Diaporesis.

Causa.

160 Erosio causa interna.

Differentia, quando sanguis ab arteria, & quando de vena roratur.

Prognostica.

Aph. lib. 5.

OBSERVATIO XXXV.

De sanguinis profusum ex vulnere.

HENRICVS Spiers chirurgus suo tempore insignis in Haga. Comitibus, qui multas mammillas cancro laborantes abscindebat, ad sanguinem profluentem restringendum, etiam in membris quæ ferta aurescebantur, commode hoc restrictivo utebatur: *Re. Petrosi Romani lib. 3. acetosus lib. ij. bol. & j. adde. li. velis. crori Martis. & minus salit. & j. misce.* Quidam hoc tempore solo croco Martis contenti sunt. Sed hoc quod lequiritur, ut a quodam accepi, numquam scellit: *Re. argenti sublimati & j. probe miscuam. ung. populi. & vtere vt nollit.* Alius hoc restrictivo in vulneribus nimium sanguinem effundentibus utebatur. Vtineam seu muscum arboris sambucini vulnere ponebat, & non extrahat prius quàm vulnus pallefceret: sanguinem enim in vulnere stringit: quemadmodum vasa spermatica vituli cum *duclimo* li. comburentur, & in pulcrem redigantur, mirabiliter sanguinem stringit, hoc pulvere videntur Iudei dum pueros circumcidunt. *Galla perforata* ignitur & restrictio in aceto in pulcrem redactæ sanguinem e vulnere fluentem aut ex vena compefunt. Siquenti vero pulvere restrictio sanguinis M. Iodocus chirurgus insignis utebatur *Re. calcis vine. vitrioli albi. auri ana. q. s.* Sed & hic pul. valet ad restringendum sanguinem: *Re. aluminis combust. corticem granat. albi ana. 3. j. vitrioli Romani 3. j. sang. drac. balenst. ana. 3. j. acacie 3. j. fiat pul.*

S C H O L I A.

Curatio pro profusum sanguinem ex vulnere. Modus restrictio hæmorrhagie.

CAPITA methodi, quæ sanguinis profusio ca vulnere, quæ ad manum sunt, curantur, duo traduntur a Galeno, quibus Auiicennas rerum addidit. Ut igitur omnium fiat mentio, hæmorrhagia trifariam fistitur, primo iis quæ fluuio nem avertunt, tum deriuant, tum reuellendo: secundo insensuantibus, atque interceptis fluuio nem: & tertio topicis, id est, localibus auxiliis.

Auertentia.

Porro ea iis, quæ sanguinis profusum avertunt, tam a vcnis quam arteriis sanguinem fundentibus (*hæmorrhagie hæmorrhagie proprie debent avertentia vniuersalia auxilia*) quædam id efficiunt citra villam extra corpus vacuationem: alia vero cum euacuatione. Citra vacuationem, fluentem e vasculis, sanguinem avertunt & alio trahunt. *cucurbitula sicca*, seu *lenis*, & cum stimula ad motu, frictiones, ligaturæ, primum in propinquoibus partibus factæ, deinde in remotioribus. Avertitur autem sanguis cum euacuatione, atque ad alia membra conuertitur, tum ad proxima denuat, tum ad contraria reuulsus, vena in ea parte incisa, quæ profusione directæ respondet, quæq; ipsis membris sanguinem fundentibus coniuncta est. Itaque hæc (*ingust Galenus lib. 3. Methodo medendi*) Hippocratis inuenta sunt: omnis scilicet immo-dica vacuationis cõmunis remedia.

162

Porochi. canis. Antiphostis.

Deriuatio ad latus & ad vicina fit: reuulsio ad contraria, non tamen semper ad remotissima, vt salso quidam putauerunt. Illam *porochi. canis*, hanc *antiphostis*, Græci vocant. *Antiphostis* igitur,

id est, reuulsio, in iis quæ supra sunt, omnibus derorium semper agitur, sursum in iis quæ sunt infra, præterea a dextra ad sinistra, sicut ab iis rursus ad illa: similiter ab iis, quæ intus habentur, ad ea, quæ foris sunt, contraque ab his ad illa. Itaque si resolutus adhuc æger non sit, vena (*vt diximus*) in eo loco secanda erit, qui profusione sanguinis directæ respondet (*vt in libro, cui apud Mosan ex casu in capite arteria sanguinem profundebat, fecimus, in quo sanguis, vt alius diximus, restrictus fuit ab his topicis remediis: sed non concensio effluat, at per internalia, aliqui & in hoc sistente opus fuisse*) & vulneratæ parti coniuncta est, siue deriuare, siue reuellere fluueris. Vbi autem paululum detaxeris, mox vnâ horam intermittens, rursus nodicum quid detrahis, post iterum atque iterum, pro laborantibus viribus, vt *Galenus consiliis lib. 3. Therapeutica*. Sed de hac sanguinis in vulneribus distractione latius ab hisuperius diximus, & in rebus præcedentibus obsecrationibus id liquido constat. Causæ sanguinem insensantes,

Quæ sanguinem sensantes, non sensantes, non sensantes.

atque eius fluxum interceptis, quædam sunt incassantes, ac insipientes, vt *lenis, aræ, immatura, cito, camela*, & in vniuersum fructus omnes slyptici, hoc est, austeri, in hunc vfum offerri loht in omnibus sanguinis profusionibus. Aliæ vero sunt stup. facientes, veluti aqua frigida, tum epota, tum circa locum, ex quo profusum sanguis, prout sit, non autem supra vulnus ipsum: & ceteris eniur frigidum mordax. Item res omnes, quæ insungunt refrigerant, sicuti & lynceus, seu animi deliquium, in quo propter sanguinis ad interiora reuocationem, totus corporis habitus refrigerat, & sanguis fistitur, vt loco nuper citato G. I. nuamnotauit, ad hunc modum scribens:

Quæ suppriment sanguinem non sensantes.

Porro consilium prohibere sanguinem & propter animi deliquium, & cum ad contraria reuulsus, & cum ad vicina deriuatur, & per res refrigerationem, tum corporis intus, tum vtre præcipit ipsius partem assidue. Hoc enim ratione, etiam frigida pota, sape hæmorrhagiam supprimit, idem facit & frigida foris infusa. Sed & quinto sythoril. in frig. & vtriusque esse præcipit Hippocrates, unde sunt sanguis, aut fluxus non est, non ad ipsa (inquit), id est, ca ipsa unde sunt. Topicis auxiliis.

Secundum, per linamentum, quod: *nam Græce vocant, vel per penicillum siue turundam, quod a iunt: tertium emedum est totius vasæ sanguinum fundentis præcio: quartum diligenter & circumvinctum: quintum est aduulso per candidia sermentum, vel per castica medicamenta. Primum modus coercendi sanguinem, qui per suturam fit, his maxime vulneribus competit, in quibus nulla est substantia deperditio. Tunc autem cõmode fit futura, cum vulnus ipsum a sanguine concreto, qui *in omni* Græce dicitur, integre est repurgatum. Itaque hoc præcio ipsius vulneris labra in idem adducenda sunt, nostrarum manuum opera, vbi sic ad manum vulnus exhibet*

Quæ sanguinem sensantes, non sensantes, non sensantes.

Sutura sanguinem concretum coercens.

exhibet sese: postea conuantur, sutura quidem communi, vel ea, quam punctiones facere solent, praeferunt si magno impetu sanguis prorumpat. Dum autem ita sinitur vulnus, satis altacus in carnem demittenda est. Post haec *pulsu astrilium* superponendus erit. Deinde stupor cui candido liquore & pulvere illo adstringente, cuius in sequentibus fiet mentio, imbutus superimponendus erunt. Hisrite petactis, membrum affectum deligandum erit, & situ appposito collocandum. Appositus enim vulneratæ partis situs, inter hæmorrhagiæ remedia Galeno censetur.

Quod autem modus is supprimendi sanguinem, velis sit, ex eo manifestum euadit, quod labra vulneris prius hiantia & ad inuicem distantia in vnum adducentur, & inter se committuntur, locus affectus refrigeratur, & adstringitur. Quæ omnia in hoc affectu Galenus desiderat lib. 1. *sua method. medendi*. Sed & minoris adserit Auicenna in 4. necessarium esse, vt earius vulnera conuantur. In quo etiam Theodorici & Henrici consentiunt. Dicunt tamen plurimi, Galenum non præcipere venarum, arteriarum & intestinorum vulnera suta esse, quippe quod durat nimis & ex sanguia sint, atque ideo agglutinari & in pristinam unionem coire non possint. Verum pace illorum (*inquis Guido*) dixerim non inhibuit Galenus suta esse venarum & arteriarum vulnera: quod si id tacuit, certe adfirmasse videtur. Quin imo & litera ipsius Galeni, quod didimus, plane innuere videtur, quæ sic habet: *Næque enim suere fas est arteria venæve tu nunc vulnera dixeris, qui nullam a vulnerata partu substantiam, naturaque suam indicationem amittit*. Sed tum (subaudi) per regulam oppositorum, nos qui su-

364 mimus indicationem a substantia & natura partis vulneratæ suemus. Quod si non seorsum, ac separatim, cõiunctim saltem cum carne, ad modum peritonæi, id est, vt peritonæum confuere & soluimus. Atque ita si non iuxta primam intentionem coeant atque agglutinentur, saltem iuxta secundam (*vti superius in feruens cõmuni diximus*) coibunt. Secundus modus supprimendi sanguinem, qui fit per linamenta, & vulneribus, in quibus aliqua est substantia perdit, o potissimum accommodatur, ita perficitur. In primis vulnus ipsum pulvere aliquo, qui adstringendi facultatem habeat, respersito, deinde linamentis vel stuppi hiantem plagam oppleto: sicis quidem primum, deinde, si hæc parum proficiunt, aceto, velis medicamentis, quæ sanguinem supprimendi facultatem habent, ma & tactis, supraque spongiam & aqua frigida expressa impenito, ac manu superposita, eam compressito vel alligato: & post hoc membrum appolite (*vt superius a seculo est*) collo-

365 cato. Quilane modus sistendi sanguinem apprimere vultus est, vt loco paulo ante citato testatur Galenus, sic inquit: *Obstruere vasis (sanguinem fundentis) ostium, & sanguinem ipso conuerti, quæ tribusmodis Græci dicunt, & sic, quæ sunt illi imponuntur, cuiusmodi sunt linamenta quæ modo Græci vocant, & medicamenta, quæ videri quoniam*

lenta erant, & quæ substantia consistant, modum obstruunt, Græci emplastica vocant. Horum autem optima sunt eadem, quæ ex fixa resina, & sarinæ viticæ tenuissimo polline, & gypso aliisque id genus, sunt confecta, cui candido macerata, & cum leporinis pilis imposita. Tertius modus sistendi sanguinem, qui fit totum vas sanguinem fundens per transuersum præcidendo, competit maxime venis & arteriis quæ in profundo sitæ sunt, vt idem Galenus est auctor lib. 6. Therap. *Cogimur* (inquit) *non modo arterias, sed etiam inter dum venas totas præcidere, utique transuersas*. Incidit autem huius necessitas in iis, quæ ex profundo loco recte assurgunt, præsertimque per angustas vel principes particulas. Quippe ita retrahitur ex utraque parte, pars utraque, & celaturque ac integritur, superiacentibus corporibus vulnus. Post hæc pulsus aliquis sanguinem cohibet, super vulnus imponendus, & stuppi vel spongia medicamentis fuculatem supprimendi sanguinem habentibus, imbuta, superalliganda erit, & figura patellæ vulneratæ accommodata, adhibenda. Quartus mo-

du supprimendæ profusionis sanguinis, qui fit funiculo vasi sanguinem fundenti circumpositi, competit præsertim arteriis, quæ in penitioribus delitescunt. Itaque si alia auxilia profusio vincuntur, arteriæ nudandæ sunt, vt *Auicenna præcepit*, & hamo apprehensæ, mox vinculo aliquo gracili, vt filosferico, excipiendæ, ac fortiter stringendæ sunt. Post hæc medicamentum adglutinatæ sue incarnationium, vulncri apponendum erit, & membrum fasciis, vt oportet, deligandum, situque appposito collocandum. Porro vinculum ipsum radici vasis erit iniciendum, vt lib. 5. *method. Galen. nos admonuit*. Tutius autem & iuxta ciuilem Galeni sententiam, vtrumque facere, funem quidem radici vasis circumdare, & quoddamque habetur, id est, inde procedit, præcidere. & di-

366 cem vasis vocat hic Galenus, priore eius parte, quæ vel iocinori propior est, vel etiam cordis hæc (*inquis*) in eolio ab inferiori est parte, in brachii & cruris a superiore, in singulisque reliquarum partium, prout ex diffinitione intelligere licet. His sic peractis, implendum carne vulnus quamprimum est, priusquam funiculus a vase decidat. Nisi enim productæ caro prius locum, qui circa præcisam arteriam est, impleuerit, si locus aliquis vacuus supererit, vel quod Græci *anæuria* dicunt, sequitur. Quintus modus, & exertionis sanguinis sistendæ, qui per aduersionem fit, quæ erusta (*quam Græci *eschæia* am vocant*) inducitur, maxime competit venis, suæ unionis diuortii per-

367 pectis, Galeno ipso auctore, sic ad verbum inquit lib. 5. Therapeut. *Maximam autem necessitatem vel crustifici, id est, crustam induci esse in medicamentis, vel ignis feruoremque videri animamur, vbi ex erustione putrefactum in alium profusum sanguinem conuertitur erit*. Quæ quamquam ita se habent, fieri etiam solent in incisionibus, vt illis diebus labium carcinomate affectum a Cuiuslamo Galeno chiurugo eum abscederet, ex venis & arteriis sanguis pressus filis non potuit,

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

nisi ferramentis ignitis, ægro iam fere ad mortem (ut nos conficimus) deducto. Hic itaque modus sistendi sanguinem perficitur, tum candentibus ferramentis, tum medicaminibus crustam inducentibus, quibus cum calore adstringendi facultas sit coniuncta. Cuius generis sunt, *chalcantides*, id est, *astramentum iuxarum*, *myfi*, *chalcitis*, seu quod *vitriolum* vulgo appellatur, iisque tam visus quam non visus. Quæ autem ex calce viua, id est, non extincta conficiuntur, valentiora quidem his sunt: ceterum quia adstringendi vim non habent, crustæ, quæ ab ipsis sunt, citius exsiccant: hærent autem diutius, quæ ab adstringentibus, quod vitæ longe est vilius. Quippe ita prius in basi, seu in imo earum caro superflua est, efficiturque vasis præfuentibus veluti opereculum, donec venæ agglutinatione facta sit. Unde nec nosmet (inquit Galenus) præcipites efficit, veluti non nulli sunt, ad crustas quoque, ut hædas oportet, ubi hæmorrhagiæ periculum imminet. Si enim properes illas tollere, ac delicere, tantum inde accidit interdum sanguinis profusum, ut vix cohiberi possit. Quocirca præcipit Auenicenna, ad usum ferendum esse, ferramentis valentius ignitis, & valentius in profundum adactis, quo crassius ac profundius eschara fiat, quæ non facile separatur, atque excidit. Hinc Theodorici crustificis seu causticis omnibus medicamentis præferebat arsenicum, quod vocant sublimatum: nec sine immerito. Nam & protinus omnis sanguinis profusionem sistit, & altam ac diutius hærentem crustam inducit. Horum autem medicamentorum crustam inducentium vide amplum campum lib. 4. apud Tagantium. Porro ipsa ferramenta igne flagrantia ex aceto aut vino (ut resse quidam consulant) restinguere oportet. Ceterum alius quidam abius modus est peculiaris reprimendi sanguinem, qui tamen nondum adhuc profusus, mox tamen fluxurus est: vum signata clumve aliquod corpori infixum extrahendum est. Itaque cum hæc occasio nobis occurrat, puluilli tres, aut quatuor apponendi sunt, rotundi quidem, & circa medium (ut sic dicatur) fenestrati perforatiue, medicamentum aliquo sanguinem correcente delibuti. His ergo rite sic appatis, ipsius teli infixi stipitem vum hastile, per foramen immittito, ipsosque puluillos circa hastil. stringendo mihi aliquid supra vulnus comprimatur. Medicus vero ipse vulnerarius sagittam, vel aliud quoduis telum infixum extrahat. Exento telo puluilli sunt adæquandi, ita vt nullum amplius foramen in illis pateat, & supra vulnus comprimendi, deinde alii non perituli supra illos sunt apponendi. Hi igitur sunt modi, quibus sanguis a venis & arteriis vulneratis profusus cohibetur, qui vt arte & ratione sunt, sequentia præcepta obseruanda sunt. Primum est Galeni lib. 3. method. qui in omni fluore sanguinis ex vulnere iubet vt is, qui vulnerato adfuerit, illico digitum super os vulneris vasis imponat, blande sanctum, ac sine dolore comprimat. Quæpi simul (inquit) cum sanguinem sistit, tum etiam concretum ex vulnere facit. Tunc en-

im, id est, sanguis concretus, ex sic dicitur, quæ hæmorrhagiam sistunt, sicuti & linamenta, quæ porci Græci appellant, & medicamenta ea, quæ iisdem emplastris dicuntur. Ideo autem thrombus sanguinem supprimit, quia vas sanguinem fundens oculum obstruit, vt paulo ante diximus. Secundum documentum est, quod in omni sanguinis ex vulnere profusione, post admotam pulueris adstringentis, res aut plures, vt videtur panis linteus, aut ex stipitis puluilli, ex res autem primum madefacti, & postea expressi medicamentis sanguinem supprimentibus imbuti: tur, videri adglutinatæ, & supra ipsum adglutinatæ. Tertium canon est eiusdem Galeni, qui per deligatur docet supprimit sanguinem, sic inquit: Augendum autem est forassecum fascia, ex tenui linete, cuius fascia primo quatuor quinquere amplexus ipsi præueni vasi inueniatur. Ab hunc vasi radicem vt sit ducitur, in quibus videlicet partibus radicem vt sit ducitur. Læcet autem fore in omnibus, præterquam cerebri membranis. Hac quidem deligatura (vt inquit Auenicenna) quod confluit reprimatur, & vena sanguinem fundens constringitur. Quartus canon in supprimento sanguine obseruandus est, vt membrum, a quo sanguis profusus, sit appositus collocetur. Vnde Galenus lib. 3. method. ad hunc modum ait: Præter omnia sanctorum, inter hæmorrhagias, id est, profusiones sanguinis remedia certior est appositum vulnerata partium. Porro appositus fuerit eidem Galeno vinctura particulæ sitis, si ad geminum hunc finem sit directus: nempe vt & dolore pars careat, & sursum effluat: custodiendum in hac figura modo, ne dolor incidat. Si vero vel prona spectet, vel doleat, non solum profusum non sistetur, sed etiam si non sit, prouocabitur, & inflammatio augebitur, præsertim si pars dolore infestetur eum nihil quidem æque sanguinis profusum excutit, inflammationeque augeat, ac dolor. Quantum documentum ab eodem Galeno præscriptum est, quo cauetur, ne ante diem tertium deligatura soluetur: ubi autem illam tertio soluetur, & si tunc adhuc medicamentum emplasticum & sistens sanguinem vici ad hæreat, aliud vultus si per ipsum accommodabis, ac veluti linamentum id, quod ex palis est. Etum in hac sit, madefactis, deligabis ita, vt initio deligasti. Sin prius sua sponte reigerit linamentum, radicem vasu digito blande comprimens, ne videlicet quippiam corruat, hoc quidem suspensa manu, ac leuiter adimes: atque alterum impones. Quod etiam eodem, quo & primum (si necesse sit) exorat) imbus medicamento: vel oui cauo de liquore, cum rosaceo subactio, vel vino crassiore & styptico. Ad hunc modum, quoad carne obducatur ac munietur vas, curare debebis: vitæque a principio ad finem vsque (vt supra dictum est) particulam supinam seruare. Sextum præceptum in larga sanguinis profusione obseruandum est, vt laborant oculis clausis continent, aut loco obstruere reponatur: ne vel proprium sanguinem, vel videri quidpiam videre possit. Atque illi assuetudine assuetur, quod sanguinis profusum,

166

Galenus.

Arsenicum
sublimatum
optimum ad
hæmorrhagias
superfluum.Medus alius
supprimendi
sanguinem,
qui statim
fluxurus est.Præcepta
quædam de
supprimendo
sanguine ob
seruanda.Digitum com
primens.

Deligatura

Appositum
vulnerata
partium.Deligatura
ante diem
tertium non
soluenda.

168

Laborant
oculis clau
dit, aut loco
obstruere
reponatur.

ura

um conficit: & si adhuc sanguis fluat, magno ipsius commodo id fieri: atque ita contraria imaginatione, virtus naturalis ipsius roboratur. Hinc dicebat Auicenna, *quod grauiſſimum accidentium animalium, mouentium imaginationem, eſt motus ſanguinis, & conſequens eius, qui paratus eſt ad eum, cum multum intentus fuerit homo ad conſiderandum verumlibet.* Ceterum tempeſtiuum eſt, vt ſubiiciamus medicamenta, quæ ſiſtendi ſanguinem vim habent: ſtatutum enim erat nobis poſtremo de iis dicere. Itaque primam atque omnium optimam eſt, quod a Galeno deſcribitur lib. 5. *methodi*: quo etiam ad cerebrum membranarum hæmorrhagias vti ſecuriſſimum eſt: item ad colli vulnera, ipſumque venarum iugularium, quas ſphagitis vocant: etenim & hæc ſanguinem citra vinculum prohibet. Verba autem Galeni hæc ſunt. *Theoria pars vna, aloes media pars miſcetur. Aloex cum vitendi tempore inſtat, tantum huius pulueris cum oui candido ſubigitur, quantum mellis rutilat croſſitudinem. Hoc deſinat leporis molliſſimo pelo excipitur. deinde tunc vlceri totis liber alter imponitur.* Alligandum autem id ſorioſecus ſupra, ex tenui linito, modo quo in tertio canone ſupra dictum eſt. Hoc autem medicamento (inquit paulo poſt Galenus) multifariam vtor, alias (vt dictum eſt) duplum thuris aloæ admiſcens, alias pari modo ambo-

*Galeni medici
cauſam
ſanguinem
ſupprimere.*

*Auicenna
paulo.*

*169
Bruni medici
narratum.*

*Curatio vul
neris in vena
& arteria.*

bus vten, alias paulo ſuperante aloen thure aut etiam pluſculo, ſed nondum duplo: etiam mannam pro thure aliquando iniicimus. Porro coſtat io duris corporibus, plus aloes eſt immiſcendum, in mollioribus plus thuris. Secundum medicamentum ſumitur ex dictis Auicennæ, quod & ab omnibus chirurgis approbatur: habet autem ad hunc modum: *ſc. boli arm. ſangu. drac. thuris aloes ſuccotrina paræ portiones, terantur in puluerem, qui apponatur vt dictum eſt.* Tertium medicamenti genus eſt Bruni, qui iſtum deſumpſit ex libro Diuiſionum Rhazæ, & ex Albucaſi. Recipit autem calcem vineæ quæ ſola, (vt ſupra diximus) ſanguinem cohibet & ſiſtit, ſangu. drac. ꝑꝑꝑi, aloes, ſibz u, vitrioli ſingulorum æquæ portiones: rediguntur io puluerem & cum oui candido liquore & tela aſanecorum miſcetur, donec in corpus vnum coeant, & ſuperponuntur. Eſt qui pluſimum commendat gallem combuſtam, maceratam in vino & aceto, tritamque & ſuper arteriam aut venam admotam. Alii in huiusmodi pulueribus ſymphitæ addunt, quod poſteriores conſolida vocant. His adiciet ea, quæ in obſervatione præcedenti diximus. Ceterum ſuppreſſo ſanguine, qui ex vulnere profluſcat, ad propriam iſpius vulneris curationem mox accedendum eſt. vt ſuperius eſt annuntiatum. Porro tamen ſi (vt Galenus ait lib. 5. *methodi*) ſanatu diſſicilior ſit arteria quam vena, non tamen eſt medicamentorum admodum diuerſus in vtraque vſus: imo ſpecie placiſſimam, maioris minorque ratione curari. Quippe tanto ſiccioribus medicamētis eget arteria, quam vena, quanto ipſa eſt ſuapte natura ſiccior: tempera-

menti quam vena. Ergo quod venæ inſedit vulnus, vbi ad manum eſt, & citra ſubſtantiæ deperditionem, eandem deſiderat curationem iſi, quæ in carne accidunt. Nam ſiue ex recenti iſtu factum eſt, id agendum eſt, vt medicamentis iſi, quæ *euchyma* vocant, coeat, ſiue ex eroſione, quæcunque dicta de rebellium vlcærum curatione ſunt, ea prius ratione diſcernenda, mox vt opere perſiciantur, tentanda. Quæ etiam vbi vinculo vas ſiſ complexus, aut medicamentis ſanguinem ſupprimentibus, aut ſerramentis ignitis vſus, ita, vt facta fuerit ſubſtantiæ deperditio illudque tibi curationis propoſitum reſſet, vt quæ circa vulneris, vlcærisve labra ſunt, carne impleat: iſdem omnino medicamētis vtendum erit, quæ in methodo ſinuoſorum ac cauorum vlcærum ſunt deſcripta. Ceterum Galenus lib. 5. *methodi*, cap. 7. reſert de chirurgo, qui arteriam pro vena vulnerauerat, & arterias poſſe conſolidari. *ſic. ſe conſolidari.* (inquit) *in mulieribus & pueris tunc conglutinatæ arteriæ, tunc carne vndeque circumdantur, idque in fronte, maxilla & articulo brachij, ac ſumma manu modo.* Simile quiddam & agreſſi contigit iuueni, dum ſanguinem ſibi mittendum veris tempore curaret, (quod oſtratiſſimis maxime eſt in vſu.) Cum enim medicus, qui venam inciſurus erat, brachium hominis diſſiſſet, contigit attolli velut in gibbum arteriam: hanc pro vena medicus diuiſit, exigua ſine inciſio erat: ſanguis autem ſtaus & tenuis & ſeruidus ſtaim ciaculabatur, idque cum quodam veluti ſaltu. Ac medicus quidem, vt erat admodum inuſitatus, & operum artis parum peritus, venam ſe inciſiſſe putabat. Ego vero cum quodam alio ex iſi qui aderant medicis, vtique ſeniore, vbi quod acciderat duerti, præparato ex emplaftrorum genere quod ſanguinem ſupprimi medicamentorum uſionem curiole coniunxit, tum medicamen-lico impoſui, ac ſpongiam molliffimam extrinſecus ſuper hoc deligui. Mirante vero qui arteriam inciſerat, in ſolitam noſtram in hoc caſu prouidentiam, indicauimus homini rem ſactam: ſed poſteaquam hominis meſis diuerſum exiſſimus, iſiſſimus ne vel ſolueret nobis abſentibus, vel ante quartum diem id aggrederetur, ſed ita vt erat deligatam, linquere. Spongiam duotaxat diſuper madeficimus. Poſtea quoque in quarto ſoluentes, plane conglutinatam inciſuram inuenimus, rursus idem medicamen imponere uſiſſimus, tum ſimili modo deligare, uec multis poſtea diebus ſolueret. Atque ita percurata eſt huius hominis arteria, ſola omnium quas in cubito inciſis vidi. Nam reliquis omnibus aneurifma, aliis magis, aliis minus, ſuperuenit. Hæc de venarum, arteriarumque vulneribus dicta ſufficiant. Nunc ad vulnera neruorum, tendonum & ſyndefmorum, id eſt, ligamentorum, accedamus.

OBSERVATIO XXXVII.

De vulnere in manu per tranſverſum ſalutem, tendonibus ac neruis tranſſeſſis.

NICOLAUS IOHANNIS, qui ad templum Diui Geor-

*Ciceroſi vul
neris venarum.*

*Arteria poſt
vulnera
ſe conſolidari.*

*170
Hyllariæ Gadi
leu de chir
urgis arte
riam pro ve
na inciſit.*

*Arteria eſt.
Poſtea ſoluitur
Galenum.*

saum cicatrixisum tum desiccans apposuit: & ita in parte conuexa procedebat, donec curatum fuit vulnus. At in parte concaua manus, seu in
 171. vola ipsius adhuc processit eum digestiuo & mundificatio, & oleo hypericonis infuso, desuper ponendo emplastrum incarnatiuum. Decimo nono Maii ad maiorem exsiccationem tendonum & nervorum, & consolidationem, vulnere in parte concaua manus puluerem aristolochie chirurgus (*quod et melius vultu videbatur*) insperfit, & reliqua more solito applicabat. Vigesimo Maii in vola manus, quia caro iterum in vulnere plus iusto excrecebat & attollebatur, demum pul. aluminis vsti ad tres dies insperfus est, reliqua deinde admodum. Vigesimo primo Maii pars conuexa erat inflata, vique ad carpum ipsius manus: sed hoc contigit quod coita visus esset, vt ipsemet fatebatur, & motu corporeo, & videbatur inflatio cedematosa. Postea igitur iungi mandauimus oleo chamomillino partem conuexam. At chirurgus me nesciente inunxit oleo chamomillino, coëctio ex floribus chamomille Romanæ: quod cum paulo calidius sit altero, caliditas sentiebatur, ita vt inflammationem manus metueremus, quare iterum inunximus oleo rosato. At in vola manus, quo ad vuln' ipsum, vt prius procedebat chirurgus. Die 25. Maii cum inflatio illa cedematosa incresceret in parte conuexa, & digitus similiter occuparet, tum carpum ipsum, panno lineo intincto in decoct. ros. bellidi, muscivana, rorismarini, agrimonie, centaurij, in vino Picetianensi scilicet, & expresso fouere mandauimus, ad discutiedam inflammationem cedematosam, tū ad membrum exsiccandum & roborandum, vt eo minus humores ad membrum vulneratum & debile confluere. Postea cum vulnus in vola manus intus fordidum esset, ac cuniculatum, ita vt tendo putrefactus tandem exiret, digestiuum & mundificatiuum, quo adhuc utebatur
 175. chirurgus, visum fuit relinquere, & vt prius abluto vulnere cum decocto fomenti suprascripti supradicta linamenta seu tentz vnguento apostolorum oblinere, & in oleo hypericonis immisce imponerentur, ne ex tendonibus putrefactis fieret vlcus malignum vel fistula: digit enim erant maxime inflati, & circa vulnus in parte concaua manus inflatio quoque spectabatur, & aderat dolor, & ita eiusmodi tentz vnguento apostolorum oblinere putridos tendones iam consumptos tandem extraherent, natura etiam adiuuante. Vnguentum enim apostolorum dictum ad vulnera & vlcera difficilia & fistulas efficax est: consumit enim carnem mortuam, & cōsumam reffatur duram mollit, plagiisque sanat. Et sic processit chirurgus, donec vulnus optime a forditiis intus latente repurgatum esset, ac turunda illz vng. apostolorum linata, & oleo hypericonis immerse tunc diu imponebantur, donec loca excauata & cuniculata mundificata erant, & carne impleta. Postea filamenta seu ligamenta tantum vnguento linata, & oleo hypericonis immixta apponabantur: ac demum vnguentum

incarnatiuum suprascriptum. Vigesimo septimo Maii, quia tendo digiti secundi multum eminebat, nudatus a carne & putrefactus, prius loto vulnere, penna excauata puluere centaurii minoris repleta, ipsum puluerem supram tendonem & neruum inspergi iussimus: hoc enim medicamentum valde exsiccatorium est, & mordacitatis expert: quodque, si glutinosius & desiccatorius miscetur, vulnere tum vlcera maligna sanat: de cuius stirpis facultatibus plura vide apud Galenum 7. simpl. medic. & libellum Galeni ad Papiam scriptum de viribus centaurii, & lib. 3. hystoriarum Campegi illustrata 12. Pulvere itaque centaurii inspergo, deinde inditis linamentis cum vnguento apostolorum, & apposto emplastro, ita ad tres dies procedebamus. Sed tunc putrefactio tendone per se exeunte, puluerem prædictum reliquimus, & in locum vacuum tendonis iam ablati tentas vng. hyssiconis oblinitis imposuimus, superimponendo emplastrum incarnatiuum, additis puluillis in cauitate manus, & adhibita decenti semper ligatura. Interim semper loca circumstantia oleo hypericonis inunximus. Postea omnis puluillis, cum linamentis vnguento apostolorum oblinitis, & in oleo hypericonis immerfis vulneris cauitati impositis, super iniecto semper emplastro superius dicto vsque ad septimum diem lunii chirurgus progressus est: donec vulnere iam carne impleto prius satis detereso, linamentis deinde relictis sola vulneris ora parum hiantia inungens vnguento apostolico, postremo pro cicatrice inducenda apponens emplastrum griseum cum pecia, tandem perfecte sanatus est.

176

S C H O L I A.

DE vulneribus nervorum, tendonum & syn-
 desmorum, id est, ligamentorum dictum iam
 sumus. Sciendum autem quod vulnera nervo-
 rum partium Auzennæ lib. 4. sua medicina, &
 Galeni lib. 6. merbui morandi, quandoque pun-
 ctim, quandoque cæsum fiant. Etandum interdu
 sine contusione, interdum vero cum contusione
 accepta sunt. Ex puncturis autem, quædam hian-
 ant, atque apertæ sunt, quædam cæcæ atque oc-
 clusæ manent, adeo vt rarum ora sic conueniant,
 ac inter se coeant, vt conspectum effugiant. Por-
 ro ex dissectionibus, hæc est, si quis in nervosis
 partibus cæsum fuerit vulnerebus, alix per trans-
 uersum, alix per longitudinem inflatæ sunt. At-
 que ex harum vtriusque, quædam sunt sine amissi-
 one substantiæ carnosæ, quædam vero cum de-
 perditione ipsius substantiæ carnes, cute etiam
 quæ interueniebat, diuisæ, adeo vt neruus nudus
 appareat. At hæc nerui transuersim vulnerati,
 quandoque non ex toto, sed duntaxat ex parte
 dissoluti, quandoque vero toti præcisi sunt (*vt
 hic erant.*) Atque in omnibus his vulnera-
 tionibus, quandoque dolor ingens & inflama-
 tio & conuulsio accidit, quandoque vero non.
 Itaq; ab his nuper commemoratis vulnerebus differe-
 rentia,

partium ner-
uorum

177 rentis, curationis indicationes sumuntur. Omnia enim eiusmodi vulnerationum causae sunt ea quae accidunt, pungunt ac penetrant, & contundunt ut in superioribus (*ubi scilicet de causis vulnerum in easdem differemus*) ostensum est. Ceterum ex praecedentibus conspicuè euadit, quod neruus vulnerari non potest, quin cutis & caro solutionem cōtinui, & vulnerationem etiam patiantur. Neruum conuulsum esse testatur, dolor ingens, laesio sensus & motus, & si in loco nervoso vulnus acceptū est. Sed ab hoc postremo, coniecturalis solum nota desumitur. Neruis vulneratis, aut punctis, ex sentiendi, quod obtinent, aequum, inflammatio & dolor immodicus accidit. Quare & febres & conuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium, ob nervorum cum cerebrō cōmercio. Interim vero in aliis quocumque particulae aff. ctis locis, inflammationes, & abscessus super ipsum neruum conuulsum, quod cohaerent, solent accidere. Ita quidem indicatur Galeno lib. 3. art. parua, ut in superioribus annotamus: Si in vulneribus neruorum tumor apparuerit, & postea disparuerit, conuulsiones ac delirium periculum imminet. Hinc de tumoribus, qui vulneribus superueniunt, loquens Hippocrates lib. 3. aphor. in vniuersum omnes illos tumores effluat, qui de repente detumescunt. Sed & ingens malum portendi ibidem asserit, cum vulneribus prauis (*qualia sunt quae in capitebus aut finibus musculorum & in maxime neruorum fuerint*) tumoris omnino non adueniunt. Si in vulneribus (*inquit*) foribus, & prauis tumor non appareat, & peris mali. Sequenti quoque aphorismo, qui pars est antecedentis docet Hippocrates, tumores omnes, prauis maxime vulneribus, cuiusmodi sunt ea, quae nervosis partibus illata sunt, superuenientes, quicunque molles sunt, optimos esse, contrarios vero prauos. *Asides* (*inquit*) *boni, crudi vero mali*. Vbi crudum tumorem vocat durum atque renitentem, qui opponitur molli. Ad haec, nemo per trāsuersum vulnerato, sed non omnino diss. cto, minor conuulsione metus impendit, quam si totius praecilius est: phlegmone scilicet a d. f. Cui fibris, ad uon f. scas, communicata, ceterum conuulsione ab ijs non f. & excitata. At li totus quidam uerius praecilius sit, metus praeterea nullus inflat, nec periculum vllum inde f. cetur: d. bilistonen particula manebit, ut prius illud est, cum de spina ageremus. Meminisse praeterea oportet, quod frigidum partium neruularum vulneribus magis est inordinax, quam ijs quae carnes occupant. *Nerua ligamenta*, siue copulae, quos *syndesmoi* vocant, cum similitudinem habeant tendonibus speciem, valentissimum remedium. Galeno d. Therap. vii. tol. 12, quippe quod nec ad cerebrum pertingant, & sensu careant. Nam nerui omnes alii quidem ex ipso plane cerebro ortum habent, alii spina interueniente medulla. Tendones quoque quoniam compositi ex neruo ligamentisq; substantiam habent, quatenus neruis participes sunt, ceteris ex cerebro oriuntur: ceteri minus saltem, quam ipsi

nerui, conuulsionem accerunt. *Syndesmoi* vero vulnerati, si est, qui ab off. ad os permittit, ac duorum ossium coniunctio est, & maxime sine periculo est, & ipsum quibuslibet siccatibus medicamentis curatur, nihil hominem off. d. ens. Sin is fuerit, qui in musculum se inserit, quanto est neruo & tendone minus periculo oportunus, tanto vique, nisi rite, hoc est, caute & diligenter curetur, reliquis syndesmis magis terere debet. Curationi vulnerum cuiusmodi partium nervosarum cōmunis est cum ea, quae & vulneribus partium carnosarum accommodatur, hoc vno tamen excepto, quod symptoma illis superuenit, nempe dolor, primo medici sollicitudine (*cum enim contrahat*) ad se conuertit: ita tamen, vt vniuersales ac communes illae intentiones supra memoratas, haud prolixius interim negligantur. Hae autem numero erant quatuor. *Prima* quidem, extranea, quae vulneris labris inrecedunt, reuocare. *Secunda*, vulneris labra dissidentia cōmittere. *Tertia*, commissurae atque in vnum coniunctura, seruare. *Quarta*, particulae laesae substantiam conseruare. Ceterum quomodo has intentiones assequamur, ex differentiis iam supra enumeratis plane cognoscemus. Ergo a perniciosis exordium fumentes, de nerui punctura primum dicemus. In nerui puncti curatione, neque vnitio nem moliri statim oportet, neque coacti, seu in vnum coniuncta conseruare: quia potius cuius quidem vulnus apertum, inglutinatur q; custodire. Itaque infixa duntaxat (*signa nerui in haec sunt*) extrahenda, & particulae oblique substantia seruanda. Porro qua ratione de fixa custodienda sint, abunde in praecedentibus ostendimus. Reliquum est igitur, vt quomodo laesae particulae substantia seruanda sit, & ab ingruentibus iniuriis vindicanda, aperiamus. Ceterum partis ipsius laborantes, hoc est, puncti nerui substantiam optime seruabitis, si & dolori (*qui ob exaltum aique exaltationem partis off. laesum vehementissimum excitari solet*) sedulo ac mature occurreris. phlegmone in fieri prohibueris. Quod duo ex necessitate (*nisi substantia*) nerui puncturam consequuntur, & conuulsionem subinde accerunt, vt in praecedentibus iam annotauimus. Vt autem geramus hunc scopum assequaris, hoc est, dolorem, ac inflammationem prohibere possis, quatuor intentiones rursus tibi erunt diligenter obseruanda. *Prima* Quatuor in intentionibus in curanda neruorum punctura, obseruanda. *Prima* recta vitae institutio. *Secunda*, mater ante cedentis subtractio, ne scilicet ratione doloris consentit ad locum afflictiū confluat. *Tertia*, libera obstruenda. *Quarta* dolor sedare, & xeruginolam sanie m. educere. Et haec quidem puncturae nerui propria est & maxime peculiaris. Aliae vero tres, omnibus neruorum vulneribus sunt cōmunes. Quae d. primae intentionis attinet, praecipit Auicenna vt cui nerui punctus est, victus in extremo tenuissimū seruet, iuxta eam formā, quam superius expressimus, dum vniuersū de vulnerib' tractarem. Locutus in quo vocabat *xeruginolam*, scilicet de bit. & si nas. m. m. n. L. c. l. u. l. u. v. o. n. o. l. l. i. s. v. t. q. u. i. d. a. m. p. l. e. n. t. i. s. s. e. debet

Ca. ff.

S. e. n. d. i. c. i. o.

De sym. ptomata quae aff. ctum ex neruorum vulnerib' oboriuntur.

Tumor in vulneribus neruorum.

Crudus tumor qui dicitur bilistonen.

Ligamenta vulnerata & dissoluta & ligamenta & ligamenta & ligamenta.

debet. Sed & collocari quoque membrum. quod i-
cū est, ratione certa debet. Optimum etiā medica-
mentū laboranti quies est: moveri enim & ambu-
lare, nisi sanis alienū est. In quiete igitur ac lectu-
lo molli hominē continere oportet. Vt autem se-
cundum intentionem affligi possis, sequendum
omnino est tibi Galeni consilium, qui lib. 6. meth.
medendi iubet in nervi punctura corpus totū san-
guinis missione innuendum esse, utque si virtus
robusta fuerit, & nihil aliud obstitit: & quamvis
etiam nulla addit in corpore laborante sanguinis
redundantia, corpore etiam plethorico non exsi-
stente, hoc genus auxilii (ut ante diximus) ple-
rumque desiderat. Ceterum in hac per sanguinis
missionem vacuatione, servanda semper erit lo-
corum affinitas, ut frequenter admonuimus. Si
vero vitiosis succis repletum corpus sit, protinus
congruo medicamēto illud purgabis. Lenis quo-
que frictio recte adhibetur, sed has partibus, quæ
longius absunt a vulnere. De tertia indicatione
abunde satis dictum est in precedētibus, vbi de
convulsione vulneribus superveniente tractavi-
mus. Itaque si puncto nervo, vel quovis modo
vulneretur, aut etiam confuso spasmus ac ciderit,
aut eius membra ingruat, protinus caput, collum
atque vniuersam dorſi spinam oleo liliorum vel
cōmuni calente fouebis. Porro si in partibus su-
perioribus, vi manu vel brachio, id genus vulne-
ris nervus acceperit, præter iam commemoratas
partes axillas quoque: vberim olei calenti delinies.
Si vero plectus aut quovis modo vulneratus ner-
vus ex his sit, qui in crure habentur, bubones, si-
ue inguina, pubes & loca vicina, largo oleo statim
erunt imbueda. Tum per totam spinam ad col-
lum & caput vsque ascendendum. Sed & tendo-
nes & ligamenta ac loca ipsa vulneri vbiuis illato
propriaque eodem modo fouenda sunt, ut sexto
lib. method. med. Galenus facere nos docuit. Cete-
rum nervorum vulneribus, sed maxime punctum,
infectis, perperam a principio curatis, maxima om-
nino inflammatio & putredo superuenit. Ergo
cum nervi vulnerati sic iam inflammatione ten-
tatur, & putrefiunt, farinam hordeaceam aut fa-
baceam, aut potius ruina in aqua lixivia aut o-
xymelite vel syrupo acetoso decoctā, loco phleg-
mone occupato, & putrescenti statim illinire o-
portet: non autem triticæam farinā. aut eius ge-
neris cataplasmata, quæ particulam putrem effici-
unt: imo vero neque, aquam eadem adhibebis.
Hæc enim tamen reliquis inflammationibus,
quas phlegmonas appellamus, sit accommodatissima
(ut quæ eas valde mitiget) vulneratis tamen nervis
est inefficacissima. Ab humectantibus namque & a
calescentibus medicinis putredo huiusmodi af-
fectibus comparatur. Quod si vehementem inflam-
mationem cum maximo dolore infusaueris, eruntque
farinam aut fabaceam cum optima sapia, addito pau-
cissimo aceto, decoctam illinito, prius tam & par-
te affecta, oleo calido affatim perfusa. Tanta inter-
dum ex eiusmodi puncturis & nervorum vulne-
ribus oboritur putrefactio, ut ferro candenti, vel
causlico aliquo medicamento (cuiusmodi est a-

gyptiacum) eam adurere cogamur. Halyabbas & ^{metastich}
Auiçena ad eiusmodi phlegmonas & gangrænas <sup>et gangre-
nas & pu-
treddines</sup>
seu putredines emplastro ex metallicis, & aceto
preparato utebantur, cuius composito lib. 3. de
compof. medic. vbi dicitur, a Galeno sub hac verbosū
serie descripta est: Cera pondo vncia sex, elai 3. i x.
myr 3. vi. chalcitidis denarij pondo vnius, squama æ-
riæ 1. j. b. thuris 3. j. g. galbani 3. j. quæ liquari possunt,
hoc est, cera & galbanum, liquefacta, metallicis
in aceto acri prius accurate tritis, superfunditur.
At recentiores eo quod ex farina hordei, fabarū,
orobi in lixivia stillatio (ut primum diximus) con-
stat, utebatur. Auiçena addit mel & acetū. Quod
vero ad quartam intentionem consequendam
attinet, quæ nervorum quidem puncturæ magis
propria est, Galenus lib. 6. Methodo valde multa
pharmaca recenset ab ipso ex cogitata, & deorum
quadam providentia (ut abbi testatur) inuenta.
Quæ vulneri imposita ad utrumque mire sunt cō-
parata, tum ut dolorem mitigent, tum ut exitum
saniei patefaciant. Tutius vero fuerit in nervis a-
cu, aut paxillo, aut quopiam tali compūctis, præ-
sertim si in altum recessum vulnus, hoc est, pun-
ctura descenderit, & conspectum effugiat, eum
etiam in vulneris orificio aperire ac laius incide-
re, quo melius sanies effluat, & cōmodius ad pro-
funditatem loci, medicamentorum vires perue-
niant. Porro aliis cultro rasorio, aliis vero caute-
rio cutem ipsam aperiendam esse, magis placet.
Galenus in id genus puncturis orificium duobus
ia cutem sectionibus recte diuidere iubet lib. 3. de
compof. medic. secundum genera. Itaque nisi oræ an-
guistorum eiusmodi punctum aperiantur, convul-
sionis periculum magis imminet: quippe quod
obcecatō ita cutis vulnere nihil a profundo ex-
trorsum expiret. Facta autē cutis apertione, ex-
siccandum mox vulnus est, substantia aliqua ten-
nui, quæ vsq; ad ima nervi offensa possit penetra-
re, ut lib. artis medicinalis Galenus nos admonuit.
Cuius generis est oleum lablinū, præsertim vet-
tus, quod tanquam viliſſimum ad præsentem cura-
tionem, lib. 6. method. c. 3. de compof. medic. secū-
dum genera, idem author deligit. Vitandum autem
(consilio eiusdem, omnino est oleum crudum, <sup>Oleo adstri-
gentis vti
lauda.</sup>
quod ^{adstri-} <sup>gentis vti
lauda.</sup> vel insipidum duplici nomine Græce
dicitur, & quod denique vim habet adstringendi,
cuiusmodi est oleum myrsinum, tribus saltem pri-
mis diebus. Hoc enim perhabui non digerit, sed
obstruit, & perspiratum prohibet. Præstat igitur
nervos punctum ictos oleo tenui, adstrictione
profus carente, perfundere, quale dulcissimum
est, quod longe melius erit, si duo aut tres annos
traherit. Sed neque Salsum etiam ipsum
oleum, quamvis sit tenuissimum, aut aliud quod-
vis simile, ut est castaneum (quod vocant)
frigidum admodum est, sed calens: frigi-
dum namque præter quam quod nervus adur-
satur (ut quinto aphorismi m. ex proſit Expectorati) iur-
tenuis quod necius obstruit, & ipsos an-
guſtiores efficit: calidum vero digerit ac dilatat
doloreque magis demulcet. Si vehemens duo-
lor laborantem excruciat, oleum ex vitellis ouo-
rum

Materia ad
medicam
puncturam.

S. v. v. v. v.
p. v. v. v. v.

Purgatio
Tritia.

Convulsi-
onem præca-
uere.

180

Si nervi vul-
nerati phleg-
monas accu-
perant, aut
putrescunt.

Aqua calida
vulnerati
nervi infu-
ditur.

Empl. ex

181

Doleris fa-
datis. & fa-
nus adstri-
gentis.

Punctura
doleris fa-
datis.

Oleum Salsu-
m.

Oleo adstri-
gentis vti
lauda.

Frigidum
punctu ner-
vi adstru-
gitur.

Si dolo-
rem excru-
ciat, oleum
ex vitellis ouo-
rum

rum commodè administratur. Ad eandem quoque intentionem in nervis punctum vulneratis, Galenus sæpe usus est *terebinthina resina*, medicamento sane inprimis idoneo per se quidem pueris & mulieribus, & generaliter iis, qui molles sunt carne, cum euphorbio vero emollita, in duris corporibus. Non fecit autem & propoli, non per se modo, verum etiam cum euphorbio mollicius, usus est, & si non nunquam duriora contigerint, cum oleo quodam tenuiore. Quin (*subiungit*) & sapagno in duris corporibus sum usus, utique cum oleo & *terebinthina* id miscens. Sed & opopanax ad eundem modum, quo & sapagno. Mibi vero & *lachryma Tyrenica* non inutilis fore videtur, si quis emplastrum ex ea faciat: cuiusmodi est, quod nos ex euphorbio compoluimus.

Verum (inquit) *nonnullum id experimentum, quemadmodum reliqua omnia, comprobauimus.* Quippe præcedere oportet cā, quæ a vera methodo proficiscitur, remedium inuentionem, hinc vero experientiam ad certiorē etiam fidem subseribere. Si quidem ex tali methodo etiam sulphur, quod neque igitur expertum, neque lapidosum sit, sed omnino tenuium partium, ei, cui nervus vulnatus est, conductum sperauimus, tantum (*sulphuris inquam*) tenui oleo miscentes, dum quod ex utrisque mixtum erat, sordium haberet crassitudinem. In valentioribus vero durioribusque corporibus etiam, si ad molles crassitudinem redigis, sic quoque iuueris. Nam id quoque comprobatum experientia est. *Hæstius Galenus*. Cuius sententiam approbat *Auenzoar*, huiusque rei periculum se aliquando fecisse: testatur. Quæ autem delota calce subdit Galenus nervi denudati magis conuenire videntur. Quare in sequentia ex referuamus. Ceterum paucis quibusdam interiectis, refert Galenus se composuisse emplastrum ex *cera*, *resina terebinthina pice*, & *euphorbio*, ad hanc intentionem longe optimū, quo & plurimi sua ætate felici successu vterentur. Recipebat autem ex *cera piceque vnam*, ex *terebinthina & pice* utriusque partis vnius dimidium (sic ut quod ex utrisque constaretur, *cera par esset*) ex *euphorbio* vero, *cera partem duodecimam*, etiam plus aliquando, ubi scilicet valentius esse efficere in animo licet quoque interim & plus sit, quod ex *terebinthina & pice* confit, quam cetera. Licet rursus & alterum eorū tantum ceræ admiscere. Quin etiam in penuria terebinthinae resinæ (quæ vix apud nos reperitur) abietinam, Galenus etiam anilore, commodè admiscebis. Emplastro vero aliquo ex prius memoratis appposito, lanam mollem oleo calente madefactam supra decenter alligabis. Igitur ut summam atque vniuersim dicamus, quæ in puncti nervi curatione obseruanda sunt, Galenus ita s. lib. Therap. scribentem audiamus. *Vulnerati nervi curatio, medicamentum possint, quæ & repidum calorem excutiant, & valent (sive molles tamen) desecent: tum quo ex substantia sua natura & trahendo vim habent, & tenuium sunt partium. Et rursus istidem: si per maciem autem hoc omne cōsiliū dixerit, ut esset curam facilius tum tenuis, tum*

modice excofacient, & quæ admodum siccare circa dolorem possit: cum sola hac trahere ex profundo sanum, neque contraria, neque demersa particula possit. Porro cum permagna humanorum corporum (*ut alibi Galenus ait*) sit differentia, tum in temperamentis, tum ætate in mutationibus, insuper vitæ studis nulla ratione quodque medicamentum omnibus conuenire potest. Quamobrem dum in promptu habeto, alterum valentius, ex similibus genere coactum, alterū mitius, quæ inuicem mista, dum usus postulat, permulta inter hæc iuxta mixturæ quantitatem constitues. Vide reliqua apud Galenum. Nunc exemplum vnum atque alterū adscribam, ut elarior euadat curatio.

OBSERVATIO XXXVIII.

De nervi punctura.

PAPERCVLA quædam mulier cum acu digiti minimi pugnasset, in manu, forte ex nervi punctura, quarto die ingens superuenit tumor, adeo, ut tota manus phlegmone afficeretur (*ab intestum dolorem*) seu apostemate: fed non peruenit ad saniem, quia calor naturalis erat diminutus: & ideo manifesti inflammatio quædam cedematosa. Pueræ autem Laureus Brunick doctor chirurgæ, qui tunc accitus fuit, applicuit vng. de *euphorbio* ex descript. Guidonis, etiam digitos inungendo: & inflatōi apposuit vng. de *emertibus* factum, quibus cessauit fluxus humorum. Interim apposuit emplastrum ex resoluētibz & roborantibus. deinde vinum sypticum cum sale: & bene habuit: sed multo melius postea, cum in decoctione vini eoquerentur *abfinibz camomilla & sal*: ac sic tandem inflatio diminuta est: & tunc inunxit digitos cū vng. *diachylæ*, balneato manum cum iure intestino- rum, & eam ponēdo in bobas ut similibus animalibus recens madatis: & ita restituta fuit finitanti. Refert Amatus similem fere historiam *ant. iur. i. curat. 39. ut punctura acui in digito, sic feriebatur: Anselmus illis Comiti mater sexagenaria quous fuerit, pollicem acui prope unguentum pupugit, a punctura manum calidum febricitabat non quiescebat, adeo, ut per duodecim dies parum ventribz doleretur quæriti stna. Color in vultu hoc tempore continuo perduravit, ita ut vultu, ut parum abstergeret, quam ex eo moreretur: ad quam cum accessisset, penitus locum animi advertebat, inuenio in ipso pollice inter utraque articulum sanum genitum esse, quem quous inueni, alio in loco secari iussit, sanemque pro membrz quæritate fluere permisi. A felleione vero optima manu oleo rosaceo completo inuncta, in ipsoque vulnere immisso linamento alio ex albo & lacteo oī optime contriit, & splenis debite applicatis, inter duas horas a doloribus libera fuit: & postea intra paucos dies sanie tantè restituta.*

SCHOLIA.

PERICULOSÆ admodū sunt eiusmodi puncturæ, ut Scholii præcedentibus quoque diximus, ob quas multi aliquando digitū, aliquando manum, aliquando vero & ipsam vitam amiserunt. Vnde Galenus hæc sciens (*ut patet lib. Artu me-*

182
Medicamentum
quod Galenus
in manu
punctum vul-
nerati in lib.
6. meth.

Remedium
per methodum
autem
procedere de-
bet, deinde
hæc experien-
tia confir-
matur.

Auenzoar.

Emplastrum
Galeni.Cal. lib. 6.
meth.Lib. 3.
meth.

184

184

dicinalis cap. p. x.) docte admodum & prudenter ad apertionem confugit, ne spasmus obturato vulnere, dum nihil expirat, sublequatur. Quomodo autem punctura nervi curetur, iam longius ex Gal. lib. 6. declaratur & scholio precedentis prolequuti sumus. Nam inprimis necesse est extrahere illud, quod nervum læsit, siue id fuerit frustum acus, aculeus, vel spina, siue sagitta vel telum; deinde apponere linamentum inunctum cum vng. de euphorbio, cuius hæc est descriptio:

- 185 *Re. olei communis ad libitum, & impone lanam succi dam, & medicum salis communis, ita vt in lib. j. olei ponantur 3 j. salis, lumbri corum terri est. ad libitum, succi urticae 3 j. hæc omnia bulliant vsq; ad spissitudinem vel consumptionem succi, deinde cola, & vsui serua. Postea Re. olei prædicti 3 j. terebinth. lota picis nautalis, resina pini, cera nana ana 3 nj. oleum melle, & fiat vng. deinde deponeatur ab igne, & imponatur euphorbio puluerizati 3 j. Sulphuris puluerizati 3 v. fiat vng. semper miscendo, donec frigescat. Si autem meras sit spasmis, dissoluatur mollicum illius vnguenti in aqua calida, & adde exiguum olei sinapis. erit præstantissimum. hoc vnguento cum plagello vel linamento superposito immediate adhibeatur paruum ferrum, calidum mediocriter, vt virtus vnguenti penetret in profundum: ita vt vulneratus quæsi conqueratur de aliqua vitione, & hoc vnguento aperietur vulnus, & punctura, & per eod. quæsi humiditas æruginosâ poterit exire, & super illud linamentum vel plagellam (vt herbas vocant) aliud emplastrum paulo maius cum prædicto vng. applicetur, & locus circumferentialis inuagatur oleo rosaceo calido, aut oleo lumbri corum: & pars superior potest defendi aliquo defensiuo. Si autem post tertium vel quartum æger prius se habeat, malo tendente ad apostema, tunc vti possimus emplastro ex farina salsarum, cineribus cribratis, melle exigno, & aceto incorporatis, & calide super totum membrum applicito, prius tamen emplastro de Euphorbio adhibito, tunc vitionibus prius peractis. Aliud vng. de Euphorbio, quod a Gualdone ponitur. Re. cera, resina, picis ana quart. j. Euphorbii 3 j. terebinth. olei communis ana 3 lb. melle, & secundum artem fiat vnguentum.*

OBSERVATIO XXXIX.

De vulnere in iunctura & loco nervoso facto, phlegmone accedente, unde humidum quid exsillat.

VULNUS quod in iunctura erat perperam curatum ab imperito quodam tonfore potius quam chirurgo, humidum quid (quod Glarum vocant, & falso aquam iuncturarum, vt alibi diximus) exsillabat: quod cum curari non posset, tandem hoc vnguentum contulit: Re. terebinthina lota in aqua salina 3 lb. melle communis vel rosacei, v. libet, 3 nj. farina bordet 3 y. aloes Succotrina 3 nj. fiat vnguentum. Scd & M. Iohannes Candetus chirurgus hoc sequenti vtebatur vnguentum similibus accidentibus. Re. farina seminis lin-
186 ni, farina bordet, erodi ana p. x. oleum q. s. ad incorporandas prædictas farinas supra ignem ad spissitudinem pulvis: deinde cum frigidum cuale-

rit, adde pul. thuris, myrrha ana 3 lb. confice ad modum vnguenti.

S C H O L I A.

LIQVOREM hunc, quem alias *hæmorrhæ* appellauimus, a nostratibus chirurgis ineptissimo vocabulo *aquam articulorum* vocari, olim diximus lib. 4. obs. & curat. medic. nostrarum, obs. 4. in qua & tonforum nostrorum errorem offendimus. Sed is omisiss, nunc ad nervos vulneratos accedamus, qui cum punctum, ac casum, & deinde per transversum vulnerari possint, de punctura paulo ante tam nervus punctis diximus, quæ de nervis casum vulneratis agamus, deinde de is, qui per transversum casu sunt, cuius quoque exemplum superius posuimus. Si igitur nervus non punctum, sed plane casum vulneratus fuerit, diligenter considerandum est, quo pacto vulneratio facta sit: vtrum ne per transversum nervum, an secundum longitudinem eius: tum vero quantum interuenientis seu præsentis cutis diuisum sit. Ad hæc spectandum etiam est, num totus nervus diuisus sit, an non ex toto præcisus. Eiusmodi namque vulnere differentia, curandi rationem non parum euariant, vt ex sequentibus euadet manifestum. Itaque si cutis, quæ interueniebat scitio, non satis pateat, emphiori diuisione aperienda est, vt iam in precedentiibus animamini-
mus. Proponatur igitur primum satis esse cutis *Hypotheca*, apertum, non ita tamen hiare vulnus, vt aerius ipsi incisus sensui nudus adhuc appareat. Sane huiusmodi nervi scissura, siue per directum, siue per transversum facta diuisio sit, vitra communis tres iam dictas intentiones in punctura qua-
tuor intentiones pertinetur.

Prima est, vt in loco vulneris magis declui turunda aliqua mollis & lauis blande imponatur. Secunda, vt aliquod medicamentum anodynum seu mitigatorium, & (vt vocant) in carnationem nervi dicatum, vulneri superponatur. Tertia, vt lana mollis succida, vel oleo calente desoluta, desuper blande alligetur. Ergo non ita exacte vulneris ora cōmitendæ sunt, & gloriandæ, quin omisissarium aliquod relinquantur, quo collectæ sanies efflueret possit. Hæc enim si in profundo retineatur, non pus putrefactionem ac corruptionem inducet, atque ita etiam conuulsionem inuehet. Eam ob rem profuerit (primum saltem diebus) turunda aliquam mollem, digi stiuo ex terebinthina, oui luteo & croci momento illitam, loco vulneris (vnde illam est) decluiori mollior immittere, donec nullum amplius phlegmones aut conuulsionis periculum timeatur. Medicamentis autem his nervorum ac etiam tendinum, vulnibus, casum non punctum acceptis, expeditissimum apprimere idoneum esse credetur, quod vnguentum, ex verbis vulgo noncupatur. Recipit autem cinnam-
rea minoris, lingua casti, lanceolata (qua plantago est maior) puluisilla, confusa melleo & minoris ana m. j. verumini terrefrui (quos lumbrius appellamus) lib. lb. olei communis lib. j. vni lib. j. lb. subigantur simul, & ita septem diebus nutriantur, seu (vt lo-
quuntur)
G

Aliud vng. de Euphorbio, ex Gualdone.

187

Turunda

Vnguentum ex verbis.

quantur, fermententur. Deinde illis addantur seu
arictis a pelliculis emulsio lib. 1. *picea nigra, resina*
ana quart. 3. gummy ammoniaci, galbani, opopanaxi in
aceto dissolutum ana 3 v. simul omnia moderato
igne decoquantur vsque ad vini & aceti consump-
tionem, & coaleantur. Vbi vero hæc pene refri-
xerint, adde *terebinthi, quart. 3. storis, mastiche,*
sarcocollæ ana 3 vj. eroci 3 j. Ipulata agitentur in
mortario, & fiat vaguentum. Porro longe alia
multa medicamenta, parum etiam facilliora, hinc
nervorum diuisionibus valde accommodata, refe-
rantur a Galeno lib. 3. *de compos. medic. secundum*

Cataplasma

Pia liganda.

Oculum.

Propolis.

188

Qualia in
variosum
medicamen-
ta esse debe-
ant, nervo-
rum vulne-
ribus accom-
moda.

Lana mellis
succida.

De nervo
per transuer-
sum casu.

gutta, & 6 methodi medendi. Cuiusmodi est, quod
ex *oxytelæ & februm farina, vel erorum, vel li-*
lij, vel ciceris, vel lapinum amaror. vel bardanæ
farina cataplasma conficitur: item picea liganda. Fer-
mento temperata, atque vulnere imposita. Erro-
rum quoque aut alia ex prædictis *farina, fermento*
permixta. Imo & interim fermentum ipsum
solum. Quin etiam *oxaleon solum* quod caleat,
modo acetum abunde acre & vetustum sit. *Pro-*
polis quoque: recens liquida & pinguis vulnere im-
posita sæpe præsidio fuit, interim quidem per se,
interim fermento commixta. Huius itaque præsi-
dii ad nervorum vulnera, tam in agris quam in
vribus felici successu Galenus sæpe vsus est, non
solum in his, quos iam phlegmone prehenderat,
sed etiam, vt refert, proinus ab initio. In sum-
ma, oportet medicamenta omnia, quæ nervorum
vulneribus tam cæsum quam punctum infligitis, ex
vsu futura sunt, ea polleere facultate, quæ & mo-
dice calfacere, id est, tepidum calorem, & vcluti
ex solo suauem excitare, & valeret, citra dolorem
tamen, siccare possit: tum ex quoque, effice subtili-
tate natura, quæ ex alto saniem atque humores e-
ducere, ac digerere valeant. Atque ex iis minus
molesta esse consequerunt, quæ liquida sunt, vt
Galenus etiam annotauit lib. 3. *de compos. med. secundum*
genera. Super cuiusmodi vero medicamenta
lana mollis succida, vel oleo calente respersa, ap-
ponenda est, & leniter obstringenda. Ceterum
quouiam frigus tum omnibus, tum vero maxi-
me nervorum vulneribus infestissimum est, plu-
rimum confect, lanam ipsam superpositam per-
manere calidam, siue oleo tantum, siue oxaleo
quoque imbuta fuerit: fiet hoc, si alia lana sicca
vellera, aut panni calidi subinde mutati, extrinsecus
circumponantur, & ager intra tectis, si mo-
do hyems fuerit, ad quintum vsque vel septimum
morbi diem sese continet. Nam si eo vsque phleg-
mone non tentetur, vacetque prorsus dolore, &
nullam sentiat tensionem, in posterum inquit
Galenus lib. 3. *de compos. med. secundum genera* tute-
rit. Atque hæc de
nervo cæsum vulnerato in vniuersum ac genera-
liter dicta sunt, siue per transuersum, siue per di-
rectum vel per longitudinem nervus diuisus sit.
Quæ vero sequuntur, peculiariter de nervo per
transuersum vulnerato dicuntur. Si itaque nervus
per transuersum vulneratus sit, nõ tamen ex
toto præcisus, maior conuulsio nisi metus impen-
det, inflammatione scilicet (vt supra diximus) a
difficilius fibra integras, & non sectas succedet:
ceterum conuulsione ab ipsis non secus caci-

tata. Huic itaque memoratis prius auxiliis quam
citissime occurrendum est. Ergo in quiete omni-
no & strato mollissimo continendus ager est, plu-
rimoque oleo affatus, & affidue inquina, spina, a-
xilla, collum & caput perfundendum. Ceterum
in hoc vulnere largius sanguis mittendus est, &
victus tenuior adhibendus, quam in nervo per
directum incisio. Quod si conuulsio iam super-
uenerit, & nulla conuenientium medicamentorum
vi remittatur, re liquæ fibræ, quæ integræ ro-
manferant, præcidi debent. Si enim totus nervus
præcisus sit, nullum quidem præterea (vt Gal.
inquit 6. *Methodi*) conuulsiois periculum sequetur,
debilis tamen particula manebit. Verum læ-
sio, quam mors, potius optanda, vt idem inquit 12.
Therap. Hoc pacto quibuscumque in priore inferna-
que femoris parte per transuersum percussis, reliquum
tendonis amputauit Galenus (lib. 3. *de compos. med. secundum genera*) vt tuta illi esset curatio. Porro si trans-
uersa hæc diuisio, tam insigniter alta in musculo
facta sit, vt deligatura nihil prodesse possit, non
dubitabis musculi distantes inuicem partes (præ-
sertim si vulnus recens fuerit) futuris altioribus
contrahere: cura tamen semper adhibita, ne ab
acu nervus, vel tendo compungatur. Carnosa
namque ipsa musculorum pars, dum acu fuitur,
periculo vacat: nervi vero ut edines, non medi-
ocri periculo consueunt. Horum quidem omni-
um Galenus probis auctor fuit lib. 3. *de compos. med. secundum genera* ad hunc modum scribit:
Contemplatur (inquit) gladiatorem quemdam ex his
qui equites nominant, transversam diuisionem in
priore ac inferiore femoris parte habentem, eamque, si
tu aliam, tam vulnere labrum intus non, sed iuxta ali-
rum transversum, infra alterum quasi ad patellam desti-
num, non dubitans distantes inuicem musculorum
partes futuris contrahere, curatorem illi, quæ Græce a
latitudine ueniunt dicitur, neglecta. Itaque verum
tendens ipsi confuerit, demonstratum prius illi, sic al-
tiorebus futuris vsus sum, hanc uenarum carnosam ip-
sam musculi non partem periculo vacare, si tamen ve-
re non item, quemquam hoc nullum ex meis præce-
ptis facientem viderem. Has autem suturas in
cuiusmodi vulnere, ideo non superficietenus, sed
altius moliri cõuenit, ne quæ in imo sunt, incõ-
glutinata dehiscant. Reliquæ vero, quæ ad vul-
neris curationem attinēt, hic quoque sunt eadem,
etiam si totus nervus præcisus sit. In solo itaque
per transuersum accepto vulnere eodemque insig-
niter alto, cū deligatura nihil prodesse possit, ex
tota futura curatio absoluitur. Et enim in vulneri-
bus iuxta membri longitudinem factis, deligatura
vulnerati musculi partibus inuicem contra-
hendis sufficit Galeno. Ceterum sutura decen-
ter facta, consumum vulnus fouendum erit rosa-
ceo, in quo lumbri terrestris prius decocti fue-
rint: ac supra puluis aliquis, qui futuram continet,
aspergendus erit, cui parum ipsorum lum-
bricorum afflictorum & contritorum in portio-
nem, si lubet, adijcias. Quidam enim memorie
prodiderunt, cuiusmodi terræ intestina (seu lum-
bricæ) contra, nervisq; diuisis imposita, protius
nervum in modum prodesset: vt lib. de simplici
med.

Historia de
gladiatore
in femore
vulnerato.

Cura futura
alta esse de-
beant.

Lumbri in
refectis de
colla.

Centaurium. med. facult. 11. *Galenus* refert. Sunt qui & centaurium arefactum & contritum etiam inspergunt, 190 vt in *Nicolaus Ioanne vulnerato superius* nos fieri mandauimus. Medicamentum enim est admodum desiccatorum, mordacitatis expertis: & si glutinatorius & desiccatorius miscetur, vlcera maligna & cacoethe sanare creditur. Quin & ipsius herbe recentissimum magna vlcera glutinantur, vetusta quoque & quæ ad cicatricem ægre perducuntur, eodem modo cicatrice obducuntur, *Galenus lib. 7. de simplic. med. facultatibus*. Refert *Dioscorides*, & quodam in loco *Aulicennas*, quod carnes minutim incisæ coalescant, si cum cætarum maiori de-
Radix centaurii minoris.

Radix centaurii minoris. Eadem quoque: *centaurii minoris* radix recens, aut arida, ante madefacta, vulnera conglutinat & coniungit. Sed iam tempus est, ut de nudato nervo dicamus. Nudato nervo, omnis curationis consilium buc tibi dirigendum est: proinde si nervus non punctum, sed plane ex-
Nervus resus vulneratus nudatus curatur.

stis vulnerat^{us} fuerit, cute etiam quo interueniebat diuisa, adeo vt nudos appareat, nullum iam supra commemoratorum, quæ ex euphorbio, ac similiter acrisbus in plastris specie sunt, applicabis: nervus namque nudatus vehementem ipsorum vim ferre nequit, ita vt cū interpolata cutis erat, cum ferre poterat. Optime igitur eo casu feceris, si calcem & pompholygem ac metallica omnia, resinas quoque, olea, mel, & ceram, quæ eiusmodi medicamentis, nudato nervo, ac diuiso apprimere idoneis, miscenda sunt, clueris, quo scilicet citra rationem vllam sint siccatura. Quippe medicamentis omnibus (vt *Galenus* inquit) quæ lueris, acris, mordensque humor eluendo detrahatur. Tunc igitur præstantissimum erit, calcem æstatis tempore 10 diebus canicularibus sub sole, aqua salubri & dulcissima sæpius elotam, & exsiccata, plurimo optimoque rosaceo admixtam apponere. Congruit & hoc casu medicamentum quod ex pompholyge (vt dictum est) elota sit, largiore itidē, ac probatissimo rosaceo salis omnino experte, solum liquidumve. Salubre quoque, medicamentum est, & quod ex melle optimo sub emplastri specie componitur. Solui vero & id rosaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus sit optimum, tum salis omnino expertis, vt scilicet minima cum rosone siccet. Nihil enim acre (vt di-
Medicamentum ex pompholyge.

Emplastrum cum melle.

Nervus denudatus velut acris admo- uendum.

Nervus denudatus velut acris admo- uendum. nudato nervo (quæ pars est sapienter natu- ra sensu v: getissima) vnam admo- uendum. Si vero robustus sit, qui vulnus accepit, & cui corpus sit a superuacuis humoribus in modum, in hoc casu, etiam valentioribus remediis nonnullis vti, vt *pastillus seu trochiscus* a Polydo auctore nomi- natus, sapa calida solutus, & in linamentum illitus. Id autē vel primis (inquit *Galenus lib. 6. Metho-* 191 *thodis*) semper habendum curæ est, ne quid ex his, quæ vulnus cōtingent, frigidum sit: quandoquidam ipsa laboris particula & sensilis maxime est, & principum corporis partium primati (nempt cerebri) continua, & temperamento suo frigida. Quorum omnium occasione & ex facili frigido offenditur, & suam offensam cerebro impertit. Ad tum dicti vero pastilli usum prope etiam acce-

dit & vsus medicamenti illi^{us} quod *Αλεξαρην*, *Galenus* nominatur, vulgo autem *diapalma*. Hoc et-
Diapalma. gomedicamentum, si trochiscos Polydæ admanum non habemus, vt tuto poterimus. Polydæ autem s. lib. de compos. medice, miscella requitenda, cuius si copia non est, *Andræum* vel *Papauum* fumendus erit pastillus. C. iterum vuln^{us} eiusmodi oleo per-
Oleum nuda- data nervo & vulnera- to non esse ad mo- uendum. fundendum non illi, præsertim cum nunc memo- ratum pastillis curatio suscipitur. Nam oleum illo- rum viribus aduersatur, & sordidū vlcus reddit. Neq; enim parum interest (inquit *Galenus*) nudo netuo oleum, an per interpolatam cutem admo-
Sanis qui- bus nuda- tuda. ueas. Abluenda igitur a vulnere sanies est, molli-
Aqua nuda- data nervo ad- uersatur. lina specillo circumuoluta, in sapa tepida intin-
Candens ferrum. cta, & mox expressa. Quod si omnia bene atque ex animi sententia succedant, etiam vino dulci non acri & mordaci, vulnus commodè poteris madefacere. Eo autem iam penes cicatricem ducto, etiam vile fuerit alium, tenue, & quod Græci *ολεοπυστην* vocant. Aquæ vero vsu, ob causam superius adductam, sicuti & *relaxatio cataplasma*, semper in nervo nudato deuitabis. Blā-
Sanis qui- bus nuda- tuda. de etiam ac suauiter vulnus (si necessitas verget) detergebis, vnguento ex vermibus factū, vel aliquo alio deterfitorio medicamento, quod recipiat mel probatissimum, *terebinthinam* & *seruinam* lardis, aut *fabarum*, vel alio ex his quæ in antidotario ha-
Sanis qui- bus nuda- tuda. bentur apud *Guidonem*. Nonnulli pro comperto habēt, quod si difficti nerui capita, seu extremitates, cadente ferro, carne vitata, leniter attin-
Sanis qui- bus nuda- tuda. gantur, optime postea conglutinari. Postquam autem neruum denudatum cōtuleris, linamenta extrinsecus circumducere oportet, ex medica-
Sanis qui- bus nuda- tuda. mento (inquit *Paninus*) quod angustis vulneribus faciat: nempe eo, quod ex euphorbio præparatur, aut *simo columbarum*, sed ita vt etiam sanas partes amplius comprehendat.

OBSERVATIO XL.

192

De nervi contusione.

CVIDA M. cui nervus contritus erat ac attritus, cum leui contusione carnis, cataplasma quod ex *fabarum farina*, cum melle ac aceto constabat, egregie profuit, quemadmodum etiam illi, qui fuisse, & alii quoque qui slippie lassus erat, vtriusque pax cum *oleo lumbricorum* profuit, quemadmodum & alteri sulphuris cum *oleo lumbricorum* auxilio fuit. At in punctura nerui obcecata, m-
Nervus contusus pro- seus qui crescit supra lapides, cum sulphure mi-
misuato ha- xtus, vino & aceto supra teguli ignem irroratus & appositis, mirabiliter dolorem si dauit, ac etiam materiam in nervo collectam resoluit, quemadmodum *oleum terebinthinæ* cum sale aliquantū bullitum, puncturæ cum tumefactione profuit. At illic dictus, cui nervus contusus erat, cūtra cutis lationem, *oleum myrrinæ* solum inu-
bet cum sca- ctum profuit.

S C H O L I A.

DE nervorum contusione hæc pauca adiciamus. Nervorum cōtusionem promiscuam cum ecchymosis, seu carnis contusione habere generationem, facile nobis insinuat similis vtriusque affectus curatio. Itaque illis & digerentibus

Nervorum contusio promiscua habet cum sca-
chymsi cum
curatio
rum ratio
nam.

& adstringentibus medicamentis vtobmur; hic vero etiam siccantibus & adstringentibus nobis vtendum est, præsertim dum cutis vna cum nervo confusa exulcerataque est. Si vero absque cutis simili affectu oceruus quidem confusus est, huic auxilia, quibus euocandi, ac digerendi facultas laeta, adferenda sunt. Confuso igitur nervo, si cutis simul coniundatur, & viceretur, *fabarum lomentum* exymelæ dilutū, aut si magis siccare volles, *nitum salinum* cum *sapa* & *modico aceto* illinis. Quod si amplius adhuc siccare desideras, iridem quoque *salicam*, vel eam quæ vulgo *Florantinem* vocant, immittes. Recentes in hoc affectu per initia roscant cum oui candido liquore

193 admovent, & mitigato dolore laborantem particulam fouet vino tepidato, quod crassa sit substantia, & adstrictionis particeps. At si vna cum confusione dolor infestat, picem liquidam exta-

Si dolo-
rum con-
fusione
infestat.

Si nervus
cum
infestus
est, cum
vino
magnam

Si nervus
tuo sit
præ-
fusus.

plasmatis & farina fabarum adiciis, & vbi simul bene decoxeris, calens medicamentum applicabis. Vniuersi autem corporis curatio eadem est cum ea, quam paulo ante docuimus. Verum si iteruus quidem & cūctus sit, cuius vero nihil, quod sensui apparet, a natura recesserit, oleo calente diffusorio, quale *amblyonum* est, & *rutæ*, *iridis* quoque & *amarantum*, continue locum irrigabis, pertundesque, & lana oleo madefacto foueabis, ac totius corporis curam prædictis similem adhibebis. Porro si uerus totus sit præfusus, metus præterea nullus (ut paulo ante diximus) instat, nullum enim inde periculum sequi potest. Membra tamen ex parte debile efficietur, præsertim si diffusæ oera⁹ insignis magnitudinis fuerit. Curatio vero eius communis est cum ea quæ aborum est vulnere.

OBSERVATIO XLII

De *græco ferra ablato*.

CVM cuidam viro curas ferra in Nosophomio Delphensi aufertur, sanguine cōstricto vt decet, primo apparatu cum restrictiua amoueretur, caro cum offe ferra ablata coequalis existebat, idque signum fuit, illum euasurum, atque ita huic quoque cūenit. Hoc enim chirurgus in Nosophomio Delphensi obseruatum est experientia, tales plerumque a morte euadere. At vbi caro sursum attracta fuerit, offe denudato, tales plerique non ita post cōnotiunt. Theodorius chirurgus in eodem Nosophomio Delphensi se se quoque sapiens experimentum fecisse, oleum camphoræ per ousa, corrupta eximere, dicebat, quod ego non sū expertus fuit. At auctores *Rozæ*, *Auicenna* & *Galeno*, si *pseudam* radix subtiliter pulverisatâ ossis cortici superimmissa fuerit eandem euiat & incarnat. Sed & emplastrum ex radice *quæ alic* cum vino ossis admotum, eundem fragmenta extrahit, Dioscoride idem sentiente.

194

SCHOLIA

CVM hæc in parte sana cruris sunt, qua ferra subinde cōsummo affectum aufertur cogitur, aut aliud membrum, ad ossium vulnera pertingere videntur. Tradita igitur vulneri carnosâ substantia, venarum, articularum, & nervo-

rum partium curandi ratione, nunc de vulneribus ossium nobis agendum superest. Ceterum tamen si omnis cōiunctio seu vnionis solutio in offe, *Galeno sexto methodi medice* & *passim* alibi Græce proprio nomine *catagmas*, (quod Latinis est *f. althara*) dicitur, recantes tamen tum medicum chirurgi fracturam vocare consue-

Fractura
quid.

run, solam ossis diuisionem, quæ sine incisione, a violentia quadam, vt ruptura extrinsecus accideret, fit, de qua in sequentibus latius dicitur. Vultus vero ossis appellare solent, præcisionem, enic, aut quopiam alio simili incidente, vel in profundum penetrante factam, de qua io præsentiam dicere statuiamus. Huiusmodi autem præcisio quandoque (ut nunc loquimur) est totalis, quandoque partialis. Ceterum cum os ipsius vulnerari non possit, quin caro & venæ & alæ superiacetes particule etiam vulneretur, sapienter ex ossium vulnere pessima quædam symptomata excitantur, nempe *profusus sanguis*, dolor, *vulnere*, *catagmas* & *sincope*, a quibus agendorum etiam indicationes sumenda sunt. Porro cum vocat vulnere ossium, sensui siotatis conspicitur, hæc præsertim iudicia seu præfuga sub-

Vultus ossis.

Os ossium
vulnere præ-
sentia obser-
uare sym-
ptomata.

Indicia.

iniciunt⁹, quæ tamen ab ipsis veteribus quam recentioribus scriptis mandata sunt. Itaque iudicat *Galenus lib. artem medice*, & *ruem* j & 6. *method. medice*, quod ossis soluta semel partium continuitas nunquam postea ad amissum & per se instaurari queat, præsertim vero in iuuenibus & adolescentibus & viris, multoque minus adhuc in senibus. Potest namque osilud tantū vnitionem per se & sine alterius ope recipere, atque in idem ad amissum coalescere, quod abunde molle est, cuiusmodi conspicitur in pueris. Aliorum tamen ope, vt substantia cuiusdam interuentu, eeu glutino quodam, ossa ipsa quantumvis etiam dura sicque fini, cōcreta sunt glutinantur. Vocat autem glutinum hoc, seu substantiam illam interuenientem, cuius beneficio si parata ossis particule inter se agglutinantur colliganturque Græco vocabulo *poron* sacro, id est, *calum* *catagmas*. Huius prognostici ratio superius adducta est, vbi de iudiciis vulnere in vniuersum agebatur. Hippocrati oraculum est *lib. 7. aphor.* *195* *rimor*, *calum* parauit esse, ossis nudato, carnem circumstantem videri ab erysipelate apprehensam.

In ossi, inquit, excutere, hoc est, nudatione, erysipela-
tis malum. Sed hic catagmas (ut ait *Galenus in Comen-*
tariis) ossibus ita patitur, raro superuenit. Ad hoc frigidum nudatis ossibus, *enclum Hippocrati* testimonium, est infelissimum, partes enim sunt exanguæ, ac a natura sua frigidiore. Quæcumque autem tales in animalibus partes sunt, citius ac magis a frigido effunduntur, vt *lib. 5. aphorismorum* *Gal.* adnotat, *commentario decimo citato*. Si magis ossis, veluti est os quod proprie *brachii* & *manu* dicitur, vulgo autem *os anterioris*, & vtrumque, *scilicet*, siue *os iube*, in aui inquam, & minus (illud *enema*, hoc *perone* Græcis dicitur) tota præcisâ sint, adeo vt medulla egrediatur, vulnus tale periculolum admodum est, & magna ex parte mem-

Puerulus
ossis diuiso
per se ualde
facile.

Erysipelas
ossis nuda-
tionis.

Nudata os-
sis, a frigido
maxime
effunditur.
Magnum
est pericu-
lum præci-
sionis, et
periculolum
admodum
est.

brum, quod ita præcisum est, emoritur. In tam insigni namque incisione, nervi, venæ & arteriæ maiores, quæ vitam, sensum, atque alimentum partium istarum sic affectæ prius ministrabāt, omnino præseinduntur. Quamquam non de fuerint aliqui, qui Auicennam perperam intelligentes, ausi sint oppositum plane asserere. Inquit autem ad hunc modum Auicennas lib. 4. *Et quod dicitur de incisione medullæ, quod interficit, est intentio, in qua nulla est vitæ. Habet enim medulla lenitatem & viscositatem, & non inciditur.* Quod dictum sic accipiendum est, quod nullus vnumquam interit ob præcisionem medullæ ossium, quamquam membrum sic percussum tandem contabescat & emoriatur, ob eam scilicet quam nuper adduximus causam. Cum vero dicit, medullam non inieci, hoc intelligendum, eum os frangitur, non autem cum totū exscinditur. Quis enim addubitat, eum os totum præciditur, & medullam quoque simul præcindi posse: Ceterū summopere cauendum

Ossis vulnera sunt tria, laquei subitæ, nec magna, nec medulla.

196
Curatio vulneratorum ossium.

Quatuor seu glutinentur. Ut autem finem hunc secundum possit assequi, quatuor alii scopi tibi proponuntur obseruandi, suo ordine exsequendi. Primus est, ut iis quæ ipsa sunt, & ossium frustulis (si qua sunt) exemptis, partes iniunctæ distantes in vnum adducantur, & ut commissuræ iam seu coniunctæ maneat, vulnus in carne acceptum, futuris altioribus, ac validioribus contrahendum est. Secundus est, ut præditi, quibus huic affectui rite mederi possis, prudenter deligas. Tertius, ut deligatur modus decens adhibeatur, nempe talis, ut eodem vulnus tractari ac curari possit, citra omninodam eius ipsius deligatur remissionem & ademptionem. Quartus, ut postquam a phlegmone iam tuta esse videbitur laborans particula, victus poro gignendo aptissimus instituitur. Ceterū, quomodo primus scopus attingi possit, iam in sermone vniuersali de vulneribus superius dictum est. Quod autem ciusmodi futuræ in carnis partibus f. c. t. in proposito affectu sint ex vfu, hinc manifestum euadit, quoniam distantes vulneris partes in vnum adducunt, adductas vero coniunctasque hanc amplius distendere patiuntur, ac præter hæc partis substantiam tuentur vires enim deligaturæ & ferularum tenent, pro-

Primus scopus.

hibetque ne circumfusus acr plagam tenuem subintret, & os ipsum alteret, ipsique noxam inferat, quod magnopere vitandum est. Atque hæc omnia in proposito casu sunt vtilissima. Promittendum igitur, ut vulnus mox carne impleatur: atque caro ipsa medicamentis exsiccativa facultate prædita, ita obduranda est ut tandem callosa fiat, & poros gignatur. Itaque si aliquid ex ipsius ossis substantia deperierit, ciusmodi euasita ad vngue impleti non potest, sed insanasibilis remanebit, ut lib. 3. *method. medendo Galenus nobis est auitor.* Secundum autem scopum hoc modo assequeris. Suturæ decenter factæ, turandam in locū vulneris deliusiorem imposito, ut per hoc emissarium ossis frustula (si adsint) vel sanies aut purulentia colluicia educi & expurgari possit. Sed & puluerem *suturæ* (ut vocant) *confermatum*, superposito, quem primis diebus cum *auri candido* liquore remiscebis. Postea vero *aglutinatorium commune* 197 ex puluere illo, quo omnia passim vtuntur, *turbidissima* permixtum, ita vt in vnum corpus coeant, superæaccommodato, vel aliquod aliud simile, ex iis quæ in carnatiua vocant, prout res expellulabit. Ergo turundulam in oleo rosaceo, quod *puluerem glutinatorium* ex myrrha & acceperit, illiam, indito. Myrrha enim, Auicennæ, carne nudata ossa vellet, & operit. Itaque si os ex toto nudatumve appareat, prædicto puluere, & linamentis ex optimis pannorum lacinis confectis, ipsum ossium munivov. Deinde emplastrū vel stupas aut pannos lineos vino calente delibutos superapplicato.

Myrrha.

Tertius scopus.

Deligatur modus in vulneribus esse.

lib. 6. de cranij fractura constat. Galenus autem fecit mentionem solius simplicis fracturæ magnæ in similitudine capitis & lateribus factæ, penetrantis & non penetrantis. De paruis autem fracturis nihil scripsit: ut pote quæ ipsi vix illa mentione dignæ esse videbantur. Albucasis præter has dictas differentias addidit & illam, in qua ossis lamina ad interiora ingreditur, & sit in loco contusitas, ut in lebre æneo percussio euenit. Hæc maxime contingit in pueris. Auicenna tum alii faciunt mentionem fracturæ, non in qua sit percussio, sed in apposita eius parte, hanc Paulus reprobauit. Sed de his latius vide quæ diximus Scholio *obs. 15.* Superius citatz, in qua egimus quoque de Amati historia *centur. 3. cur. 42.* utrum percussa vna parte capitis, altera affici possit. Auicenna tantum posuit vulnera carnis cum incisione, contusione, egiq; de fractura cum incisione & contusione, cum vulnere carnis & sinapso: nam per diuisiones communium fracturarum intellexit dictas differentias. Causæ vero vulnere carnis eadem sunt cum iis, quas diximus superius de causis vniuersalibus omnium vulnerum. At signa & indicia fracturarum capitis, alia significant fracturam cranij, alia incisionem cerebri & membranarum, alia inflammationem, alia ex materia defluente & grauante cerebri & membranas eius, lesionem inductam.

de his egimus locis iam citatis. Habes & exemplum de cranij fractura lethali *lib. 10. obs. 4. curat. medic. nostrarum, obs. 12.* & de meningum punctura vide *lib. 11. obs. 13.* in scholiis eiusdem: & de contusione a calu alio *obs. 24. & lib. 11. obs. 29.* de eo qui ex tactu telin caput obmutuit, & postea curatus fuit: aliaque ibidem exempla posita sunt, quæ ad hæc signa tū iudicia faciunt. Ceterū signa fracturæ cranij sumuntur a septem rebus, a quodone per ordinem positis. *Primo* a consideratione causæ, si angustis, ut quia cecidit ab alto, vel percussus fuit cum re forti. *Secundo* a consideratione quantitatis & vehementia lesionis: vel quia magna contusio aut ingens vulnus. *Tertio* a qualitate loci, & sepe ducit manū ad locū ipse a ger, & cum digitis & probis (ut vocant) percipitur tenuitas in cute, & sepatatio ab osse: & quando fissus vel anhelitus retinet, videtur humiditas pullulari per fissurā. *Quarto* ab accidentibus quæ circa horā cōcurrunt, ut apoplexia; vertigo, vocis destructio vel ablatio, vomitus, & similia. *Quinto* a soni cōsideratione, quia rauca sonat, dū eius caput percutitur cū virga, imo ego sæpius animaduerti, admodum aure, vulneratū tanquā ex olla confracta locutū fuisse, ut in filio illi natus, qui frontē ad pontē illiserat, euenit, ut alibi diximus. *Sexto*, a dentium frigidore: frident enim dum petcutitur filum, quod tenent dentibus, & dum conantur frangere nodū palæ, aut rem duriorē, læduntur. *Septimo*, ex encausse aut linimento mastiche super fissuram posito, quia nigritiem in fissura relinquant, & siccitatem in linimento supra locum fissuræ, & hoc signum cetum esse voluit. Signa incisionis panniculorum ab his quatuor potissi-

mum sumuntur. *Primo* a dolore, quia statim ab initio sequitur scotomia (ut vocant) & vertigo, & similia. *Secundo*, a calore faciei & oculorum, quia facies rubet, & pustule exsiccantur, oculi quoque rubent, eminent, & obsecuratur. *Tertio*, ab exentibus, quia sanguis exit per nares, aures & palatum. *Quarto*, a lesione virtutum, quia cum difficultate mouetur, loquela turbatur, angustatur, & totus prostratus & stupidus fit, febricitat, riget, male dormit, nihil appetit, nauicam & vomitum experitur, nec alium exonerat, aut vrinam bene emitit. Signa lesionis cerebri ex duobus potissimū inquiruntur: *Primo* ab exentibus, quia exit substantia crassa, globosa, medullaris, non saniosa: *deinde* a lesione virtutū, quia perit ratio, si vulnus est in anterioribus partibus capitis, memoria, si in posterioribus, & cū prædictis symptomatibus accidit stupor & desipientia maior. Signa vero inflammationis vel apostematis superuenientis primo sumuntur a tumore, quia inflantur membranæ seu panniculi, & eminent extra vulnus, & rubent, & non mouentur. *Secundo* ab oculis, quia rubent & inflammantur, & e capite egredi videntur, mobilitas nuda, & obliquantur ac contorqueantur. *Tertio* a calore: quia febricitat & inquiete se habent. *Quarto* a virtutibus, quia alienario subsequitur, conuulsio, febris, phrenitis. Signa quod materia descendat, lædatur & grauet panniculos & cerebri, sunt prædicta signa incisionis panniculorum venientia paulatim post principium. Nunc ad prognostica veniamus, fractura cranij apud omnes periculosa habetur: sed de cerebri incisionis, membranarumque eius corruptio ac lesio, lethalis secundum Hippocratem, nisi fuerit parua (ut ex-

pone Galenus, & superius de vniuersalibus indicis vniuersum dictum est. Quare & hæc symptomata mala in iis reputantur, ut febris acuta, vomitus, spasmus, alienatio, syncope, vocis abfessio, anilorum emersio, emunctio, tenebrositas, rubedo, strabismus, taha periculi plena sunt & lethalia, potissimum si adhæcant, & non remittantur, ut Auicem. *3. de piagis & capitis incisionibus inquit.* & in vultucribus peruenientibus ad panniculū cerebri, accidit laxitas in latere vulneris, & spasmus in opposito: & ideo inquit Guilhelmus de Saliceto, Si vulnus sit in dextra, paralytis sit in sinistra, & e conuerso. Ex Rogerii mente in fractura capitis pericula & symptomata mala expectantur vsque ad centum dies: secundum iurisperitos & iudices ad quadraginta sex, quia talis est vlcimus terminus acutatum: & secundum quatuor famosos magistros, ad quindecim, qui terminus communis est acutatum agritudinum. Præterea denigratio duræ matris, quæ non mundificatur cum melle. *Paulo auliere*, mortem significat. Fractura quoque cranij in plenitudine,

teste Rogerio, magis verenda. Sed & in solidatione cranij apparitio carnis rubæ, bonum, & in vultucribus capitis tumor paruus, & sanie optima coctio, bonum. Magnus autem tumor, præcipue si cito delitescat sine ratione mani-

Signa lesio
ni cerebri.

Signa inflam
mationis
aut aposte
matum super
uenientis.

Indicia

103

dam habeo (*inquit idem*) omitto. Sed hic aduertendum, quod possunt esse aliquando aliqui casus (*ut nos ante exemplis ostendimus*) in quibus emplastra sola sufficere possunt ad perfectam curationem, sine ulla amotione aut elevatione. & tales sunt, ut *Diuis quoque refert*, in quibus hæc omnia concurrunt nempe ut æger sit boni habitus ac euehytus in quanto & in quali (*ita enim loquuntur*) deinde ut orificium vulneris in cute & carne sit bene amplum, & fractura similiter amplā, deinde ut ipsū non sit autritum, nec pungens, nec comprimens panniculos: nec ipse panniculus sit contusus, atreus: & ut virtus expulsiua sit fortis, & medicamēta quæ exterius applicantur sint mundificantiā, attrahentiā, exsiccan- tia, & dolorē sedantia. Sed quia hæc omnia raro simul contingunt, præstat scilicet rationalem præceptis eligere. Ceterum ne in curatione euulsiū differētiæ communia refusamus, præstat his adhibere nouem præcepta, quæ ipsi Guidoni admodū necessaria in vulnere capitis sunt.

106 *Primum præceptum in capitis vulnere curatio ne obstruatur.*

106 *Primum* est, quod vulnus capitis maxime cum ossis fractura multis sibi propriis differētiis habeat, præter aliorum membrorum vulnera, tum ob propinquitatem & nobilitatem medullæ cerebralis, tum etiam ob eius formam sphericam seu rotundam non potest vitri, neque seruari cum ligatura, vt alia membra. *Secundum* in vulneribus capitis præcipue effatū dignis oportet seruare intentiones cōmunes dictas superius de phlebotomia, purgatione, solutione vētris cum glandulis, clysteribus aut aliquo lenitio, si alius non probere respondet, de victus ratione, quæ tenuis esse debet: de extractione infixorum, minus molestā de sanguinis fluxu, & de accidentium correctione & præseruatione, *ut dictum fuit prius, & dicitur*. Tertium est, quod in vulneribus capitis ante omnia abrādendi sunt crines, humectandum caput cum aqua & oleo, *ut Guibelmus annotamus*, præcauendo tamen ne pilus, aqua & oleum vulnus subintrēt, quia cōsolidationem impedirent, vt superius dictum fuit: & in principio materia tum dolor rescentur, supra & infra vulnus ponendo oui albumen, & post principiu cetera persequemur, *ut in propriis locis dicitur*. Ad cergendum, mundificandum, incarnandum ea, quæ vtilia videntur, adhibeantur, & loca circa vulnustā inungantur semper vng. de bolo aut oleo rosaceo, vt dolor & intemperies, si quæ sit, inhibeantur, & inflammatio prohibeatur. *Quartum* est, vt caueant huius frigore, nam, vt iam læpe audiui ex Hippocrate seniore, frigidum neruis inimicum est, iū ossibus & medullis, & præter hoc aer quoque offendit, & alterat membra principalia. Hinc & Guibelmus consulat vt tempore hyberno, cum hæc vulnera tractantur, id ipsum apud incensos ignes fiat, fenestris oclusis, candela accensa, & vt post diligaturam caput cooperiatur cucula ex pelle arctica. *Quintum*: quod si in eis est scissa lacies, fiat apparatus semel in hyeme, bis in æstate, & dum sit remissio seu apparatus, fiat mundificatio cum xylo seu cotone, vt deceptis

linteris aut pānis mollibus: idque sinuiter, & quam potest diligētissime sine dolore fiat. *Sextum*, vt super turundas seu finientia frustum spongiæ mollioris apponatur, vt per ipsum sugatur & attrahatur lacies, & recipiat, ne ad cerebrum descendat. Septimum, ligatura conueniens adapte- tur ligaturæ capitis, vt quando vulnus incarnare volumus, ligatura duorum capitum fiat, quæ saltem est semel incarnatiua, & sit, si scissia plus quam vnus brachij longitudinem implicat, & si latus sit quatuor digitos, & voluatur tota. exceptis duobus palmis, cum quibus incipiat, secundum frontis lōgitudinem, trahendo versus aurem oppositam vulneris, & aliam partem circumuolutam versus aurem vulneris, aurem tamen nō cooperiendo, sed ducendo eam vsq; ad caput alterius scissæ: & ibi iuxta aurem circumuoluat, stringendo, & caput palmarum ducat versus inferius: caput volutum ducatur superius versus caput, reducendo ipsum per partem posteriorem capitis versus caput palmarum: & iterum vt primo eam cum illa circumuolendo & reducendo super caput. Et toties illud fiat, donec totiū sit cooperitum & bene ligatum: dein de ligant Bononien- ses duo capita sub mento. Parisenses ea sunt in medio frontis. Si autem iis sit videntur vt medicamenta tantum retineantur, faciemus ligaturam multorum capitum, in hunc modum: ducatur pannus lineus facis magnus, longitudine trium palmarum, & latitudine duorum: & incidatur in quolibet lat. re ad latitudinem trium digitorum, vt tantum remaneat palmus vnus in medio: & tunc vnū de illis capitibus cum alio stringendo secundum capitis circuitum ligetur retro a parte posteriori: aliud vero cum altero, transeundo per collū, ligatur a parte anteriori sub mento. Sed de his vide libellum Galeni *De scissis*. Octauum: ad cautionem facit, vt si aliqua quantia ossi remanet, cum vino administretur auidet (*sicui fuerit febris*) pulvis capitalis ex pimpinella, betonica, garophyllata, valeriana, scissida, & quantum de omnibus, tantum de pimpinella adiciatur. Nonum est, vt situetur & decumbat vulneratus in principio supra partem, quæ minus grauabitur, postea vero cum fiat colluuius ac lacies super locum vulnecratum, vt lacies possit melius excollari. His præmissis, nunc procedamus ad curationem, iuxta vniuersūque diff. r. nam, & primo incipiamus a simplicissima contusione, sine cutis distractione.

OBSERVATIO XLIII.

De simplicis contusione capitis, absque distractione cutis.

Cum ad puerū, qui simplicem contusionem capitis habebat ex casu, vna cū chirurgo acciti essemus, licet leuis contusio esset, sine cutis distractione, eadem hora pilos abrādī mandauimus, eos humectādo cum roseo & vino. Potest & cum oleo communi fieri, & debet quoque abrasio maior esse ipso loco contuso. Deinde inunxit chirurgus oleo rosaceo, & adhibuit cura

cum fluppa vitellum ovium albumen conqual-
fatum cū oleo rofaceo. In secundo apparatu eisdem
adiunximus aliquid cinnamini, ad emplaftri formam,
calide actū applicandum, prius inuncto loco cum
oleo rofaceo tepide. Quarto die ex melle collo & ci-
minio emplaftrum appositum est. Atque ita con-
tinuatum est ad finem curationis, & puer bene
habuit.

S C H O L I A.

P R E T E R hæc iam dicta in obseruatione, si in
adultis cōtufio fiat, facienda quoq; est diuer-
fio per phlebotomiam & euacuationem, si æger
iis opus habeat: potissimum in magnis contufio-
nibus. Et ad eandem intentionem possunt fieri
frictiones, & ventose poterūt applicari, ut etiam
a oleo dictum est. Potest & a principio applicari o-
leum rosæ, vel chamomillæ, vel ambo simul, infusus
in eo tribus vel quatuor peciis, vnam super aliam
capiti l'eo applicando, vel lana succida oleis iis-
dem imbuta. Deinde quarto die transacto, &
dolor sedato, aliud emplaftrum vel cerotum re-
solutivum vsq; ad finem curationis quis appo-
nere potest. Et prædicta olea mutanda bis terve
in die, secundū necessitatem, nam præsentē forti
dolorē requiritur frequens mutatio: & cum iis-
dem potest etiam fieri embrocha, vt facilius pe-
netrent olea. Quod si dolor excedat, necesse est
vt medicus seu chirurgus doloris causam consi-
deret, vt sic cōmodius eandem tollat, & huic suc-
currat: nam si materia in loco aggregata & con-
iuncta, multitudine sua dolorem inferat, præstat
tunc emolliētibus & anodynis vti, vt pote deco-
ctione althææ, sem. lini, sanægræ, tum huius so-
ti vti, & ex reliquis cataplasma conficere, adie-
cto oleo chamomillæ vel anethino vel aliqua pin-
gued. gallinæ aut anatis, vel oleo amygdalino dulci,
& similibus, pro emplaftri impinguatione: &
dum hæc fiant, non oportet omittere vniuer-
salia, vt sunt venæse, phlebotomia, & similia. Seda-

209 to dolore, & debilibus incipienti, materia est
resolanda hoc vel simili leui resolutiuo: R. aspsi-
s humida 3 ss. olei chamomillæ & ss. pul. absinthij, beto-
nica ana q. s. fiat emplaftrum, quod si non iuuat,
sequens fortius potest admoueri: R. terebinthina
3 ss. aspsi. humida. 3 ss. betonica, marrisina ana & ss.
cymini 3 j. misce. Item terebinthina sola cum cymi-
no est mirabilis: vel terebinthina cum pari quanti-
tate cera & cymino præstanti est. Vel pul. salina,
maiorana, storach. arab. calami arom. ros. rub. ab-
sint. ana pari q. cum vino collo, & pauco melle, &
ceratum de medico terebinthina, fac emplaftrum. & caput ad-
moueto. Aliud valde conueniens: & dicitur cerotum
de betonica. R. terebinthina, resina pins, cera
mona ana & ss. pul. betonica 3 j. ss. melleis, thuris ana
& ss. mumia 3 ss. fiat massa secundum artem. Vel
R. terebinth. cera, resina pins, ana & ss. liquant
simul: deinde adde sandaracæ, thuris, melleis bet ana
& ss. misce. Valet & ceratum humanum apud chi-
rurgos dictum. Sed hic sciendum, quod dolor a-
liquando euenit a bile: & tunc in principio val-
de frigida, vt oleum rosæ cum succo sempervivæ, vel
solatæ, lactinæ, nymphææ, portulacæ, p'sillij, polygoni,

sarmentorum visci, maxime in ætate iuuenili, ma-
cilentia & biliosa complexionē, & in ætate, con-
ducunt.

OBSERVATIO XLIV.

De contusione capitis, cum ruptura cutis.

C V I caput contusum erat cum ruptura cutis,
huic statim sanguinem ex cephalica detra-
here iussimus, ne inflammatio aut dolor obori-
rentur. Chirurgus vero apposuit in primo appa-
ratu albumen cum fluppa, deinde imposuit turū-
das ad dilatationem disruptionis cutis, ne sanies
retineretur, ipsique infusus cum oleo rofaceo om-
phacino, eoq; totū caput inunxit, vsq; ad tempus
augmēti. Postea rofaceum purū imposuit: deinde
ad detractionem melle rofaceum, cum oleo hypericæ.
Dedimus autem post quartum lenem purgatio-
nem cum cassia dissoluta cū aqua betonica: & cum
videbatur vulnus securum ab apostemate, chi-
rurgus lauabat cum vino mellito: & ad incarnati-
onem apposuit vnguentum hysiscum. Postea et-
iam ad consolidationem appositum est ceratum
de betonica.

S C H O L I A.

C O N V E N I T valde in eiusmodi contusione al-
bumen: cui conqualfatum: facit enim ad san-
guinis restrictionem, & inhibet ne fiat affluxus
hæmorum, aut inflammatio. In secundo autem
apparatu ad illa localia transeunt, scilicet prius di-
uersionibus & euacuationibus, si opus est, quia
localia tripliei de causa applicatū, primo ob do-
lorem sedandū, secundo ad cōfortandū mem-
brum, tertio ad digerendum: & omnes illæ in-
tentiones reperiuntur in oleo rosato omphacino a-
romatico & recenti, teste Galeno 2. de compos. me-
dic. secundum loca cap. 2. de cephalalgia ex adustione,
& tale oleum administratur purum, infundendo
peciis in eo, & turūdas, & totum caput inungendo
(vt diximus) per totum tempus argenti a-
postematis. Non desunt tamen, qui a principio
post sanguinis restrictionem vniuntur in istis vul-
neribus oleo rosato & vitello ana, & in forma vngu-
enti applicant: quod ego tamen non laudo, quia
ouum facile putrescit, & quantum possibile est,
debet in vulneribus capitis putredinem decli-
nare, & prohibere ne putrefiat panniculi. Potest
tamen conuenire cum ouo in digerendo tantum
labia vulneris, & in aliis vulneribus ac contusio-
nibus exterioribus, sine cranij detractione, quam-
uis plures cōmendatur oleum rosaceum purum. Sunt
etiam aliqui, qui vniunt terebinthina mixta cum
vitello ana a principio, qui modus similiter non est
bonus, quia in terebinthina est aliquod nitrosi & a-
peritruui, nec fit reperculio ab ea, quæ est neces-
saria in omnibus vulneribus capitis: & quamuis a-
liquis hæc bene succedant, hoc fortuito euenit,
quia etiam errore ducti interdum fiunt.
Cum vero prædicta vulnera sint secunda ab apo-
stemate, carne repliantur ea, lauando cum vino
mellito, & applicent vnguentum carniem gene-
rantia, sic vt vnguentum hysiscum vel ceratum o-
fiale, vel vnguentum de marrisina, & pulueres car-
nem generantes, vt pote pul. ex sanguine doli. myr-
ræ.

Diuerfio.

Ad dolorem
loci contus.

Sedato dolo-
re quomodo
materia con-
tufionis sit
resolanda.

Ceratum de
medico terebinthina,
betonica.

210

De contufio-
ne capitis
cum ruptu-
ra cutis.

rba.

rhæ, oleo, farina arabi, sarcocolla, thure, myrrillu, & similibus. Post generationem carnis debitam, admixtrentur medicinz cicatrizationis, sicut est unguentum de murio, de lubaris, de tinea, de ceruo.

111 *si simul colla ad formam cerati.* Sed magister mentis loco illorum vtebatur aliquo cerato ex prædictis, vt de betonica, vel cerato humano, vel aliquo alio, & dimittit ea (salta tamen syphilationis) per octo dies super locum læsum, vt magis induretur & ingrossetur earo callosa. Sed quia interdum caro erecit superflua, tunc remouemus illi cum vnguento apostolisano, vel cum alamine vng. quod longe melius est, nam alumen vstum leniter asperitum carnem superfluum excisat, & cicatrizat. Ceterum si vulnus capitis fiat cum deperditione carnis, & cutis, sine latione cranij, præmissis vniuersalibus & restricto sanguine, & sedato dolore administratur medicina lenis mundificationis, sicut est oleum rosaceum, & mel rosaceum simul: minuendo assidue oleum, vsq; quo veniat ad mel rosaceum purum. Facta mundificatione, ponatur vnguentum generans carnem, vt est vng. de matrisilina, hysciscum maius & minus, vel istud egregie confectum: *Res. myrrham, sang. draconis, thuri, robori farinam, & similia, mixta cum terobinthina, cera, & oleo rosato, vel myrrina, fiat vng.* Et cum est proximum consolidationi siue cicatrizationi, adhibeatur cicatrizationis supra dicta. Guido vero de vulnere capitis facto per incisionem, absq; cranij fractura. *Si est simplex, inquit, alique deperditione substantia, sanatur, & ligetur vt & alia vulnera: caretur, & incarnetur. Si autem fuerit cū deperditione substantia, regeneretur caro, & cutis cicatrizationis cum suis lenamentis, lincinis & propriis pulueribus, vnguentis & emplastris, & vt cetera vulnera tractentur.* Quod autem futura sit vitis nō solum in talibus simplicibus vulneribus capitis, sed in multis aliis non paruis, intellige, sed magnis: nam illud est vile multis vulneribus capitis, quod facit permanere partes distantes in idem coniunctas, deinde prohibet & aeris alterationem, quæ valde noceat: & ideo futura quoque *tertio Artu parua, & per totam Methodum medendi commendatur.* Et ista fuit intentio Auicennæ quarto dicentis: *In fissuris vero, in quibus non est nisi fissura, si est plurima, sanatur, iam & in cranij fractura idem dicit, & addit, si est necessarium idq; non sine cautione: nam si talis fissura esset in summitate capitis, non fuereat, sed in lateribus bene fuereat, vt inferius dicitur.* Et hanc talem futuram concedit Guilbelmus de Salicero, Lanfrancus, & Henricus: sed & Auicenna atque Paulus idem fenserunt, & iubent vt vulneri infundatur oleum ros. ad sedandum dolorem, quando vulnera contingunt vsque ad pelliculam neruosam cooperientem carnem, nempe pericranium, & ad mollicandam ossa adherentia, vt lenius extrahantur: & ad reprimendum acuitatem, quando volumus panniculos interiores mundificare cum melle. Nec ratio eorum valet, quantum ad futuram, quia ligatura incarnatiua in capite est multum defectiua, vt dicitur. Nec quantum ad o-

leum rosatum, maculat vulnera simplicia: nihilominus composita cum dolore & aliis dispositionibus indicantibus oleum rectificat & emendat. Medicare enim semper iubet Galenus indicationes aduerfantes. Sed de vulnere capitis facto per incisionem, cum cranij fractura, non penetrante, hæc addit idem Guido. *Vulnus tale aut est magnum, aut paruum. Si paruum, quod rimalius vocauerunt multi, eodem modo curatur sicut præcedens, sine fractura cranij, quia in tali vulnere parua generatur sanies, & propter eius crassitudinem per talem duram paruum fissuram descendere non potest. Si vero fuerit magnum, aut est in lateribus capitis, aut in superiori*

De vulnere capitis facto per incisionem, cum cranij fractura penetrante.

parte: si fuerit in lateribus, eadem etiam cura curatur vt primum simplex, nisi quod in inferiori parte ponitur lentia seu turunda, vt si aliqua materia retinebatur in illa fissura, perforamus lentia valeat expurgari. Si in superiori parte, non sanatur, sed fit ibi curatio, secundum Galenum lib. 6. Therap. Simplicis, inquit, ruptura, quæ ad secundum vsque laminam, id est, durius Græci dicunt, pertinet, iū quo modo diximus angustis, scalpelli indigent. Expedit autem hos, vt numero multos, ita magnitudine impares esse, ne ubi desit quod operi sit commodissimum. Postea vero nudato, prout fieri solet, visitato osse, vtendum primo quidem latiore: ac deinde eo quod illo est angustissimum & ita procedendo deinceps vsq; ad angulissimum. Hoc vero in ipsa diploe est vtendum. Deinde si dolor aliud non requirit, protinus tum ad finem vsque sicis medicamentis est medendum: quæ ob id ipsum vocantur Græce, id est, caputales sunt dicta, de quibus postea dicemus. Ideo autem istud vulnus non sinitur, quia existens in medio capitis, non potest expurgari per se, & nisi imberetur sanies cum lenamentis, turundis, & aliis auxiliis, desiccaretur, ac posset retineri aliqua materia in diploe seu medio tabularum, & ibi putrefieri, & putredinem in ossibus generare. De vulnere vero facto cum incisione, cum fractura cranij, sine deperditione substantia, vsque ad interfracturam supericiem penetrante, ita scribit idem cranij.

De vulnere capitis cum incisione, cum interfractura.

Guido: *Tale vulnus aut habet squirlas (ita appellat officina inæqualia & comprimentia) aut non, sed est planum & æquale. Si squirlas, quæ possent pergere duram matrem, squirlas & asperitatibus plantatis & aquatis cum leniculis (Græci φασκίς vocant) aut aliis instrumentis, eodem modo curantur, vt immediate dictum est, & hoc est quod docebat, Galenus consequenter. Ex fractura vero, quæ ad cerebrum vsque membranas perueniunt, si simplex tantum fractura sit, iam dictum scalpelli angustis vtendum, & hoc quantum ad illa quæ sunt in brevitate, id est, in superioris parte. In illis vero quæ sunt in latere, non multum sollicitus fuit de instrumentis, nisi quod fuerent, & cum turundis & lenamentis mundificarentur, vt sub finem idem Galenus lib. citato subicit. Nouimus aliquando syncrepsis fracturæ, nec non et illud, quod tunc est protinus succedens, temporis est vocatum, in quo ipsi squarum copulæ cōmmissuræ esse accidunt: in eo incutientia fractura longissime permebat, quam ipsi eandem minime contingenti, sed tantum syncrepsis ex-*

scindens,

De vulnere capitis cum deperditione carnis & cutis, sine latione cranij.

De vulnere capitis facto per incisionem absq; cranij fractura: sine deperditione substantia, & cum deperditione substantia.

112

scindens, hominem sanauit, ita ut nunc quoque iam multos annos viuat. Quod si fincipite quoque et dimissis, purmissis citius qua alia subest at cerebri membrana, quam in caluum fractura induruisse. Deinde addit huius rei causam. Nam si nulla ex laesi partibus sanies intro confluere, superfluum esset ei excurrere. Deinde addit: Ege vero in alia similitur si habente fractura cognoscimus, supernum ei dimittere, ac quod a lateribus erat, quo sanies deflueret, excutere: sed mox, cum et effundendum eius et duritiem afflammasset, vultus fore indicium supernum ei potius excutere, quam ob defluxum sollicitudinem cerebrum valenter concutere. Cogitans praeterea accidere posse, ut si a latere magnum fuerit in ossibus foramen, promineret fortassis hac parte cerebrum. Est porro in lateribus non vno in loco etiam nervorum, quibusque non levis momenti quidam exortus, eum in supernis partibus ne minimus quidem vsque oriatur nervus. In latere igitur erat locus, habilis ad expurgandum saniem, in fincipite nequaquam: ideo opus erat locum ampliare, & cum turundis, linamentis, aliisque auxiliis oportunos ichorem prohibere, & generatum extrahere, & desiccare. At si vultus sit cum contusione & parua fractura ossis, si eiusmodi fractura est cum squirlis pungentibus, tum lenticulari & aliis instrumentis applanabuntur, & postea supposita prima remutatione in praecipuis superius dicta, pecia panni delicati desuper apponatur, aut sindon molli, infusa in melle & oleo rosato, desuper apponatur. ipsam aliquoties cum cauda probe inter os & duram matrem imponendo, ut defendat partem, & prohibeat ne suo motu panniculi laedantur in osse, & desuper lacinia delicata, infusa saltem primo cum eadem mistura, imponantur, & supra ipsam & ipsum os peciam panni etiam infusam ponemus, ut inhibeat, ne sanies inferius descendat. Antiqui tamen ponebant peciam seu frustum vnius scyphi, & erat impostura, quia assistentes, qui non erant in secundo apparatu, seu in secunda remutatione, credebant quod ibidem loco ossis deperditu remaneret: & desuper in vulnere carnis ponatur alij huius fices, vel pesu spongiae, ut imbibat sanies, & desuper emplastrum capitale perforatiuum, ut non includat saniem: & vltimo flappas balneatas in vino calido, & expressas, & vnam non infusam, & ligetur ita delicate, ut ligatura retineat & non comprimat. Et quando erit bene mundificatum, remoueatur pannus primus, & ponatur pulvis capitalis: & continuetur ad incarnandum: & vltimo quando erit incarnatum, puluere cicatrizatio claudatur & consolidetur. Guido in hac operatione maxime commendat Henricum. De vulnere cum contusione absque fractura cranij, est consilium Auicennae, ut materia refrenetur a principio communi apparatu albuminis oui, & si vis addere oleum rosae, quia mitigatiuum, bonum est. Postea vero resoluatur materia cum vino salito, & melle, aut cum aliquo ex dictis in capite de contusione, ex sermone vniuersali. Et si fiat sanies, maturetur, & aperiat, ut alia exitura & abscessus. De vulnere

re enim contusione & parua fractura, est consilium Galeni, quod si fractura est parua, curanda est ut praefata contusio. nam tota curatio in eo consistit quod resoluatur, ut saniem saltem notabilem non efficiat. Auicenna vero in 3 canone de foda percussione, & de regimine eius cui accidit commotio cerebri, dicit quod oportet ut sit tota tua intentio in hoc casu, ut dolorem sedes quantum possis, & elonges materiam a loco laeso, ut non succedat inflammatio aut apostema: & hoc euacuatione & attractione ad contrarium, cum phlebotomia, clysteribus acutis & pillulis cochiis, modo non adfit febris: etiam emplastretur locus in principio cum eo quod confortet, sicut sunt emplastra, quae fiunt ex aqua myrsi, & salici, turga pastori, vel ex oleum myrsi & alio, & rosae, & ex pulueribus rosae, balani, caprelli, calami arom. lentis, chamomilla, moeloti, boli arm. alumi myrrha, 215 alibani, atque cydonis confectum cum vino, & dare in potu scorchadem cum aqua aut melle. ipsi enim cum eo liberantur, ut dicit. Et cum egrediatur propter percussione sanguis ex cerebro, fumat in potu aquam granatorum cum cerebellis gallinarum affatis. Theodoricus vitur emplastro ex hac casu lauri, camomo, aniso, sale, masticho, ibere, atque erib. atura farfuris, celis cum vino, quod Guidoni placet in fine. Et in ista fractura potiones possunt administrari conuenientes, quia parua est, ideoque eam nullo aut exiguo auxilio natura potest per se rectificare. At magna fractura necessario indiget chirurgia & dilatazione, seu apertura, & non pigmentis, ut latius demonstratur a Guidone, auctoritate Galeni & Auicennae, ac aliorum, ut etiam ipse Galenus demonstrat lib. 6. methodi medendi. Quo modo autem facienda sit apertura, & ossa amouenda, vide totum illum sextum lib. Galeni, Therap. in quo & de instrumentis omnibus agit, & Nicolaum de tempore, in quo debeat fieri omissio amotio: nam alia subito vel quam breuissime fieri debet, nullis interpositis temporis induciis, altera tardius, prout cogunt accidentium signa, nam quae pungunt membranas cerebri, vel cerebrum ipsum, in prima hora vel parum post amouenda sunt: & ubi est materia collecta inter meningas, tunc necesse est latius aperire, ut sanies effluere possit, vbi certi sumus de sanie collecta, eum est manifesta perforatio & incisio, tunc non est expectandum ultra tertium diem. Sed ubi non sumus certi, an sanies aggregetur supra panniculos, id colligemus ex accidentibus seu symptomatibus: nam si sanies sit in loco nobili inter cranium & duram matrem, inferet mala accidentia, ut febrem, rigorem, intellectus permaionem, seu perturbationem, & similia, cum ibi sanies sit clausa, sine emutatione, Sed si haec non apparent, nec certi sumus, poterimus expectare vsque ad tertium diem, imo ad septimum in zestate, & ad decimum quartum in hyeme. Sed cum adfuit accidentia dicta, statim aperiendum est os, ut sanies inde possit expurgari. Ad locum eligendum quod attinet, tres sunt, quae haec indicant, nempe in quo loco fieri debet

De vulnere cum contusione & parua fractura ossis.

214

De vulnere cum contusione.

De contusione cum fractura magna.

De tempore in quo debet fieri amotio.

De loco legendi.

beat apertio. *Primo*, situs loci: nam debet fieri in decliuoriori loco, ut inde superflua commodius expurgentur. *Secundo* consideranda est ossis qualitas: nam quod durum & crassum est, non potest remoueri, ut iam paulo ante ex Galeni exemplo ostendimus. *Tertio* consideranda est origo ner-

uorum: nam ne ui existit e a cranio, mutant locum iocionis, ut Galenus ibidem annotat. Præterea etiam sciendum, quod quamuis arteriz & venæ, & etiam nerui reperiuntur inter commissuras, non propter hoc (licet aliqui illud uolunt) semper debemus commissuras fugere in operando. Nam possunt reperiri casus, in quibus ita necessaria est ossis amotio in commissura, quam in alio loco. Exempli gratia, si contingat caput la di notabiliter in loco commissurarum, ob quod statim uel ad tempus contingat duram matrem ibidem esse separatam: tunc in commissuris operando osillum fiet nouicentum vcnis necarteriis, quia iam sunt separatæ & a cranio distantes. *Es*

*De quatuor-
tato am-
tatione ossis.*

*De quatuor-
tato am-
tatione ossis.* hanc operationem (inquit) sepius compiens præceper mens, & bene eodem successit. De quantitate amotio ossis dicit Auenzo: Non oportet incidi quippiam ex ossi, nisi illud quod est infirmum, quam sententiam & ipse Galenus posuit 6. method. mendum. cap. 6. sub his uerbis: Si uero et totum si alium sit, necesse est, ut totum auferatur, & si ne ad locum sanem: si uero totum non sit fractum neque contusum, non totum auferatur, sed illud solum quod cogerit: uisum effectum esse, nec posse per manere. Interim aduertendum, quod ista ossis quantitas mouetur ab experio chirurgo secundum quantitatem & qualitatem saniei contenta sub eoi uel collecta; quia ubi est maior sanies, requiritur maior uia ad expurgandum, & ubi si sit crassa uel viscidula indiget magna uia uel parua. Mensuratur etiam secundum quantitatem panniculi alterati, ut possit fieri abstergeri & mundificari: alicui etiam cum operatione manus & medicinis simul, mensuratur etiam secundum quantitatem alterius uel extrahendæ: mensuratur etiam situs loci: quia in vertice maior pars ossis amouetur, quam ante seu retro, & a lateribus, quia situs iuuat ad expurgandam saniem. Quod in his igitur sit necessaria chirurgia, probatur ex Guidone, auctoritate Galeni, ut diximus, quæta o. Therap. per modum epilogi dicit: In fractura uero, quæ ad cerebrum & siue membranas permeauerit, si simplex tantum fractura sit, tam dictis scalpelli angustis utendum: si cum confusione aliqua, quod contusum est, excidi debet, radice uel terribili prout in circulo perforatur, mox deinde scalpello, ut est, excisorio, uel, ut alii dicunt, abscissorio: uti præterea ab immo cyclois, quos Guido terribiles appellat. Verum quia breues sermones, inquit idem Galenus in praxi non sufficiunt, hunc locum Galeni commentabimur: & idcirco proponam, inquit, octo documenta ad hanc operationem maxime necessaria: quibus deinde addam operationem, quam Galenus, Halyabbas & Paulus sequuntur. Primum documentum seu præceptum est, ut non exercentur hac operatio in illis, in quibus uisum debilius est: nam, ut dicebat Galenus, secundum aphorismum, ubi est inedia uel indi-

gentia, non oportet laborare. Vnde & Nicolaus dicebat, quod si incipit fieri non debet, nisi necessaria causa: cum uigeat, & ut uis ossis amotionem ferre possit. Secun-

dum: ob calorem uitandam, ante omnia præmi-

tendum est prognosticum, cum prostratione (ut ait)

de periculo ipsius ætatis, ut sic chirurgus (autem)

Auenzo quarto canone) sermone uoludum de-

clinet. Tertium est, ut in operante feriat commis-

suras: quantum poterit, timendum enim esset de casu

& lachione duræ matris, ut constat ex anatomi-

æ, exceptis illis casibus, de quibus superius dictum est.

Quartum est, ut non fiat in planis, quia in eo cerebrum augmentatur, & ad cranium ap-

propinquatur, ut habetur 3. de feb. critici. Quintum est, ut fiat magis in loco decliuoriori, quia talis est

apertio ad expurgandum, ut paulo ante diximus: quod & 11. Therap. habetur. Sextum, ut in dilan-

dando non consequatur sinu fissurarum: sufficit enim,

secundum Galenum, auferre tantum de osse, ut sanies possit expurgari. Septimum: quod si sit, quod

extrahi debet, repugnat extrahi, cum oleo reser-

infundatur, ut uia mundificetur, & cum minori dolore extrahatur. Octauum est, ut quam citissime po-

teritis ipsam expediti in operatione, maxime in com-

pressioni & punctura panniculorum: nam hac citissime

insequitur inflammatio aut apostema, & consequuntur

accidentia mala. neq. in descensu materiei de par-

tibus superius spero aliam neq. excessu in afflate diem

septimam, in hyeme quartam. Sed textus hic videtur

corruptus, cum in ætate ob faciem corruptionem

potius ad quartam non sit excessum, idcirco ad septimam: quia si postea fiat, suspicio

erit iam factam esse talem impressionem, neque

operationem ualere. Operatio uero secundum

Auicennam talis est: imprimis radatur caput

vulneratum, deinde duæ sunt fissuræ secundum

figuram crucis uel litteræ X. (ut dicit Paulus) sc-

cantes, aut secundum figuram cifra 7. ut dicit Læ-

francus: deinde excoriatur anguli, & ostotum

conculsum de nudatur. in quo debet fieri perforatio,

seu concavatio, quod si accidat inde sangui-

nis fluxus, impleatur uulnus cum pœonis infusis

in aqua & aceto, aut cum albumine oui, & si non

accidat fluxus impleatur linamentis sic: is: deinde

pone super ipsum puluillis in uino & oleo infusis

& conueniente vinculo utaris. Sequere debet

mane, nisi recens aliquod symptoma prohibeat,

perforare seu cauare os fractum seu vitiatum ag-

gredere. Commode igitur collocato in t. d. i. z. groto, aut

recumbente, prout vulnere conuenit, auribusque

ipsius lana obducatur, uel xylo (cere-

uocant) propter sonitum, qui ex appulso red-

ditur, & solue ligamentum vulneris, linamentis

omnibus, tum pannis exemis, & spongia de-

terius fordibus. Iubebimus deinde in m. i. s. u. du-

bus, ut tenuibus fasciis circumpositis, quatuor

angulos corporum, quæ fracturæ in: umbunt, at-

toliant: & si quidem os fuerit in becillum, aut na-

tura aut fracturæ uisio, id scalpello excisorio, acie

inter se aduersis, auferemus, primum cauiss exci-

foris scalpelli, quos Graeci cycloas vocant, alia-

tiore incipientes, mox angustioribus, deinde spe-

H

*De docu-
mentis, si-
ne necessariis
ante chirur-*

*iam faci-
dam in ossi
centis: cum
fractura
magna.*

*Calcaria
fada cur-
tu per chi-
rurgum.*

118

cilli modo angustis, malleolo fenim adactis, ad capitis concussionem vtemur. Si autem validum os fuerit, prius eo cerebello (vulgo *trochanus* dictis) quæ mergi non possint, quas ab argumento abaptistos dicunt, perforato (cuiusmodi vero sunt, quæ paulo interius quem cuspis acuta est, eminentias habent, quæ ipsas ad cerebri membra non demergi prohibent) per iculpa circumfione vsq. ad quod vitiatu est, auferemus, nō vniuersim, sed particulatim, si quid fieri potest, digitis si nō, foreipe, aut vulsella, quæ vel ossa vel pili apprehenduntur, aut eiusmodi quodā instrumento. Poli vero cū lenitulari & malleo ornata, vel ut Paulus docet, ossis ablati, asperitudinem (significat vocant *Barbars*, quæ ab incisione caluarie provenit, rasorio aut quodā scalpello excisorio adæquabimus, lamina quæ mēbram cūstos est, subicientes, ac officulis quæ remanserūt, vt verisimile est, ant spiculis ingcinose ablati linamēta infereamus, quem modum diametri Græci appellant. Avicenna hæc omnia ex Paulo desumit, quem sequitur Guido, addens: *Sing. peraltis & vniuersi caries, & ossa cuncta ut suis dictum de fractura cum ossa deperdiscent.* Ceterum qui differentias fracturarum capitū, tñm earum curationes ad vnguentum docē dignoscere desideret, legat Paulum lib. 6. cap. 90. de fractura capitis, & de calvaria fracta curationem, in qua & de cerebri inflammatione, & ea quomodo enretur, agat. Sed, vt ad Guidonem redamus, & de correctione accidentiū agamus:

Paulus lib. 6.
cap. 90.

119

De correctio-
ne acciden-
tum.

Si occurrerit, inquit ille, inflammatio seu apostema, quod ut plurimum evenit propter cōpressionem & punctionem ossis & tenturum seu membranum, ligamentorum & ligamentorum, aut propter frigus, aut propter malam vellem rationem, vel malum regimen, ut vocant, tunc sistitur ad separationem carnis, & subtrahit materiam cū phlebotomia & aliis euacuationibus, & mita locum cum oleo rosar. calide. aut cum aqua calida decoct. alibis, fomentis sem. linc. chamomill. & similibus, & emplastrum de maluis, aliud enim plurimum commendatur. Si a nigredo accesserit ut meningibus ex natura medicamentorum, abstergetur, & mundificetur cum melle & oleo rosar. Quod si acciderit sua sponte, inquit Paulus, idq. in uno potissimum, cū alius granibus induruit, attingi tunc nō debet, ut quæ natura calor & emortuū trahat. Noui quēdam qui post annum quā affectu illo consistaretur, calvaria perforata superuixerit. erat enim fractura in scintille ex telo facta, emissariumq. habens, per quod etiam mēbrana ab affectu immunis conseruata est. & ideo ipse Guido addebat, si impetrit ex seipsa veniat ad oculum cum signis alui malis non confusis de salute infirmi. Ceterum de carne superflua, & aliis accidentibus dictum est in sermone vniuersali, quare, iuxta eundē Guidonem, ad medicinas capitales accedamus. Medicinas vulneris capitis, inquit, in principio, quousque æger ab apostemate fuit securus, debent esse mitigatiuæ: qualis est mulsura trlum partium olei ros. & vna mellis: & tamen 6. Therap. senex ille ex melle apponebat: & si dolor non infestabat, ad magis mundificandum debent esse & conuer-

De medici-
na vulneris
capitis.

fortes partes mellis, vna olei rosei. Postquam autem fuerit securus ab apostemate, medicina sit defecatiua sine mordicatione, qualis est pulvis capitis, qui secundum Galenum fit ex tris illis. *lyrica, erubi furana, marmæ* (quæ est ibi minutum) *aristoloch. cort. rad. panaceæ.* Brunus vero addit *mirram, sarcocollam, sing. drac.* Lanfrancus & Guilhelm. *myrtilli & nucis cyressi.* Emplastrum capitale de betonica positum ab Henrico, quod de super ponitur, ita se habet: *Re. succi betonicæ, & succi plantag. succi apocelerum ana lib. j. resina, ceratona ana quart. j. cerebenthina lib. j. coquantur primo vsque ad succorum consumptionem: & ultimo addatur succobethina, & fiat emplastrum.* Aliud de centauria, quod Guido libenter vtebatur in vulneribus capitis: *Re. centauria minoris m. vi. temperentur per noctem in vino albo, deinde coquantur ad consumptionem medietatis, postea colentur, & colatura bullatur vsque ad spissitudinem mellis, de quo Re. & iij. lactis mulieris & j. cerebenthina lib. j. ceratona quart. j. resina quart. j. thuris, mastichis, gummi arabici ana & j. fiat emplastrum.* Potio ad vulnera que in capite, dicta est in istius capituli documentis. Hæc Guido. Ceterum multi hæsitant & dubitant, an debeat poni medicina sicca, vel de oleis sedatiua post amissionem ossis. Cui ad hærendum sit, breuiter dicam, quia melius est incipere post detectionem, in omnibus vulneribus penetrantibus intra cranium, cum medicina doloris mitigatiua, scilicet cum oleo ros. quam cum valde sicca medicina, maxime quousque sumus tui ab apostemate, & a similibus accidentibus: & postmodum administrare ea, quæ valde exsiccant, & vulnus carne implent & consolidant. Cui opinioni adhærent Paulus, Scapio, Albucisus, Avicenna, & plurimi medici magni nominis. Interim notandū, quod licet tutius sit incipere cum oleo rosar. propter rationes optimo medico notas: tan. & in processu, & quāto citius possibile est, vsus olei puri amouendus, quia vulncri, in quantū vulnus est, non cōuenit, nec cōplexioni membrum est conueniēs, & ideo nimis eius vsus inducit putrefactionē. Sed cōmuniter Doctores Practici laudant p. tres dies vel parū vltra, vsus olei rosar. deinde in cipiunt addere melle rosarum, & vna, & aliqua exsiccantia magis minusve, secundum accidentia quæ apparent, ut Galen. 6. Therap. docuit. Secūdo quousque notandum, quod in omnibus casib. post detectionem ossis, & etiam in qualibet latione capitis, licet non auferatur os in principio, vbi non fuerit sanies, vel panniculus alteratus solo oleo rosar. est procedendum modo & viam dicta & dicēda: & ita per gradus venire ab oleo rosato ad melle rosarum. Sed quia interdum post ossis amotionem reperitur panniculus alteratus aut sanies in loco aperto, tunc procedendum est cū mundificantiibus, & non cum putrefaciētib. Insuper & hoc addendum, quod aliqui sunt casus in quib. debemus cauere a melle rosar. propter eiusdem caliditatem, & virtutem ipsius absterfuiam, maxime vbi est periculū de fluxu sanguinis

Emplastrum
capitale de
betonica, ut
Henrico.

210
Emplastrum
de centauria
Guidone.

De qualitate
medicinae ca-
pituli applica-
da post ossis
detectionem.

guinis ab aliqua vena, vel in panniculis, vel labiis vulneris, tunc aut vteretur *oleo rosæ. cū vino*, vt diximus. Vel si dubitemus ne mel sua mordicatione in

²¹¹ capite paulo calidior humores attrahat ad caput & ita causa futura inflammationis foret, vel alterius accidētis, tunc loco *mellis rosati* humere possumus *oleo rosati*, q̄ minus mordet, & minus calidū est. Hæc a prudētī chirurgorū medico relinquenda, cum & in capite calidior & tēpore calidior tardius deuenerit ad *metrosaccam*, quā in his qui contrario modo sc̄ habent. Vīa qualitate medicinæ administrandæ, lacta offis amotione, nunc pauca a præceptore mco experta addamus quibus ipse vīus est, quale est *ceratum humanum* dictūm, quod inter cetera medicamenta capitula, quæ utriusq̄ adhibentur, principatū obtinet, & credit, si aliquo modo vulnera capitis sine offis amotione curari possent, hoc vīcū esse remediū cerebro tū capiti valde amicū, cum & momenta consistat, quæ cum cerebro ipso symbolū habet. Fit autem hoc modo: *Be. cerebuntina lactis vīno maluatico, resina priu colata, cera albiana* 3 iij. *mumma* 3 j. si liqueant simul liquefacienda; postea adde *mumma*, paulatim cū spatula miscendo, vsq; quo omnia adquirant mixtionem perfectam; circa ignem semper, ne coaguletur. Facta conuenientē mixtione, omnia proiciantur in *vasē argenteo*, vel alio mundo, in quo sint *lib. iij. aceti rosati, ex vino maluatico*. & sic dimittatur per diē & noctē deinde manib. in eodē aceto bene lauetur. vsq; quo cerotū totum expressum sit ab aceto. Postea pone ceratum in vase vitreo vel terreo vitreato, sine aceto, & in tali vase pone lactis mulieris *vt. succi tormēntillæ, succi pampulionis & s. succi botanice* 3 iij. *succi bryoniae, succi plantag. ana* 3 j. & omnia lento igne bulliant vsq; quo coosquantur de p̄dictis liquoribus tāta quantitas quanta fuit lactis. Postea adde succi *verbenæ* 3 j. *succi pimpinellæ* 3 j. & pone omnia in feruētī sole, cum cautione ne a vento puluere externo repleatur, cooperiendo aliquo panno raro, & ita stet in sole per mensem, vt minimum: addendo singulo die lactis *l. i. succi botanice* 3 j. (alii ponūt 3 j) & ita exsiccentur *succi & lac*, donec veniat in formam cerati vel vnguenti. Sed si contingeret, quod Sol nō posset exsiccare tale lac vel sineum, tum tempus minus fuerit calidum, tūc ponatur tale ceratum in aliquo cacabo mundo & terfo, & lento igne bulliant, vsq; ad cōsumtionem succi & lactis. Et isto modo hoc vitur, scilicet, parando peciam magnam circumdantē vulneris per 4. digitos, vel circa, pluribus foraminib.

Ceratum humanum.

²¹²

perforatam, & in vulneribus supraos vel infra: cum amotum erat, supra panniculum ponebat peciam parua dicti ceroti, extensam super sindone, & sic tenta aliqua vel turunda, aut licinio ex panno lini subtilis (latiniore, linamenta appellant) replebat vulnus, lenissime tamen: & hoc ceratū circa septimū diem, nisi sanguinis fluxus impediret, applicabat: lauando semper vulnus cum *vino maluatico*, in quo bullierant *rosa rubra* & sic vsq; in finem procedebat, semper po-

nendo duas vel tres guttas mellis infari bene coctū in vulneris fundo. Sed quis in dicto cerato ingreditur *pimpinella* & *tormēntilla*, & alie herbe, ex quibus difficulter succus exprimitur, seruabat hunc ordinem, quod semper pillando tales herbas inieciat cum vino optimo maluatico, & postea cum rosulari succum maximo labore extraheret. Quod si deficeret hoc ceratum, vteret vng. infra scripto de *matrisula* vel *Capella* dicto, cui nonnisi calidū chirurgi maximā fidem adhibere crederentur. *resina priu, cera non ana* 3 iij. *olis rosæ & vīni maluatici, thuris ana* 3 j. *gummi elemi* 3 j. *matrisula, botanica pulueris ana* 3 iij. *Matrisula* & *botanica* ponuntur in infusione secundum artem *in lib. x. vini optimi* per diem naturalē. postea adde omnia p̄dicta, excepto *gummi elemi, thure, & matrisula*: & bulliant omnia forti bullitione, vsq; quo sit consumpta media pars vini, atque ita vt sic bulliant appareat hæc mixtura viridis coloris satis intensi: & tunc coletur & dimittatur coagulari. Deinde coagulatum a vino separa. & coagulatum totum accipe, & pone iterum in cacabo. & bulliant tantum quouique partes vinolæ quæ remanserunt, resoluantur: & hoc cognoscitur isto signo, quod dum bullit: non facit spumam seu sindorem. Hoc peracto iterum cola. in qua colatura adde alia, scilicet *gummi elemi*, & sic subtiliter puluerisata, & semper miscendo, vsq; quo optime incorporetur. Et isto vitur, conficiendo peciam tam magnam quā potest: & in labiis vulneris de eodem vnguento super linamenta vel licinia cum melle rosato puro vel mixto vitur, ad suodum vulneris procedebat. Sed etiam cum isto vnguento aliquando vitur & ipse puluere capitali, descripto a Galeno, Haly & Auicenna (de quo superius dictum est) constante ex *sinaria orobi, irosi, aristol. longa, cortice, opopanax, cortice thuris ana p. a. sit pul.* cui alii addunt, vt diximus, *myrrh. sarcocollam & sang. drac.* vt Bruns faciebat: & Lanfrancus, vt diximus, addebat *myrrh. grana*, & nucis cupressi, alii addunt *q̄ centauri & hermodact.* Præceptor meus primo utebatur, licet & alia adiuncta ipsi quoque placerent. Prædictum autem puluerem imponit 14. die transfacta, cum iam incipit caro generari, & c. lauando cum *vino maluatico*, & *melle rosato* superposito: deinde superasperso puluere, replendo semper vulnus linamentis p̄dicto vnguento linitis, vsq; ad tempus sigillationis procedebat. Isterdū tamen lauando fundum vulneris cum decoctione infra scripta, maxime si contingeret virulentiam & saniem aggregari, etiam detergeret cum syringa, si opus esset: *Be. vini maluatici lib. iij. rosæ rubrae, botanice, pimpinellæ, matrisulae, centauræ, stachad. ana m. s. aristoloch. irosi, corticis thuris ana* 3 j. bulliant omnia simul vsq; ad duarum partium consumptionē, & coletur, cui adde mellis rosati optime cocti 3 iij. Ista lotio est mirabilis in vlcibus profundis in capite. Cum autem caro superfluere, solis *hermodactylis* vitubatur, cum magis exsiccet, & sic carnem aliquatē

inventionem de Matrisula.

²¹³

Curatio.

minuant: & si illi non sufficient, apponit *modicum aluminis effusi*. Sed illud animaduersione dignum est, quod istis ceratis & vnguentis non est vtendum a principio, sed transactio apostematibus tempore, tardius etiam in aestate. Quare solitus erat idem præceptor meus a principio, scilicet transacta quarta die, lauare vnguentum de *marryssina cum lacte mulieris*, & eo vtiebatur per tres aut quatuor dies sic lotus, quia tunc non ita calidus est, neque ita suspectum de attractione materiz ad caput. Interdum quoque lausbat eum *agua rosacea*, maxime si tempus calidum esset, & in biliosis, qui caput calidius habent, tum in iis, in quibus magis imminet periculum de fluxu sanguinis, & vbi etiam est febris intensa, tunc magna inflammatio in capite: & sepe etiam tali tempore idem lausbat vulnera tum vlcera lacte muliebri. De curatione læsionis panniculorum & cerebri cum medicinis, secundum vsum eiusdē, ita ab ipso notatum teperi. *Quod si*, inquit, *contingat vulnus esse in pān. cutis aut cerebro, præter omni alia curatio nō erit nisi modis medicis operā dabit, ut intusbeat omentum mortuum foris tum animi tum corporis: neque debet fieri ab ipso chirurgo vlla operatio, nec manus nec ferrū, aut instrumentū, nisi lentissima, in abstergēdo, lauando, & medicando, quia ex tactu & agnitione violenta in tā nobili & molli membro, quale est cerebrum & pia mater, fit dolor, & forte vna solutio, vnde prædicta medulla, & subsequitur mors. Sed si nō tangatur nisi modo dicto, natura succurrit medico tū loco affecto, & consolidatur vulnus. Sed tactus prædictus ita levis ac lenis sit, ad minus tū diu donec transierit quatuordecim dies; deinde paulo audacius potest chirurgus tractare prædicta vulnera: quamuis & hoc leniter si imper faciendum sit. In principio autem, coarctatio sanguinis cum ouo & aliis rebus conuenientibus, ponatur in fundo vulneris lac mulieris ab vbre recenter multum, & cum eo lauctur vulnus his vel ter in omni modulatione mutando lac etiam sit actū calidum: vel lauctur tale vulnus cum vino maluitico, in quo rose bullierint rubez: deinde repletur dictum vulnus illicinia seu linamētis intinctis prius (vao vel pluribus, secundum magnitudinem vulneris) in prædicto lacte. Et hæc tantum replicat fundum: cetera vero licinia, quæ sunt tanta, vt repleant totum vulnus, sint inuncta in oleo rosato omphacino. Postea supra vulnus ponatur duæ vel tres peciez lineæ, magnitudinis vnius palmi, imbibit in prædicto oleo. Deinde panis de betis & stappa & fascia conuenienter lenissima ligetur. Et iste modus curationis fuit per quatuor dies vsq; ad sex, & non vltra. Deinde capitur aliquid vng. ex prædictis capitale, & ponatur super licinia cum vnguento, quæ imbibantur in oleo rosato omphacino & melle rosato partibus æqualibus. & sic repletur vulnus, prius vngendo caput totum prædicto oleo rosato. Et vnguentum a præceptore meo receptum & expertum, quod sæpe vtiebatur, erat de *marryssina*, prius a nobis descriptum: quod quidem vnguentum ipse lauare solebat cum lacte mulieris ter vel qua-*

ter: quo sic vitur ad minus transacta 9, vel 10. die. Deinde vitur eodem vnguento non lotus, quia tunc requiritur medicina magis calida & sicca: & sic procedit. Verum ipse papulam inlinit copiam *aletrisari*, & auget quantitatem mellis: ita vt circa 14. diem vtatur solo *melle rosato*: & sic deinde cum lotionibus & suo cerato supra vulnus imposito, procedens, replet illud carne. Quo vulnere tandem carne repleto, adhibet consolidationem & sigillationem. Sed quia raro reperitur *aletrisari* omphacinum optimum, loco cuius capit *aletrisari myrtinum*, & *aletrisari* partibus æqualibus: & isdem vitur maximo cum successu. Ceterum antequam de vulneribus capitis sermonem finiamus, historiam illam egregiam, ab Amato ¹⁴⁵ positam Cœcuria 2. *Curat. 39.* in qua agitur de vulnere inter virosq; cerebri ventriculos penetrante, his adiciamus. Cum in duobus duo robustissimi iuuenes extra urbem Romæ digladiarentur, alter alteri per frontem ensem immisit: ex quo vulnere illico læsus in terram concidit, & eum tumi prostratum tamquam mortuū, vincens dereliquit: accurrentibus tandem iudicibus, & spectantibus, cum vicinque subleuaret, & a diris cruentisque manibus rapuerunt: qui omnium medicorum & chirurgicorum assiduum consensu paucis horis ipsum expiraturum prædicere: tam enim peccetrans horribileque vultus erat, vt cerebri substantia incisa perforata videretur. Sed cōtrarium euenit: quio nullo flagrante symptomate, intra quinquaginta dies æger sanus factus est: oon hinc tamen omnium admiratione, & medicorū præcipue hæsitatio: quippe quum ita per vulnus specillum, quod *senioris assidui* vocant, ingredi animaduertent, vt vulnus cerebri substantiā attigisset, eorum nullus ambigit edidit illi reuera cū vulnus inter duos cerebri ventriculos illatum esse ignoraret, merito illum casum admirabatur. Potest autem gladius inter cerebri ventriculos multum currere, sæpeque penetrare, nullam cerebri substantiæ noxam inferēdo: tametsi vtrique meninx semper afficiatur, vt ægroto oostro euocit, & aliis olim a nobis notatis. Medicus itaque vel chirurgus, qui ad corpus humanum accedit, & id absq; membrorum & particularum exacta consideratione curare contendit, haud alio loco esse reputandus est, quā faber lignarius qui sustulso oculos habet, & ligna, p. conficienda sella in cidere ietat. Oportet igitur medicū vel chirurgū io corporis dissectione apprime subactum & instructū esse. Et ita absolutum a omnem curationē vulnerum capitis, contusionū, & fracturarum. Sed his addi possent instrumenta capitalia, quibus chirurgi vtuntur, potissimum sex illa ex Guidone quæ debent esse de qualibet forma tria numero, *manus* nempe, *manus*, & *medium*. Verum hæc in Guidone ipso requirenda potius esse iudico quoniam hic omnia ipsius Guidonis verba exscribere operæ pretium esse non puto. Ita quæ le- &orem ad illius & aliorum recentiorū chirurgorum

De curatione vulneris seu læsionis panniculorum & cerebri, et medicinis.

145

rum

tum libros ablegans, propositum meum cōtinueare decreui; & subiūgens hīscē capitis vulneribus, exemplum quoddam oculi vulnerati; vnde cōcitas subsecuta fuit.

116 OBSERVATIO XLV.

De rufico quodam, clausa vulnerato, in oculo, vsque adeo vt inde visum amitteret.

ANNO 1570. clausa ictus in oculo ipso, in pargo Lyrano ruficus iuuenis visum perdidit: quē Simon chirurgus inquilinus istius pagi tractabat. Sed post 14. diem cum ipse met decumbere, ruficum ad me misit. Februarii die. Cum autem nulla pharmaca accepisset, & localib. tantum visus alium nō deponeret, hoc pharmacum propinaui. *℞. filar. sena ʒ vi. rhob. silecti ʒ j. ꝑ. sm. fumeuli ʒ j. sguamanti ʒ j.* infunde in aqua fumei-terra, benemica, euphrasie ana ʒ iij. & bulliant; & fortissimē expressiōi adde *℞. ex infus. ref. ʒ j. ꝑ.* fiat potio pro ii. dosibus. Vnam statim dedimus, & ter alii deposuit. Altero die, ob dolore, ne accederet febris, quāquam iam 14. die ab ictu vulneris ad me venisset, & chirurgus pratermisisset sanguinis missione, sanguinem detrahere iubeo ex vena cephalica in brachio dextro (nā in oculo dextro lesus erat) quāquam ab initio prestantius fuisset, licet nunc quoq; pratermittere noluerim, ne ex dolore oculum inflammatus totus exideret, iam vlcere affectus. Deinde & hoc collyrium per aliiū chirurgum, qui & tunc præfens erat, vt sapius in oculum infunderetur & apponeretur, mandauimus *℞. succi fumeuli, malua ana ʒ j. aq. ref. ʒ ij. lactis muliebri ʒ j. misce.* Postea die vno atque altero intermisso reliquum potionis sumsit, & quinquies alium ex eo exoneravit: dolor in oculo mitigatus est. Deinde octavo Februarii die ad inflammationem tollendam, ad poris deterfioem & doloris sedationem & aliquid consolidationem, hoc sequenti collyrio vti sumus: quo postea beoe habuit, quāquam visum non receperit: *℞. collyrii*

117 *Rhastis albi ʒ j. sacch. candi albi ʒ j.* super cotem cum modica aqua rosacea terantur; adde aqua euphrasie, fumeuli rosae ana ʒ j. aqua albumini ouis coeussis ʒ j. *℞. ex infus. ref. ʒ j.* per pannum lineum rauari colentur, & fiat collyrium.

S C H O L I A.

P OST capitis vulnera succedunt vulnera faciei & partium eius. Sed quia exemplū vulneris faciei prope maxillam sionistram satis alti obfer. 10. præcedente in medium attulimus, atque vulnera faciei in eodem scholio eiusdem obseruationis ex mēse Guidonis explicauimus; ideo locum citatum legere poteris: & quod ad oculorū vulnera attinet, tum palpebrarum, etiam huius exemplum in medium adduximus *obfer. 13. huius lib.* Verum cum de vulneribus faciei satis dictum sit, quod super cū de vlceribus oculorū, hic aliqua ad maiore enucleationem addamus. Vulnera igitur oculorum (vt ex ipse Guido restabat) sunt periculosa, & valde metuenda, propter visum, & propter eorum propinquitatē ad cerebrum: imo vidi multoties, quod etiam at-

statur Beniuenius, propter vulnera circūstantiarum oculi, sequi oppilationem neruorum opticeorum, & cataractas. Quid ergo dicam, quando fuerit in substantia oculi? Certum est quod si confundantur humores, sequitur oculi destructio. & ipsius actus, & sic ruficus hic clausa in oculo percussus visum amisit, præcipue cum non recte ab initio tractaretur, solis topicis nempe remediis, diuersionib. neglectis: vt ipse Galen. 4. de acutis *q. morbo* viderit puerum punctū stylo iuxta pupillam, effluente p. o. inus aquoso humore, imminuta pupilla, ac ceratoide tunica corrugata, curatū. nā hoc fuit ex raro contingentibus, quippe cum huiusmodi vulnera magna ex parte cōcitatē inducant, vt ipse Galenus testatur; nō obstante quod Rabbi Moyses quasi deridendo Galenum dicit quod fuit de mirabilibus ipsis; partes enim spermaticæ in pueris quolibid regenerantur, vt videtur. Curatio autem est secundum lectum, prohibere materiam, & ne fluat ad oculum. Et si sanguis non exierit, collyriatur cum tutia & modico camphoræ. Si autem sanguis exierit, albumen oui super oculum ponatur, & inflata firmiter ligetur. Beniuenius in hoc casu maxime commendat *germina suorum agrestis*, & ducta in

118

mortario in formam vnguenti quāq; medicinā. *De intrantibus virtutem a Deo duntaxat appellat.* Si autem intrauerit aliquid in oculum, & vulneret ac dolorem inferat, & oculum offendat, veluti fumus, pulvis, lapilli, palea, vel arista; præcepit idem Iesur, inflillari in oculum lac mulieris, vel aquam dulcem sapius: quia mundificat ipsum, & extrahit omne quod in oculum cadit; & si non recedit, palpebras inuertere; & si videris id, quod in oculum incidit, inuolue stilum, aut digitum cum panno molli lineo, & absolve illud: si vero retineat, cū picaretolis remoueatur, & in oculū stilla lac mulieris, vel aqua murtis. Ad tarsen & sanguine qui infra oculū euenit, ppter vulnera & percussiones, laudat ille idē Iesur inflillationes lactis muliebri & uris propter albumini ouis & sanguinis columbini quā est sub alio: & emplastrare oculum cum medulla panis in vino effusa, est optimū. Et si nō dissoluatur, de stilla in oculū aqua amei & salis gemme: & fomēta oculū cū aqua decoctionū hordei & hyssopi sicca. Et si non recedit, accipe aquā clarā, in qua steterit arseni, ū pulueris istius, & pice in oculū. Sed de his diximus de hypopis, cum de vitiis oculorū ageremus, & potissimū *obfer. lib. 9. al. q. cur. med. de nauta illo*, qui craniū cōtufum habebat cū oculi hypopio. At vulnera palpebrarū sūnt cum acibus curatis; & si fieret futura cum cauillis (*iste Guido*) propter motum palpebrarum, magis esset tota, specialiter quāodo area pilorum est incisū: tū enim cartilaginosis est, vt difficulter vniatur. Postea autem cum pulueribus & pannis beoe sustentibus, artificialiter & ingeniose ligetur. reliqua vide apud Theodoricum *lib. 2. cap. 1. de vulnere palpebrarum*: & de vulnere in substantia oculi cum ense aut sagitta, vide *lib. 2. Guilhelmi Saliceti cap. 4.* Nasus quoque ali-

Ad tarsen & sanguine qui infra oculū euenit, ppter vulnera & percussiones, laudat ille idē Iesur inflillationes lactis muliebri & uris propter albumini ouis & sanguinis columbini quā est sub alio: & emplastrare oculum cum medulla panis in vino effusa, est optimū.

De vulneribus palpebrarū

De vulneribus oculorū

hoc anno 1570. mense Octobri, dñs hęc scriberem; quem tractabat M. Fredericus chirurgus. Non solum autem nasus vulneratur, sed quandoque frangitur, quandoque atteritur & quassa-
De vulneribus nasi.
 tur. Sed hic dicemus de vulneribus & incisionibus, quę magis accidunt quam reliquę. Iā quoque nasus quandoque abscinditur ex toto, quandoque non, sed adheret, & tenet se cum carnaliorum. Si ex toto ceciderit, vniui non potest. Vnitio nā in organici (vnde Gal. 3. Artus) im-
 219
 possibilis est: & causa fuit dicta in iudiciis vniui salub. quicquid alii garruli in contrarium effutiant. Si

autem ex toto non fuerit incisus, siue languinolentum est, siue non, scari cōde renouetur vulnus, & sicut caute & decenter, eo modo quod dictum est superius de futura cum filo, faciendo tot puncta, quot erūt necessaria: & si acus recte sint, nec bene possint adaptari ad futuram, calefaciendo eas in igne curuenter: & imponentur in naribus duz tentorundę ex stuppijs; aut cū mulsis ex pennis anseris, vt ac & sanies, sua possint habere spiramina. Postea ponatur pulvis, & applicentur plumaceoli ex panno decenter facti vtrique in quolibet latere, & alius desuper, qui comprehendat totum nasum, balneati, in primo apparatu cum *oleo albuginis*, cum *vino albo calido*, & quando erit necesse, curetur cū emplastro vel *ung. incarnatio* & *confolidatio*, & ligetur ingeniose. De ligatura huius particulari varie altercantur medici, & quisque suam defendit ligaturam. Albucasis & Auicenna. Lanfriscus & Theodoricus præcipiunt ligare cum duabus ligaturis; vna subtus nasum, ad sustinendum; alia super nasum, ad tenendū medicamina. Rogerius & Guilielmus ligant cum *scissa incisa* per inmedium, quā nasus possit transire, ad modum capistrī. Henricus totum hoc reprobatiōe dicit melius basurum sine ligatura; quia si ipsa est stricior, nasum deformabit; si laxior, parum proficiet: & vtraque in somno potest nocere ex compressione, & v. r. sione, & motu inordinato. Nihilominus in casu concedit, vt ligetur subtus, & non desuper. Ego autem (*inquit Guido*) hac alteratione parum commoueor: quia, vt dixi, in facie non potest dari certa regula de ligatura incarnatiua; quare quilibet suo ingenio vtatur, prout quævis commoda inuenire poterit. Dūtaxat curandū est vt in capite optima sit cucufa, in qua suantur ligaturę, tam in suendo quam in imponendo stuppas, & idonea sustentacula. Vt præcipit Theodoricus, eo modo qui erit facillimus: nam si modo adaptentur ita vt sustineant partes coniunctas & medicamentum applicata, fiat erit. Si a. nasus sit infri-gidatus & alteratus, consulti Henricus, vt cum caliditate naturali pullorum tantum calefiat, vt redificetur. Si autem non potest redificari, remouetur, idq; tam tarde quam fieri poterit, ob infamiam, & querelas vulgi ac calumniam; & locus curetur & cicatrizetur. Et slet primus apparatus per tres aut quatuor dies. Alii deinde bis in die mutantur. Os nasi intra 18. dies plerumque resaturatur. In fractura additur quod

intromissione digitorum, aut alieuius baculi in-
 220
 terius nasus sustentetur, & exterius cum manu altera æquetur: & postea intromittantur tentę conuenientes, & iuxta ac desuper *plumaceoli* in primis infusi cum albugine oui: & deinde cum diachylone, in quō farina volatilis & pulvis rubrus cū *oleo rosaceo* fuerint malaxata; & caute sustineatur & ligetur. Et quando cū fractura fuerit attrito, curetur vt aliz contusiones. Si autem est cartilaginis separatio, conglutinetur. Reliqua de vulnere nasi vide apud Theodoricum lib. 2. cap. 12. De vulnere in naso, & facie, enſe vel sagitta il-
 lato, vide Guilielmū Salycetum lib. 2. cap. 3. Vul-
 nera vero aurium & labiorum nihil habent pro-
 prium: sufficit n. vt suatur & ligentur modo quo commodissime fieri poterit, & vt alia mēbra car-
 nosa curentur. De vulnere in aure habes pulcher-
 rimum historiam, nempe si cum enſe vel sagitta
 fiat, apud Guilielmum Salycetum lib. 2. cap. 6.

OBSERVATIO XLVI.

*De vulnere brachii & de altero sub scapula, & de
 tertio in dorſo penetrante ad interiora.*

FAMVLVS rhythpse cuiusdam anno 1566, 7.
 Augusti die vulneratus fuit sub scapula, & in
 dorſo, icū tranſeunte dorſum & thoracem: do-
 inde in cubiti: xura vulnus quoque acceperat.
 Hic autem per superiora sanguinem expuſabat,
 quod signum erat primum vulnus thoracem
 tranſiſſe a parte poſteriori: nam & per inferiora
 sanguinem conuertum deſiciebat. Ad hunc cū
 accitus eſſem, ilico ad diuerſionem in brachio
 non vulnerato ex vena beſifica sanguinem de-
 trahere iuſſimus. Vulnera autē in tractabant Pe-
 trus chirurgus Delphensis, & Gerardus iunior
 chirurgus. Ceterum non hoc decoctum præ-
 scripſimus statim a miſſione sanguinis: *sc. caulid
 rub. scabroſa. veronica. capul. Pen. pol. terre. vngula
 calidula ana m. j. border mundati p. j. glycyrriza
 rasa 3 v. l. vinar. poſſ. enſel. E. j. iuniorum, ſibiſten
 ana num. v. coquantur in aqua communi pro lib. i.
 colaturę addendo ſyr. capul. Pen. E. j. ſyr. viol. iuniorum
 ana E. ſſ. miſce pro apozemate. capiebat bis 23
 in die. Deinde hoc elegmate pro tuſſi & ſp-
 to eruento eiſcindo vtatur: *sc. conſerua bo-
 rag. diatrag. frig. ana 3 iij. ſyr. capul. Pen. E. j. ſyr.
 viol. iuniorum ana E. ſſ. miſce pro elegmate: ſumat
 ſepſiſſime cum ſpatula glycyrrizę. Hic febri-
 citate: ideo ipſius pectus in unguis non ſolum
 ob dolorem, ſed & ob calorem ſibilem. vnguē-
 to ſequenti: *sc. vng. roſum. E. j. poſſes & hoc de-
 cocto vtatur ad libitum: sc. border communis
 m. j. glycyrrizę rasa E. ſſ. capul. Pen. vinar. poſſ. ana m.
 ſſ. jem. 4. frigid. ana 3 ſſ. cœcum rub. j. coquantur
 in aqua communi ad lib. j. colaturę addendo
 ſyr. ex viſſuſſ. viol. ana E. ſſ. miſce pro iuleb. O-
 ctavo die Auguſti, cum guttur inflammatum in-
 ſpiceremus, apthas metuebamus, licet dolor
 illo, quierat antea in latere dextro, sanguinis
 ruſſione ceſſaſſet, & melius haberet: tamen ne
 apthę oborirentur, vt gargarizate ſequenti
 veretur, iuſſimus, ad gutturi internam inflam-
 mationem: *sc. Aqua plantag. E. v. l. l. l. aqua
 ſca-****

scabiosa, caprifici ana & ij. diamorani & ij. β. misce pro garg. Continuo quoque lambebat ex *fr. orni.* Nono die Auguli decoctum pargans sequens propinauimus: *℞. felur. sena 3vj. rhah. felletti & ij. squina. thi & β. ebulliant cum & ix. decoctis. pectoralis, & cortic. exprell. adde fr. cap. Ven. ex. i. ffo. of. ana & β. misce pro ij. dosibus, vnam accipit, quia debilis erat; & ex ea quatuor fecessu habuit sanguinolentos: & bene tulit. Die deinde intermisso, aliam exhibuimus dosin: & tunc ter quaterve aluum deposuit, ac feces naturales non sanguinolentaa excreuit, & cepit melius habere: quamq̃ gutturis inflammatio ex toto non cessaret. quare pro hoc symptomate depellendo, hoc gargarismo denovo vi sumus: *℞. Aqua plantag. ih. j. rōf. ruk. p. j. sem. cydon. & j. ebulliant semel: & colatur adde dianthem. diamorani ana & j. misce quo & aphthæ sinatz sunt. Cum autem non dormire sequens hordeatum dedimus: *℞. horde. mundat. m. j. iarmg. d. dule. excoriat. & ij. fiat hordeatum, decocto hordeo cum eiusdem aqua, adiecto zaecharossecundum artem. Hæc autem die 10. Auguli præscripsimus. At 11. pro tussi, ℞. conferua bo. ag. 3 ij. diatrages. frig. 3 ij. fr. uol. taurinus, capill. Ven. ana 2 β. misce pro eclegmate. Et his supradictis remediis, tum febrim, tum tussim cessantem, & breuius vulneris cura curatus fuit. Vnum habebat, vt diximus, sub omolata vel scapula secundum in dorso, penetrans thoracem a parte posteriori; tertium in flexura brachii, vel cubiti iunctura. Ab omnibus tribus vulneribus euasit, quamuis in principio pro deplorato haberetur, ob difficultatem anhelitus, & spiritū cruciatum: nam chirurgi ex vulnere dorsum penetratetum thoracem, partem scilicet eius posteriorem, pulmonem laesum putabant. Nihil autem ipsi, neque profuit atq; missio sanguinis in principio; quæ in magna vulneribus (vt iam sepius ostendimus) ad diuersionem fieri debet.***

SCHOLIA.

De vulneribus colli & partium eius.
ANTEQUAM de vulneribus omoplatarum, & brachiorum & thoracis agamus, quedam hic prius de vulneribus colli & partium eius ponamus. Vulnera itaque in collo (vt *Galen. a. m. om. ius*) q̃dam sūt in sola carne, q̃dam vero in ossibus spondylium: q̃dam in ligamentis lateralibus q̃dam vero in venis organici, q̃dam in vāis ciborū & anhelitus: propterea & vitra cōmunes intentiones habet & propriam ligaturā, & aliqua propria prognostica, & pauca curatiua. Ligatura colli incarnatiua fit cum fascia longa dorū caputū ab opposita parte vulneris, volūdo colli, & ea ducendo ad formam crucis supra vulnus: & postea faciendo transire sub axillis reducendo ad collum, idq; reuolūdo, & ibidē suendo. Et si effusio sanguinis in capite, suatur cū ea, vt eam manuteneat, ita vt non descendat. *Ligaturam* autem medicaminum retentiuam præcipit facere Rogerius hunc in modum. Scindatur ligatura ab vtraque parte, & duo brachia superio-

ra transiendo super aures ligentur in fronte; alia duo inferiora, transiendo axillas ligentur in pectoralia vero duo media ligentur per medium colli. *Prognostica* seu iudicia habentur ex eodem Rogerio. Quod si neruus vel ligamentum incidatur in collo, rarum est, vt in posterum collum habeat liberum. Quod si vulnus veniat vsq; quo exit nucha, mortale & incurabile iudicatur. Nam passionēs nuchæ similes sunt cerebri. Si autē non perueniat ad medullam, sciet sit curabile, timendum est propter lationem neruorum onētium ab illa parte nuchæ, de iocumento sensus & motus neruorū & membrorum, ad quæ delegatur nerui. Et ideo vulnera, quæ pertingunt ad neruos reuerſus, perpetuū generant rauicū dīnē & (vt *Galen.*) vocis ablationem, & si pertingunt ad quendam neruum, qui transit iuxta aures, dicitur, quod numquam generabit homo. De incisione cuiusdam venæ Ipermatice est impossitura, vt a *Galdano in Anacoma* fuit demonstratum. Interim vulnera venarum & artiarum crassiorum sunt periculosa, ob hæmorrhagiam spiritu cito exhalante & vita. Iam quoque dictum est prius quod vulnus meri, gula, seu œsophagi & trachi arteriæ sunt periculosa, quia habet munus seu officium vitæ immediate necessarium; & ad hoc sunt difficilis cōsolidationis, quia sunt transiūs aeris & cibi. *Curatio* autem ipsorum, quantum ad vulnus carnis, nihil habet propriū: suantur, & cum pul. & vino, & aliis auxiliis curantur: & quantum ad neruā & chordas, etiam suantur profunde, & cum oleo *verruum*, & emplastro curentur: quantum ad venas & arterias gr̃as suantur, & cum pul. *Galen.* & pul. *lepori* cum *alhumine* seu emplastrum adhibeatur: & si illud non sufficit, excoriantur *capra venarum*, & ligentur vt superius de fluxu sanguinis fuit dictum: quantum ad vias aeris & cibi, suantur, & cum puluere, & cum aliis auxiliis exterioris tractentur: interius *tragacanthum* aut *diaphanophytum*, lambendum datur: quantum ad nucham, infundatur vulnus cum *acetos. calido* & desuper ponatur in principio *ostellus ouis*, vtque quod dolor fuerit sedatus. Postquam autem fecerit saniem, mundificetur & incarnetur cum illo emplastro *Guilbelmi & Lanfranci*: *℞. melluris. colli & iij. farina bo. d. & β. cerebust. & ij. cera. resina ana 3 ij. thuris. mastice ana 3 j. myrris. sarcocolla. mummia ana 3 β. olei. mastice 3 ij. fiat emplastrū.* De vulnere reiar organice in gula vide Theodori. *lib. 2. cap. 13. & Galien. lib. 2. cap. 5.* de vulnere in collo cum ense vel sagitta, & de vulnere in gula, *De vulneri.* etiam cum ense vel sagitta. *cap. 7.* At nunc de vulneribus omoplatarum & brachiorum, iuxta Guidonem, hæc addamus. Vulnera istorum membrorum nihil habent propriū, nisi *prognostica*, & *ligaturam*, & *sutura*, & sunt quandoque in carne, quandoq; in ossibus. Vulnera igitur spatalium, propter neruos, qui descendunt ad brachia, sunt suspensa de dolore & amissione sensus & motus brachiorū. Propterea & vulnera placentur cubiti (quod ū præter hoc quod nunc

Prognostica. posuimus exemplum in hac obseruatione, etiam alia posuimus *obs. for. 17. & 19.* sunt metuenda, propter venas magnas & crassas, quia magnā faciunt hæmorrhagiam, ut *obs. 19. possimum ostendimus.* Præterea vulnera cubiti & omnium iuncturarum sunt suspecta, ob dolorem quem inferre solēt, & inflammationem seu apostematationem & indurationem seu spasmū particulare, ob infiltrationem ossis & ligamentorum, & propter loci sitū, quis in loco interiore, & ideo non bene repurgentur, & ita materia, quæ includitur, remanet, & induratur, & motus perditur iuncturarum. De iudicio vulneris prope duos vel tres digitos circa iuncturam, dictum est. *Cura* ipso- rum parum differt a communi curatione dicta, nisi quod futura vulnus humeri, indiget fortitudine, & prope cum cauilis, propter magnitudinem, & pondus brachii. Et *ligatura* humeri fit cum fasciā duorum capitum, & ponendo sphæram ex stappis sub axilla, incipitur per medium fasciæ ibidem, & ascendendo, fasciam supra humerum voluendo instar crucis supra vulnus ligetur; aut siatur sub altera axilla, & toties sic reuoluatur, quoad sufficere videatur. Quæ vero ligatura duntaxat adhibetur ad tenendum medicamina, fit ad modum manicæ, cum duabus vittis ligando sub axilla. Et in vulncribus brachiorum, oportet vt brachium cum mantili teneatur in pectore suspensum ad collum; excepto, quod in vulnere cubiti oportet vt brachiū sinuatur secundum rectum, vt non disrumpatur vulnus, ligaturæ & sustentacula digitorum & totius manus fiant secundum ingeniosum arbitrium ipsius operantis. De mollificatione & duritie remanentibus in membris post curationem vulnerum istorum membrorum, ex propriis locis sumenda quæ de *paralyfi, mollificatione, & scirr- 235*

235 vbe diximus. De vulnere quoque adiutori plura dicuntur a Guilhelmo Saliceto, *lib. 2. cap. 9.* & de vulnere in humero & spatulis cum ense vel sagitta *cap. 2.* & de vulnere cubiti ense inflicto vel sagitta, *cap. 10.* & de vulnere in raleta manus facto ense vel sagitta, *cap. 11.* ad quæ loca citata, si libet, accede. Sed & nos antea *obs. 11.* huius libri exemplum posuimus de vulnere penes raletam manus secundo transuersum inflicto, & *obs. 12.* de altero quodam in raleta manus globotormentario icto & vulnerato, & *obs. 17.* de quodam vulnerato in cubito brachii sinistri, vt totū os cum suis neruis incisum esset, deinde metus ob dolorem de spasmō, & *obs. 37.* de vulnere in manu per transuersum facto cum ense, tendonibus tum neruis transcisiss. Nunc igitur ad vulnera thoracis veniamus, quorum etiam præter id exemplum, quod oune posuimus obs. præcedente, antea plura alia dedimus, quemadmodum videre poteris, *obs. for. 14.* huius libri, & *15.* & *obs. for. 3.* de pulmone vulnerato. Nihilominus tamen antequam curationem vulnerum thoracis, & partium eius explicemus, sequentem historiam adhuc addamus.

De vulnere thoracis transiente in pulmone. in quo fuit prædictione ipse vulneratus obiit.

RESTICTVS inuenis, filius Iohannis Sautis, habitans prope Schagiam pagum, trib. miliari- bus ab vrbe Alemaria. patria mea, distans; iu- uenis inquam aut adolefens aduolitor, floridæ ætatis, annorum octodecim, anno 1549. mense Septembri vulneratus fuit in parte anteriori i- pſius thoracis, vulnere ad interiora penetrante. Vulneri autē medebatur M. Lindolpus ibidem chirurgus. Ad hanc & ipse quoque accitus, eum eundem reperissem validi tussis ac continua affe- ctum, cum & maxima anhelitus difficultas adesse- let, & vt chirurgus ipse fatebatur sanguis spu- mosus ex vulnere fluxerat, illico nobis suspicio- nem hæc præbuere, pulmōnem ex ipsa doctrī- na Galeni, *l. de loc. affect. & cap. 10. lib. 3. tract. 1.* *236* de vulneribus thoracis, ex Guidone (vt mox in Scho- lus latius dicemus) vulneratum esse. tum magis hoc palam factum est me præfente: nam cum ebururgus turandam seu tentam & vulnere tra- xisset, imperaui assistantibus vt binæ vel tres can- delæ accense vulneri ad mouerentur, ore tū na- ribus ipsius vulnerati compressis, & anhelitu sup- presso, eo modo statum spiritus vehementior erumpens ex vulnere, omnes candelas extin- xit. & quia aderat dolor etiam in lateribus, cum tussi continua, & anhelitus difficultate, patri vulnerati, tum amicis scorum assaotibus, vulnus lethale esse pronunciaui: interim tamen si no- stram opem desiderarent, ad conferendam vi- tam ipsam ad tempus, diligentiam nos adhibi- turos. Hic homines rudes ac mere rustici alteri medico, sed empirico tantum, mira apud ægrum instanti (quis tantis temporis Alemariam venerat, mere circumsortemus) fidem habere. Interim ego, habito prognostico, quod æger moreretur, monacham amicos eius qui, vulnus infil- xerat, præstantius esse vt cum Domio Scbagē- si & vulnere inflicto concordiam inirent, tem- pellinius, antequam æger succumberet: & ita e- quum ascendens, domum repeti. Ille vero Lu- dolpho etiam relicto, cum empirico postū inie- runt: qui cum sanitatem pollicitus esset, potio- ne eius vulneraria vix assumta a vulnerato, deinde post horam subito extinctus est, empirico ne- bulone cum maxima confusione scilicet clam sub- ducente. At nos nostra prædictione magis, ad- rudes & imperitos innotuimus: quibus ego præ- stantius esse dixeram, vt eiusmodi nebulosius noo amplius fidem haberet.

S C H O L I A.

DE vulnere thoracis, Guido summo opere mi- ratum, parum, quantum ad membra conti- nentia, tum Galenum tum Halyabbatem, tum Auicennam tractasse, quantum vero ad conten- ta, plurima dixisse. Alios quoque, *inguit*, qui post illos scripsere, scis inuenimus discordes. Nam Rogerius, Rolandus, Imerius, Brunus, Guil- helmus & Lanfrancus, videntur velle scilicet in- pen- *De vulnere thoracis & partium eius.* *237*

penetrantibus, ea nullo modo stringenda aut claudenda esse, ne teineatur sanguis in profunditate eius, sed voluit, vt teneantur aperta cum linicis, & tentis, & mundificentur ex vnguentis & emplastris & lauantis attractibus. Et causam dicunt, quia, inquietos, si materia intra retineretur, recurretes ad cer. & ad alia particularia, & interficeretur infirmus. Theodorici vero & Henrici inibent, vt hæc vulnera omnino claudantur, & nullo modo permittunt imponi tentam, sed suturata opus esse aiunt, si vlnus pateat. Et quod ad confortandum naturam, inibent dati pigmentum cum pul. quod in vulneribus capitis date confueuerunt. Rationem adducunt, quod, nisi cississimum clauderetur, calor vitæ per prædella vulnera exhalaret. & frigidas aeris confunderet ipsum, subintraret. Nos vero excusando Galenum & eius leuantes, & concordando discordes in hac curatione, dicemus illud, quantum præsens negotium exposulat, quod cuidoenter apparet, a substantia res incipientes. Vulnera thoracica a parte anteriori quam a altis partibus, quandoque sunt extrinseca, & non penetrantia. quãdoque vero penetrantia intra spaciositatem, & quæ penetrant, quandoque sunt simplicia absque valvæ mētorum contentorum, quandoque membra, vt cor, pulmo, diaphragma, sunt vulnerata. Iam & in vtriusq. modo plus sanguinis ad interna fluxit, modo parum aut nihil. Et hæc sunt differentie a quibus fiuntur in talib. vulneribus indicationes curationis. Causæ dictorum vulnerum, secundū quod dissimilis in sermone vniuersali de causis, sunt omnia illa, quæ apta nata sunt perforare & incidere, vt sagitta, telum, ensis & similia. Nunc ad signa & iudicia progrediamur. Galienus, method. cap. 7. ita inquit: Quæ autem sunt in pulmone, diffinitionis alius vulneribus curantur. Quædam tamen fuerunt, & non solum difficile posse curari, sed etiam incurabilia esse: quod affirmant cum ratione & experientia. Cum ratione, quoniam pulmo propter anhelitum eius, in motu semper existit: sed membrum cuius est curandū vniuersi oportet quiescere & non moueri. Cū experientia, quod nullus experimentatus sit aliqñ ab hoc passione emississe membra prædidi. Sed ego dico, certū nō posse fieri in experimentis: plura n. vidi subito nimia tussi cōmoueri, & hoc vel propter gutturalitatem, vel propter casum ab alto loco, aut propter percussione, qui rissendo sanguinem eiecerunt, aut serauerunt: quiddā vero ad modū vniuersi cor alio, alio duarum, & nonnulli plures: aliqui etiam velut doloris senserunt, alii vero in pectore dolorem habuerunt: hi tamen non subito, neq. multum sanguinem emiserunt, parum caloris habebant: & quib. appareret, sanguinem remota loca venisse. Sanguis vero sine dolore, subito & multum erupens, nimis ruberum & calidum habens, nobis ostendit se non a remotis locis descendisse. Hæc Galenus. Rondellectus vero cap. 21. de diffinita vniuersi, lib. de agnoscendo morbis, ita scribit: Vlnus in thorace per se videtur: verū si membrana sineq. cū castis lacerata, inuestigatū, quare candelæ vni vulneris oportet admodum. Quod si inspirando aerē reddas, candelæ, existim-

quat, perforari membrana esse necesse est, quod sit etiam vlnus. Si vlnus in pulmone, existit de magis, quā in superaddo. Quod si spiritus cruentus statim apparuerit spiritus in & spiritus dū. certe pulmone lacerat existit alius, cuius multum. Ita magis si vox periret, nisi cū spiritu reddiderat, & si inciderat in vlnum aer leuatur, & in alio partem obstruere. Hæc omnia aduocare oportet ad diffinitionem. Sic etiam Guido: Signum quod vlnus thoracis penetrat, est anhelitus per vlnum emissus, maxime quando ei & nix infirmus clauduntur, quæ per candelam incensam, aut per lavium seu cotinum, carponatum, posita iuxta vlnum, demonstrantur: non enim cū intro missus est ita securus probatur. Signa cordis vulnerati, sunt angustia exanimis (vt ait de signis vniuersi) subitū diffinitū ejus, nigredo, exitumorum frigiditas, sicciora superfluitas, syncope, & locus sub mammilla sinistra vulneratus. Signa pulmonis vulnerati pulmonis sunt, quod sanguis qui cxit, sit rubicundus & spumofus, & æger calefit, & tussit, & pallescit locus circa latera. Illud autem quod dicit Galenus de exendo multum & absque dolore, intelligitur per os in rupta vena. Signa diaphragmatis vulnerati sunt spissus & magnus anhelitus, tussis sonans & dolorosa, alienatio, spiritum linidum, sitis, cibi fastidium cum eructatione, rigor pungen, & locus iuxta falsas costas vulneratus. Signa quod sanguis descendi infra, & corumpatur, & in saniem conuertatur, iuxta aphipies Hippocrati Commento Galeni: ad ipsum venient sanguis effundatur propter naturam, necesse est perierit, sunt enim signa, granitas & pondus laterum iuxta falsas costas, & ipotum putridum cum tussi multa, & incipit febrile. His accedit (vt addit Inmerius) & anhelitus, qui exiit per os, & vlnus foret intolerabiliter & panni qui imponuntur sanguini coagulato & putrefacto, educuntur infecti: Iudicatur de istis vulneribus, quod illa, quæ penetrat a parte dorsii, sunt picullosiora quam a parte anteriori propter vinas & arterias & nervos & meri & tracheam arteriam, & ligamenta cordis, quæ huic parti magis vicina sunt, & cum hoc læsio nuchæ, quæ non exigua computatur. Iudicatur similiter & de istis vulneribus, quæ non penetrant, quod nō habent periculum. Alia iudicia tum causis tequirantur in sermone vniuersali. Quantum ad curationē at-

Signa vlni
breuia sunt.
cugentis co-
stis vlnus.
Signa vlni
in thorace
penetranti.
Cordis.

Signa vlni
in thorace
penetranti.
Cordis.

Signa quod
sanguis cor-
rumpatur, &
in saniem
mutatur.

Iudicia:

Curatio vlni
nervum non
penetranti
thoracis in-
ternum.

Causa

Signa & iudicia.

Quædam.

a 38

Rondellectus.

hic ratio vulneris & puris habenda, & postea ponitur tenta intincta cum *melle rosato*, & desuper mundificatur prædictum. Et ab illo tempore permittatur elandi & sanari vulnus antiquum. Hæc cura artificialis etiâ probatur Galen. *5. Therap. q. eandem* sequutus est Romæ in empyemate thoracis, ubi necessaria erat apertura, & os costæ putrefactum abscindendum erat, iniiciebat autem melicratu, cum *pylice* instrumento, quod pus attrahbat, ut simul quod reliduum esset ex melicrato educeretur. Vbi aut cognouerimus vlcus satis expurgatum, tunc a mundificationibus cessabimus, & vulnus ipsum claudemus. Idem probatur & Avicenna *3. canone de empyemate*, sic scribente: *Quando autem affirmaveris in pleurisi materiam plus inesse, & non mundificatam in 40. diebus neque in punctionibus, tunc expectanda sit pleuresis, tunc necessarium, est cauterium fieri cum cauterio minuto, quo perficiatur pectus in loco sanies, ut exsiccetur materia, & extrahatur paulatim, & abluatur cum aqua mellis, & adinvenitur ad extractionem ad exteriora: cumque mundificata fuerit, permittitur ad consolidationem.* Et ipse Halyabbas suspectam habuit incisionem; & cauterium eligebat, ne in fistulam transiret incurabilem vlcus. Propterea semper prognosticis te munias, si ad tale opus accedas. Hæc dicta sufficiunt de vulneribus pectoris reliqua vide apud Theodoricum *lib. 2. cap. 16. de vulneribus thoracis & pectoris ante vulnere factis, & cap. 17. in quo agit de vulnere dorsi a sagitta, penetrante vsque ad stomachum* *lib. 2. cap. 12. de vulnere penetrante vel non penetrante pectus, facto ense vel sagitta.* Pugione infixit miles (*ut refert Amatus Centuria 2. curat. 85.*) milici ad humerum prope fureulam: ad quem curandum advenit chirurgus: qui cum pugionem extraheret, & sanguinem concretum videret, ac vulnus pectoris concavitatē attigisse contemplantur, incisionē inter tertiam & quartam costam machinatus est, & doctē faciem sanguis admodū concretus, per eam tandem de novo factam incisionē foras fuit extractus, & æger intra quadraginta dies sanitati restitutus fuit. Habes & aliâ historiam apud eundem Amatum, *centur. 1. curat. 66. de vulnere quodam inflicto in quinta costa.* Parisius (*inquit*) miles Cornelii ense perfoctus fuit: per transversum vulnere inflicto, in pectore, ita ut quinta costam dextram, a spiribus computando, vulnus occupaverit, quod in sinistra quoque ex directo respondebat. Huic singulis ilico ex basilica extractus fuit: & sequenti die illi bolus castis propinquatus: ac sic nullū sensit superveniens symptoma. Nec n. tulsiuit, nec in febre incidit, quæ duo signa attestantur, nullum internum vitæ præcipuum lazum fuisse, per verumque enim vulneris os linamentum digitalis longitudinis & crassitudinis cū debitis & necessariis medicamentis immixtebatur. Nam cū locus nervis interceptus sit, medicamentis illius receptum habentibus uti necesseum erat. Proinde digesti no dicto medicamento & crocus & lumbicorū oleum veluti & hypericōis ex abietino

impositū miscebatur. Fuit autē hic sanitati restitutus intra paucos dies, & a chirurgo Petro Camerino optime curatus. Hinc adiungē & hâc historiam eiusdem Amati Lustiani *Centur. 4. curat. 37. de vulnere inter costas mendosas illato.* Filius Rocci, natus annos 11. a puero inter mendosas costas gladiolo vulneratus fuit, ad quem vocatus cum essem, per chirurgū præsentem tentatum specillo vulnus fuit, quod lōge penetrabat: tunc turunda albo oui excepta intromissa est, & desuper applicitæ stuppæ eodem albo oui intinctæ: in cuius circuitu oxycrato imbutus pannus lineus admonebatur; sed tunc illi basilica lateris eiusdem secta fuit, & sanguis ad 3 iiii. extractus. Porro sequentibus diebus curato, ut decebat, vulnere, multum puris ex eo fluxebat: & plus quam pro vulneris ratione decebat; quæ de causâ vulneris ipsius oram secundum costarum in celsum digiti longitudine aperiri feci; unde vulnus penetrans non esse confiximus: & tunc puris fluxus cessavit, adeo, ut brevi vulnus cicatrice obductum fuerit, & puer a tanto malo liber ac immunis evaserit. Eliberat autem antea puer ex manna pharmaco. Sed nos denno, eo unde digesti sumus, reuertamur.

OBSERVATIO XLVIII.

245

De vulnere cum ense factis, penetrante ventriculi om. lethali.

VIR ille qui ad nosocomium vulneratus delatus est, cum vulnus ense illatum accepisset in parte circa ventriculū, & deolatum id vulnus fuit, ut stomachus ex vulnere propederet. Theodorus eius Nosocomii Delphensis chirurgus, cum digitum in vulnus immitteret, scilicet odorē cervicis, & cum digito exiraxit fragmenta panis nondum cocta. Suto autem vulnere ventriculū propendentem reposuit. Sed hic vitam ad viginti quatuor horas fere protrahens, mortuus est, uti chirurgus mihi narrauit eodem tempore cum hæc scriberem, anno scilicet 1570. 13. die Octobris, cum pridie vulneratus æger vitam finivisset. Huic poteris & illud exemplum annexere, quod observatione quarta de vulnere ventriculi quoque lethifero in hoc libro annotavimus, de cenopola vulnerato.

SCHOLIA.

VR vulnera effatu digna, tū ventriculi dissectiones sint lethalia, *ut huius libri, scilicet in Scholio ipso, diximus.* Ceterum, ut refert Guilhelmus de Salyceto *lib. 2. cap. 14.* si locus iste vulneretur quocunque modo & quouis instrumento, si non penetret vulnus, non est dubium quin possit curari, modo medici errore ad apostema vel inflammationem aut alia accidentia non perveniat, nec ipse æger delinquat. Quod si sagitta inflicta sit vulnus, maxime in parte interiore & regione ipsius stomachi, cum locus iste careat ossis, facile extrahitur, iis observatis quæ de extractione dicta sunt. Ea, quæ extraxit, subito implatur locus cū teta vel stuppis aut linamentis decantib. involutus in olco rosaceo, vitello oui & croco, pro primo apparatu, vsque ad duos dies;

Guilhelmus de Salyceto, de 2. hunc, de vulnere penetrante vel non penetrante in ore stomachi inflicto, esse vel sagitta.

445

vel circa, donec sanies apparere incipiat; & hoc, nisi fluxus sanguinis impediatur, alioqui & huic resistendum, ut *proprio loco diximus*. Circa locum vulneratum roborans defensivum ex *holo arm. al. ros. myrris, aceto* & *cruco* mistis, aut *succo silani, portulacae, plantag. ros.* aut *eorundem aquis*, si succi haberi non possint. Vulneri vero *fuldella stappata*, infusa prius in vino nigro slyptico, & expressa, deinde inuoluta in dicto medicamine, ex *vinello ros. olo ros.* & *cruco* apponantur; vel forte in dicto defensiuo, loco affecto optime ligato. Postea intra tum supra vulnus mundificativum aliquod pone ex supradictis, ad tempus incarnandi & consolidandi. Si vero non penetrat, fueritque vulnus longum, latum & amplum, ita ut futura indigeat, coniunge partes, & dimitte extremum vulneris declivae apertum, ut sania commodius expurgetur; & super futura ponatur pulvis conservativus saepius dictus, & circa vulnus defensivum vteatur. Vulneri vero, tū eius labris mundificativum imponatur. Deinde incarnetur tempore consueti, eo tempore nō omitto lotione vulneris cum vino decocti *galliarū, nucis cyperi, cornu granat.* & similibus cū vino slyptico solo calido. De phlebotomia, ventris lenitione, scarificatione, victu, tum aliis, ita agendum, ut sermone vniuersali dictum est, quod & de omnibus vulneribus iam supradictis intelligi volumus. Si vulnus vsque ad substantiam stomachi penetrauerit, ex tracta sagitta, si inhaereat, procede cum anodynis, *vinello ros. croco* & *oleo ros.* & defensiuo ex *hol. arm. myrris, oleo ros. aceto, croco*, adiectis aromaticis slypticis, ut *spica, muskiche*; vsque ad doloris sedationem, aut siniei generationem, deinde cum mundificativum incarnatiuum superius dicto. Sed intra vulnus tentam non ponas, ne ad os stomachi penetrat, aut eius substantiam, sed tantummodo ipsam liniam mundificatiuum pone penetrantem tantum vsque ad superficiem vulneris, & non ultra, ne ob dolorem & sensibilitatem ipsius oris ventriculi (*quia pariter natus est*) syncope subsequatur, & idcirco non congreget multam saniem. Quare tua intentio erit potissimum incarnare post 3. vel xv. dies (*forte post vi. aut vii. j.*) quia non indiget: forti vel longa mundificatione. Nam ex incarnatione talis, natura incipit locum nerosum conglutinare, mediantē poro farcoide & ligamento: & i- s- l- modo tractetur vulnus, si curationem recipere potest. Dum fit incarnatio, bibat aquam decoctam in *muskiche, tragacanth. gummi arab. myrris*, si potest, aut vinum nigrum slypticum, cum dicta aqua aut alia lymphatum; caute in hyeme, frigide inestate. Hic potius incarnat & roborat stomachum, sed caute a vino vsq. ad vi. vel vii. diem, si febris non auit. Interim diligenter animaduerte numquid post extraktionem sagittae, ensis aut alterius rei penetrantis ex stomacho eiecerit vulneratus sanguinem cum spūto & vomitu, signum est vulnus ad interna stomachi penetrasse; & tunc iudica vulnus mortale esse, propter consensum cum cerebro, dolore, & spūmo, ob substantiam nervosam non recipientem consolidati-

tionem, & quia vētriculi munus toti corpori necessarium destruitur, sine quo stare vita non potest. Si autem non venerit vulnus vsque ad medium oris stomachi vel ventriculi, vel interna non penetrauerit, quod scies, quia per spatium cum salua non emittat sanguinem, nec cum vomitu, tunc certe minoris periculi & lenioris curationis existit. *Cura* ergo vtdictum est de vulnere penetrante, euitando ne tenta frangat os ventriculi vel ventriculum ipsum, imo non penetret nisi carnem & pellem super ore stomachi, vsque ad ipsum os, aliquo modo non tangendo, ob causam dictam, & incarnetur hic locus tam velociter quam poteris, quia hoc melius ac vtilius est: nam & vidi quendam (*inquī idem Guibelmus de Salerno*) Pedemontanum quendam vulneratum in illo loco cum lagitta magna, penetrante ad posteriora, qui (*ut mihi puer residerant*) solius vini ablutione assidua curatus fuit, & postea diu vixit. Sed ego eum non curavi, quamvis credibile est, nec negandum stante in vita regimine naturali. Huc quoque spectant vulnera alia ipsius ventris, tum partium eius, quorum multa exempla alias posuimus, & potissimum egregium illud exemplum de vulnere abdominis, per quod omentum elapsum erat, & ab imperito chirurgo abscissum; & tamen is praeter spem a nobis curatus fuit, cuius historiam posuimus lib. 21. obs. 6. & curat. medic. nostrorum obs. 3. in cuius Schollis plurima de huiusmodi vulneribus diximus. Cui & adiungere poteris & illud exemplum, quod retulimus in lib. obs. 6. de vulneribus ventris ad interiora penetrantibus. Ceterum quod ad praesens negotium attinet, cum in ventre sint duae partes, ut ex anatomia constat, continentes videlicet & contentae, ita & vulnera quandoque sunt in parte continente, quandoque in contentis. Vulnera ergo ventris quandoque sunt extra, non penetrantia ad interiora, quandoque vero ad interiora penetrant: & quae penetrant ad interiora, quandoque sunt talia, quod nihil procidit de membris interioribus, quandoque vero elabatur & procidit aerbus seu omentum, aut intestina, aut quadam alia. Quae vero sunt in membris contentis, quandoque quidem sunt in aëro, quandoque in intestinis, quandoque in stomacho, & sic consequenter, nam possunt & fieri in hepate, hene, renibus, vicia, & vtero, de quibus etiam diximus antea cum de vniuersali indicio vulnerum aperimus, & etiam horum exempla posuimus, vicienis, hepatis & renis. Et haec potissimum supradictae sunt differentiae, a quibus sumuntur indicia. *Causae* istorum vulnerum sunt, ut a lioribus, nempe ensis, lancea, sagitta & ceteris mensuris aut incisuris (*ut apud nostras rusticis, habuerat & nebulosa sine fieri assolis*) & omne illud quod aptum natum est incidere, & perforare. Signum quod vulnus ventris non penetrat, habetur per visum & probam, & quando inde nihil exit. Signum autem quod penetrat, habetur ex proba, cum intrat profunde, & quando exit aëris seu omentum, intestinum, aut aliquod membrum. Signum quod extra procidit aerbus, & est altera-

De vulneribus ventris & partium eius.

247
Zorbus, id est quod contentum.

Causa.

Signa & indicia

246
Signa laboriosa in vulneribus stomachi penetrantibus.

tus, quia videtur substantia eius seposita (*ut dicit Guido tract. 3. delect. 2. de vul. cap. 6. de vulneribus ventris & partium eius*) & venis repleta, & videtur liuidum & nigrum. *Signum* quod intestina sunt vulnerata, est exitus stercoris per ipsa. *Signum* subitium vel crassum, ex loco affecto etiam innotebit. Nam supra umbilicum sunt subtilia, subius vero crassa. *Signum* vero quod stomachus est vulneratus, est exitus chyli ab ipso, & locus a parte anteriori circa mucronatam cartilagine. Hepatis autem, locus dexter, & exitus sanguinis. Splenis, exitus feculentitæ, & locus sinister. Renum, exitus sanguinis aquosi, & regio ipsorum. Iudicatur a Galeno *6. Therap. periculosa* sic ac difficiliora vulnera & sutiones circa medium ventris, quam circa latera, eo quod illæ partes propter musculos sunt tractabiliores, & intestinorum educibiliores, quam reliquæ. Iudicatur etiam, quod nisi cito reducuntur, intestina inflantur, ventosantur ab aeris frigideitate, & postea cum difficultate reducuntur. Sic & Hippocrates *secundo Aphorismorum*, nisi cito occurratur egressioni cæcoplo siue omenti, id est, zybi, citissime aliteratur & corrumpitur: quare & incidunt ex eo quod denudatum est & alteratum, vel inurant. At medici dicunt id quidem verum esse ut plurimum, non semper, *ut Galenus in Commento annotat*, refert *& Gal. 6. Therap. crassiora intestina sanabilia esse, difficilia vero subtilia, & omnino icinium insanabile esse, ob multitudinem*

⁴⁴⁸ & magnitudinem vasorum, & subtilitatem, & nervositatem tunicarum. deinde quod bilem synecram hoc intestinum fulcipiat, & hepatis propinquius sit ceteris. *Præterea inferiora stomachi oportet aggredi, neque curationem omnino abdicere, quum medicamenta in loco eo adhærere possint. at in ore ventriculi in transitu solo patientes tangit partes: & cum hoc, ut paulo ante diximus, sensibilitas ipsius curationi repugnat, reliqua vero iudicia, signa ac causæ, dicta sunt in sermone vniuersali. Quod ad curationem attinet, Vulnera ventris quæ interiora non penetrant, nihil habent proprium nisi ligaturam superius in pectore dictam. curantur enim ut vulnera carnosa, cum futura, & indigent aliis auxiliis incarnatiuis. Illa autem quæ penetrant, a quibus nihil membrorum procidit, neque aliquod ipsorum fuerit vulneratum, eodem modo curantur, nisi quod futuram habent propriam. Hæc autem a diversis diuersimode præscribitur. quidam, ut præcipit*

Curatio.

Esutura ventris.

Abirach id quod abhimen.

ritonorum: & regrediendo per alterum labium, dimittat siphac & penetret mirach, & exterius fiat nodus. Et ita per alia puncta procedatur quousque totum sit futurum sufficiens. Alium autem modum assignat Galenus & Albucasis, cum afflmit, & est communis modus leuior, sed non securior: & est quod omnes quatuor margines duorum labiorum insimul suauiter cum vno puncto & nodo, & sicut tot puncta quot erunt necessaria. *Tertium* modum ponit Albucasis idem, cum acubus pungendo, *ut dicitur esse*: & dimittendo acus, voluitur filum super eas, ut faciunt mulieres in manicis, secunda quod fuit dictum superius de futura, sermone communis ad quam recurre pro hac futura. *Quartus* modus est Lanfranci & eam fuisse epist. Henrici 1: & est quod figatur acus cum filo a parte exteriori in vno labio, & perforetur totum mirach & siphac, deinde a parte interna in altero labio, veniendo extra, perforetur etiam siphac & mirach. Deinde per spatium minoris digiti a primo puncto, eadem acu, cum eodem filo non incilo nec uodato, facias secundum punctum ita: & in labio quod fuit vicino perforatum figatur acus ab exteriori ad interiora: deinde in altero labio figatur alius intra ad extra siphac & mirach semper comprehendendo: & tunc prope acum inuenies catremitem filii, quam prius exteras dimisisti, tunc necentur duo capita filii simul in duobus punctis, & fiet vnicus nodus in latere, quia sic nunquam transibit filum supra labia vulneris, sed in lateribus solum apparet. Facta futura ponantur alia auxilia, & ligetur vulnus. *Ligatura*

Siphac, seu personæ.

²⁴⁹

eadem fiat quæ de pectore dicta est. Hic non conueniens ratio quæ de pectore dicta fuit, nempe in vulnere vêtis penetrante, in quo particula interiora vulnerantur & non exiunt. Si vulnus ventris est sufficiens, aut non sufficiens, id cum instrumento proprio, quod dicitur postea, ampliatur caute, & extrahatur, & si futura indigent, quæ eis utilis erit, velut est fundus stomachi & crassa intestina, suantur futura pellionum, & non cum capitiibus fornicarum, quam posuerunt quidam caperimentatores, teste Albucasi. Nam tardiosa est & inutilis, ut experientia constat. Nonnulli autem, *Rogerus. Lemarius, Theodoricus*, infra necentur ad custodiendum ne feces putrefaciant futuram, imponunt cannulam sambuci. Alii vero, *ut Guillelmus nar-*

Ligatura.

De vulnere ventris penetrante, in quo particula interiora vulnerantur, & non exiunt.

rat, ponunt partem intestini alius animalis, aut partem tracheæ arteriæ, ut dicunt quatuor magistri, quod Guidoni non videtur rationabile, eo quod natura intenta ad alienorum expulsiorem, capellit, & remouet illa de futura, & ita perit finis pro quo talia applicantur, & pro meo iudicio (inquit Guido) melius est, ut suto intestino, ut dictum est, & ipso a sordibus mundato, ponatur super futuram pulvis conseruatiuis futurarum, & reducatur intra ventrem per modum qui dicitur. Si vero zirbus ceciderit, & denigratus & corruptus fuerit, laqueo, *ut dicit Galenus*, comprehendantur partes denigratæ, & abscindatur pars quæ post laqueum in inferiori

Vide Theodoricum de vulnere ventris, cap. 18. & de vulnere intestini c. 19.

Si zirbus ceciderit.

sine fuitiois ventris, dimittendo capiti laquei extra, ut possit exire vulnere suspirato. Postea futura, vel in Zirbo ligatur infra ventrem, reducatur, ut dicetur: & incontinenti vulnus ventris, ut dictum est, fissatur, & nullo modo apertum teneatur vsque ad membrorum interiorum sanationem, ut præcipiebat Iamcrius & Rogerius.

250 Et in hoc sequutus est eos Lanfrancus. Ex ratio est, quia nihil magis offendit membra interiora & calorem naturalem, quam contactus aeris a natura non alterati. Ex hoc enim incurrunt illi Judæi accidens perniciosum de dolore, & torsionibus intestinorum, ex quibus subsequi potest spasmus, & deinde mors: & præterea, vulnus apertum, quod necessario fuit magnam ad operationem, præparat intestina coniungere ad exitu, quod est insigne nocumentum & periculosum. Et talis sit apparatus exterior. Intra vero dentur ea quæ dicit Auicenna, vt centaurea, terra sigillatim alia dicta de vul. inti infecis pectoris, & caudæ quina, quæ & Galeno probatur vniæ ad vesicæ & intestinorum vulnera. 6. de simplicibus, enmata quoque cum vino aulero, vt 6. Therap. præcipit. Et dixit per septem dies sit tenuis, & talis quæ non procreet feces neque superfluitates putrefactiuas, sed potius consolidantes. Hinc quatuor illi Doctores hoc puluerem commendant: & sic.

For fur tritumum, & ponatur per horam in aqua calida, & præstantior est puluul: deinde coletur & addatur pul. amyli, tragacanthæ, gummi arab. sang. de ac. consolat. mazarin, poluonum leporis, singulis diebus ter vel quater exhibeatur, & si virtus est de bilis, in qua gallina, in quo ponatur gummi tragacanthæ, quæ saporem horribilem non incurrunt. Guilhelmus quoque commendat aquam decoct. thuris & myrtibis in hoc casu. In vulnere ventris penetrante, a quo procedunt intestina, aut alia particula non vulnerat, aut vulnerat, sicut vel ligata, vt d. Huius est, Galeno & Auicenna quatuor sunt intentiones. Primo, ut in proprium locum reponatur: secundo, ut vulnus fissatur: tertio, ut phararmacum apponatur: quarto, prouidendum ut non patiaris quis interiorum tumorem, neq; dolore. Prima intentio complur, si vulnus est satis magnum, ut naribus suauiter pressis introducantur, aut per brachia & pedes eleuando concutiantur, & sic, vt dixit Rogerius, reducuntur. Si hoc modo non possit introduci, vel quia inflata sunt, vel vulnus nimis strictum & angustum est, tunc oportet aut ventositatem, teste Galeno, resolueri vel expellere, aut vulnus manus efficere. Præstat autem prius fovei vel, spongiam mollem in aquam calidam ponendo, & cum ea intestina caleficeret: & ita præparata cum vino hyppico, ad roborationem, fouere. Alii, vt Rogerius & Theodericus, domesticam aut cortialia animalia per medium incisâ, quanto calidius possunt, intestino applicant, idque toties quoque sint calefacta, & ventositas resoluta, vt regredi possint.

251 Halyabbas autem præcipit, vt per exarmitates in balneo suspendatur vulneratus, & concutatur, aut intestina cum oleo vniuerso vel acurgeta porci

calida, ut dicit Iamcrius, inungantur, & ita regrediantur intestina. Si utq; his inueter, & remaneat intestinum inflatum, præcipit Galeus, tum reliqui, ut ampliato vulnere ventris tandem id quod protruderit reducatur. Tales incisiones sunt per sphingotomata bicipitia curia & obtusa, retro, & secundum finem, & non acuta, quorum formam describit Albucasis. Figura vero idonea laborant versus inferius quidem dorsum, supra dorsum vero in vulneratum locum, vna vero sit in vtroq; intentio, vt non grauetur ab aliis intestinis id quod procidit. Secunda vero intentio est, quod per idoneum minimum extrorsum cum manibus pellendo comprimebatur tota plaga, & discopendo succedat certitudinaliter (sic enim ait Galenus) per medium totum vulnus fissatur. Qualis autem esse debeat modus fuitiois ventris, dictum est superius. Tertia perficitur secundum Galenum cum pharmacis sanguinolentis nominatis, quæ & in aliis partibus consolidare vulnera per præcedentia monstrauimus & supra, quales est pul. futuræ non ronsuatiuus, & suppa cum vino, & emplastra & alia auxilia incarnatiua. Ligatio vero exterior in his est magis necessaria, quam ligaturam diximus ex pectore debere fuisse. Quarta vero pars ematationis non modicum ab ea quæ aliorum est, differt. Oportet enim oleo calido commensurare linam mollem, & infundere totam in circuitu, & comprehendere quod est inter bubones & axillas. Melius autem est per clysterem immittere in intestina aliud tale. Auicenna vero 3. cau. de curia huius affecus per iussione, ita inquit: Et fortasse incisionem succedant dolor & purulenta, quare oportet ut admissa sit affecio venter, etiam cum super purulenta am & locum in iussione, & ponatur emplastrum ex fenugrec, sem. lini, alibæ, & juncinis. A vniuerso, vt Hæricus, & tunc modis torsiones pungentes & perforantes intolerabiles sequi videntur cum Sale bulliunt, quibus addunt sulfuris tantum ut inspissetur, & ponunt in faculo qui omnes partes dolorosas comprehendat, calidumque quantum tolerare possunt superat, & onunt deinde & ligaturam applicant: & cum inspigidatur, alii apponunt, idque toties renouando, donec torsiones & dolores sedentur. De materia, si quæ remaneret infra ventris spatio sita, quæ non possit exire propter futuram, non est multum curandum: quia non potest esse multa, cum particula illæ non sint multum sanguinolenta, & ut dixit Guilhelmus, natura eam resoluat, aut ad inguina delatabit, & ibi curatur vel alia apostematata seu abscessus, ut in hoc loco curari consueverunt. De vniuerso quæ sunt in dorso, eodem modo curentur, ut dictum fuit de spondylibus & nucha superius in collo. De vniuerso hepatis, sicut, remouenda, si substantia eorum sit læsa, dicit Lanfrancus 1702. 2. cap. 8. cum sint insanabilia, virum medicus accitus curationem tentare debeat, necne: dicit, si fuerit infusum met patria, & optima fama, & habeatur apud omnes expertus, prognostico præmissis curationem suscipiet, prius tamen agito de omnibus suis rebus

De vulneribus qua sunt in dorso & rebus vniuersis. De vulneribus hepatis, hanc, remouenda, si substantia eorum sit læsa, dicit Lanfrancus 1702. 2. cap. 8. cum sint insanabilia, virum medicus accitus curationem tentare debeat, necne: dicit, si fuerit infusum met patria, & optima fama, & habeatur apud omnes expertus, prognostico præmissis curationem suscipiet, prius tamen agito de omnibus suis rebus

Lanfrancus 1702. 2. cap. 17. de vul. ventris me. et, Theodericus, in iussione, & vniuerso.

Guilhelmus de Saliceto lib. 2. cap. 15. de vulnere ventris & intestinum.

ribus tanquam morituro disponēte. Sed si fuerit medicus in aliena regione, præstat vt tales non suscipiat curandos, ne incurrat ignominiam. Id ipsum & capite 9. de vulneribus virga, resiliatorum & vera, dicit, quod in locis istis omnia vulnera sunt valde verenda, ob eorum subtilem compositionem & eorum nobilem actionem & necessarium. Vide autem apud Guillelmum de Saliceto egriam historiam de quodam vulnerato in intestinis, & finato, lib. 2. cap. 15. de vulnere in vno.

Curatio vulneris hepatis. Idem dicit & in eodem capite sub finem. Si vero a vulnere huius loci exierit hepar secundum partem, & sit vulneratum in substantia intrinseca, & spissitudine eius, certe non recipiet curam; sed si circa aliquas minutas eius partes ac subtile foret factum vulnus aliquod exiguum, possit ager tunc liberari, vt ostendimus obf. 2. huius libri, de nepote Magistri Iustiniani Fantini vulnerato in hepate. In primo autem casu non curantur, tum propter fluxum superfluum sanguinis consequentem tale vulnus, tum propter necessitatem sue operationis & propter totum corpus, sed in secundo casu curari possunt. Ita & de henefticidum: quamvis eius vulnera non ita periculosa sint, vt hepatis, sed vbi particula tantum laxa sit exigua, curari potest, vt constat de milite illo in splene vulnerato, cuius historiam & curationem 5. obf. huius libri diximus. Statim ergo eum apparet hepar aut splen, intromittatur subito, quia vulnera ista non indigent operatione manuali, nisi reductione ad locum suum, & postea fiat futura siphac & carnis & pellis exteriorum simul, futura vnica, vt dixi, ita vt vulnera isturum membrorum delimitantur, & cōmittantur percuranda naturæ, aut mortalia iudicentur.

¶ 33 Et quum futuram feceris, superpone ei pulcrem cōseruationum supradictum, & circa vulnus defensiuū. Et super vulnere toto ponatur mundificatiuum & incarnatiuum sequens emplastrum: *℞. storis 3 j. mastich. sang. drac. mumia ana 3 j. mellis ros. colatæ 6. serebenth. 3 ij. farina bardes q. s.* ad inspissandum: fiat emplastrum. Post hæc ponantur incarnatiua sola & pura, & victus sit vt in vulneribus intestinorum, & in omnibus istis vulneribus ventris præ ceteris necessaria est ventris lenitio cum glandibus vel clysteribus. Si vulnus sit in inguine, vel ab ense, aut sagitta. Si a sagitta, emollis locū cum oleo rosæ gallinæ pingued. et o. co, & dilatando vulnus cum rasorio, si expedit, & extrahatur sagitta suauiter. Et si sit fluxus sanguinis, huic primo apparatus intende. Si non, procede cum mundificatiuo & doloris sedatiuo sapis dicto ex *verroli omi, oleo ros. croceæ*, vsque ad tres vel quatuor dies, donec saniem emitat, deinde mundifica, incarna, & consolida: & reliqua de phlebot. ventris lenitione, dicta, dictis de curatione communi vulnerum obliuato. Præterea hic duo animaduertenda: nempe, num vesica sit læsa, nec ne: deinde verum siphac sustinens intestina descendat ad bursam testium, & num sit fractum, aut non: nam si inguina aut virga aut testiculorum bursa fuerint vulnerata, aut aliqua

alia membra adiacentia, tunc considera virū vulnerata talia indignant cōducitua partium, an non: & si egeant, tunc condeuas partes secundum regulas assignatas apud eundem Guillelmum de Saliceto cap. de vulnere in collo, gula & alris. Si autem non indigeant ea, tunc cura locū & vulnus, mollificando, dolorem sedando, mundificando, incarnando & consolidando, vt supra diximus. Si tamen vulnus sit in virga virili, secundum Lamsancum loco superius citato, fiat in virga virili secundū membri longitudinem, aut secundum transversum, & tamen in modica quātitate, eum futuris & pulueribus, & cum magna cautela defensiuorum, phlebotomia, & in dicta tenui curam adhibere diligenter. Si vero virgam totaliter ex transuerso acciderit amputari, tunc vulnus esset maxime periculosum, propter ipsius venarū & artieriarum multitudinem, & nervorum: aliquando namque prius ager moritur, quam fluxus sanguinis resiliatur: tamen in hoc intendendo casu dolorem mitigare cum *oleo rosæ calido* inunctione circa pectinem & perineon: & eū cauterio candens ferri totum cauteriza vulnus, & sanguinis fluxus cōstringatur. Vulnera quoque sunt in testiculis, cito corrumpunt testiculos, vel auferunt omnino: quare licet homo ex talibus vulneribus raro sit in mortis periculo, si modo error in curando non fiat, tamen generatio per hoc amittitur, quæ propter cōseruationem necessaria est speciei. Cura tamen illorum locorum a curis aliorum vulnerum non differt. Matricis corpus si telo vel gladio acciderit vulnerari, vulnus esset omnino mortale. Sed si in collo eius vulnus fieri accideret, propter aliquam rem duram intrantem vulnerantem, bene curatur, dum est recens, eum vng. *Rhaf. alb. de cetufa*, distemperato cum succo arnoglossæ. Sed si vulnus ibi acciderit antiquū, tunc indiget mundificatione, cum iniectione ferri capriui, vel aquæ hordei, & cum iniectione medicaminis nominati. Si autem vesica (inquis Guillelmus loco citato) vulnerata vel læsa fuerit, quod scies per exitum vrinæ a vulnere, tunc insalubriter dicas vulnus lethale, tum propter nervosam substantiam vesicæ, & per consequens difficilem incarnationem, tum propter continuam vrinæ resistentiam in ipsa, corrodens substantiam vesicæ, & per consequens addentis in dilatactione vulneris. Ex quibus omnibus non recipit vesica soluta cōsolidationem, vt dixi. Sed licet istud sit scientilicū & rationi consonum, tamen non est difficultandum ab operatione rationali. Omnibus ergo nervis in principio intende incarnationi vulneris vesicæ, & in defensiuo circa vulnus, ne locus apostemetur. Ego autem vsus sum interdu hoc incarnationi super vulnere isto. *℞. mellis ros. colat. lib. 6. storis. mastich. tragac. gumi arab. mumia, myrrha ana 3 j. melle.* & vtere, vt dixi, in modo emplastri super vulnere: nec supra ipsum ponas oleū aliquod, quia cuiusque generis sit, impedit vesicam vulneratam, ne possit consolidari, quocunq; tempore ponatur tale oleum. Incar-

254
De vulneribus testicularum.

De vulneribus matricis.

De vulneribus vesicæ.

Si vulnus sit in inguine.

Guilhelmus de Saliceto lib. 2. ca. 17. de vulneribus et de cunctis quibuslibet.

extracta, et *librum est cap. de vulneribus in capite*, imple vulnus totum cum linamentis infusis in oleo *resice cum croco*, calidis, pro primo apparatu, usque ad tres dies, quum sanies incipiat generari, nisi sanguinis fluxus impediatur hora dilatationis & extractionis, tunc huic intende, & loca vicina inunge cum *bole arm. oleo resice cum croco*, *placida, semper arm.*, mistis cum modico croco, & super vulnus totum pone medicamen ex *vitello oui, oleo resice croco*, mistis, & calidis, ad tres dies, donec sanies incipiat apparere, tunc adhibe hoc mundificatium, cum turunda vel tenta in vulnere ponendo: *℞. mellis res. colati lib. ss. far. sarn-grati, lini, flor. chamomill. pulvis sarn-grati optime ana 3j. far. hordii far. lupinor. ana ʒss. oleo chamomill. anethi ana ʒiij. misc.* cum vino sufficiens, & vere mundificat, dolorem sedat, & in hoc casu vtile habetur: nam hic tota intentio versatur circa doloris mitigationem, & precautionem inflammationis aut apostematis; nam ab his duobus tantum metus est, de victus ratione nihil immutandum ab illis, quæ in communi sermone diximus. Si autem fiat vulnus in istis locis cum cunctis vel similibus, & indigeat sutura, fustur ut de collo & gula dictum est, non negligendo phlebotomiam, ventris lenitionem, tum alia sapientius dicta. At vulnera in charum quædam sunt in partibus continentibus, quædam in cõtentis. Quæ autem sunt in partibus continentibus, eundem modum habent curandi, quæ ventris superioris vulnera: quæ vero sunt in contentis, ut sunt vesica, aut matrix, nihil habent proprium a vulnere cõtentorum in ventre, nisi signa & indicia, de quibus nunc diximus. Sed de his tum alias Scholio præcedente satis dictum est. Nunc ad vulnera quæ in

Guilhelmus de Saliceto lib. 2. ca. 17. de vulneribus et de cunctis quibuslibet.

De vulneribus in cunctis quibuslibet.

coxa contingunt siue ense siue sagitta, venimus. Dicit Guilhelmus de Saliceto *lib. 2. cap. 18.* Quum vulnerratur coxa, tunc tale vulnus non infligitur sine periculo, ob musculum vel lacertum magnū ibi existentem, a quo separantur chordæ veniētes inferius ad modum cruris & pedis; ad cuius musculi compositionē etiam veniūt plures nervi ad cerebrum, qui inferunt per consensum cõdolentiam & dolorem in loco vulnerrato, & in cerebro, subinde & spasmi; hinc & citra ac aliquoties subita mors: iam quoque ex venis & arteriis magnis incisus ingens fluxus sanguinis oboritur, qui difficulter cõstringitur, adeo ut & mors subsequatur: unde & hæc sunt indicanda tamquam vulnera ex necessitate aliquando lethalia. Fit itaque vulnus in coxa, ut *alibi*, secundum latum, longum, & transversum, modo parum, strictū, profundum, modo in superficie. Si ergo fuerit magnum secundum longitudinem, & latitudinem, vel profunditatem, partes coniunge cum sutura decenti, ut de collo dictum est, & superpone futura pulverem cõservatum, orificium vulneris dimittendo in loco decliviori, ut sanies commode mundificetur, turundis in solutis in *vitello oui, oleo res. croco* calidis infusus, & super toto vulnere linamentis impositis usque ad tres dies, donec sanies incipiat generari: &

circumcirca apposito defensivo sapientius dicto: deinde liga, mundifica, & incarna, ut nosse non omittendo phlebotomiam, veniesas, purgationes, diximus, tum alia in communi sermone dicta. Si vero tale vulnus secundum latum vel longum, profundum fuerit, considera, num eius musculi, lacerti & nervi magni sint incisus secundum totum vel partem, & num vena vel arteria sit incisa, ex qua enormis fluxus consequatur. Si nervus incisus fuerit secundum totum vel partem, subito coniungas partes cum sutura sihi incerati, suendo prius vena futura partes nervi incisas simul, quia sit ex ea melior membri cõtinuatio, & magis decens, ac magis cito incarnatio & curatio, per naturam & artem medicam, ut ab eodem Guilhelmo de Saliceto dictatum fuit de vulneribus: postea suto partes carnis & pellis super nervo existenti, solutas, nisi sanguinis fluxus impediatur, cui in primis resistito restrictis, ut *proprie capite dictum est*: & dimitte sic locum ligatum usque in sequentem diem, vel paulo plus, donec securus sit de eius constrictione. (Si arteria est incisa, & cõstringi non potest, si in istis tum, siro cadenti, ut in iunone dicit Delphensis, qui seipsum in coxa laesit, fecimus) postea dissolve leniter, & redeas ad futuram prædictam, futuræ superponendo pul. cõservat. & defensivam circa vulnus dictam: & in vulneris orificio, quod reliquisti apertum, impone vitellum oui cum *oleo res. & croco medico*, usque ad tres dies vel creius, donec sanies incipiat generari, deinde mundificetur, incarnetur, & consolidetur, ut nosse. Si autem tale vulnus fuerit strictum & profundum, seu strictum & non profundum, & a tali vulnere sanguis ultra debitum fluat, subito cõstringe, & locum circa vulnus descendens cum defensivo sapientius dicto, ne inflammetur aut apostemetur. Sed in istum in aliis locis nervosis non ponas tentam longam penetrantem ad profundum vulneris, & ludentem nervum, sed pone in orificio vulneris, ne claudatur, quia ob tactum nervi, vel eiusdem frictionem, ob sensibilitatem loci, dolor accedat: & confluxus humorum, ac demum inflammatio, spasmi, & postea mors. Igitur loco tentæ imponentur *oleum resice cum calidum*, cum *medico croco*: hoc enim sua oleagineitate & humiditate multa replendo dilatat vulnus, & dolorem mitigat, & ratione rosarii roborat & defendit membrum ne apostemetur. In ore aut vulneris stricto, & circa suppellex eius sine pfundatiōe aliqua facta sanguinis cõstrictione supra dicta, ponatur tenta crassa & crassa in vitello oui infusa, *oleo res. & croco calido*, & de suppellex illa stuppea in dicto me dicamine in voluta usque ad tres dies vel creius, donec suppuret vel saniet locus. Post hoc eodem modo cum teta simili & faldella stuppea in tinctis in mundificatio ex *mell. res. colat. farina bord. myrrha, & modico croco*, prius locū mundifica, & cõtinua usque ad aliquot dies, donec sis securus ab apostemate. Postea vero mundifica secundum modū supra

dictū cum mundificatio paulo fortiori ex *melle ros. terreb. sarcocolla, myrrha, & sar. lupinum aut alium generis*, aut, si expediat, cum *ung. populi*, vel *suada*, quæ vehementiora existunt. Deinde in carnā consolidā, vt nosti. Si vero parum sanguinis a vulnere profuſerit, cuiuscunq; generis vulnus fuerit, modo sit notabilis lēſionis, fiat phlebot. in brachio vel manu ex loco opposito & directio: & scarificatio fiat in natibus, si omnia consensiant: & venter arte vel natura respondeat: vitusque ratio, vt *sapientia dictum est*, inclinet ad frigiditatem, & lubilitatem, pro ætatisatione, vt idem Guilielmus dixit de vulnere in pectore, dorso, & femore. Nunc ad vulnus in genu accedamus. Hæc (*eodem acimone*) valde sunt metuenda & lethalia, maxime si vulnus subſtus fiat in parte concauitatis illius, quæ reperitur in anteriori parte genu sub rotula, vt sunt illa in vltimo faciliſ minoris & maioris, nam ibi continuantur & coniunguntur nerui multi effatu digni, & nobiles, venientes a cerebro & nucha: tunc fit dolor intolerabilis subito, & subſequitur ſpasmus, & quandoque mors, aut ſequitur ex vehementiſſimo illo dolore debilitas tanta infirmi & loci illius, vt ex deſcenſu humorum non poſſit deſcendere membrum ab inflammatione vel apoplemate. Et fit cum iſdem ſimilitur rigor ſignificans ſpariſiſſimam malæ materiæ virulentæ ſupra membra ſenſibilia, vnde multoties & mors ſuecedit. Si igitur oborta ſint huius loci vulnera cum ſagitta aut alia re acuta, vt *pugione, enſe, cultro, lancea, clauo, vel huiusmodi*, viſque ad os fuerint profunda, ſive non, lubito extrahantur, obſervatis Regulis de vulnere in capite ex ſagittis. Et non præſumas ponere in vulnere tali aut conſumiſſo nruoſo nodoſo tentam longam, ſed ſolum in oriſicio vulneris ſuperficialiter, vt non tranſeat partes carnoſas ncrubet, ne contingat & fricet neruum, ſed ſolummodo ponatur talia tenta, vt oriſicium apertū maneat, & intus in profundo vulneris ponatur ulcum roſ. calidum, cum exiguo croco in primo apparatu, ſi ſanguinis fluxus non inſeſſet, ſiſque tunc illi curationem adhibeto. infundendo tentam illam dictam in oleo prædicto guttatim, vulnere imponendo: deinde imponendo tentam illam contractam (*curtam vocant Barbares*) in oriſicio vulneris ſuperficialiter, vt *dictum eſt*: nam oleum vicem turundæ ſeu tentæ ſupplet, prohibendo ne vulnus claudatur, & ſua humiditate diſſidet vulnus, & ſedat dolorem, & roborat, vt *ſepe dictum eſt*, & deſcendit ab accidentibus diſſis. Et ita facias cum tenta dicta inſuſa in oleo & croco, viſque ad tres dies, donec ſanies in loco incipiat generari, & ab apoſtemate ſecurus ſis. Poſtea procede cum mundificatio ex *tereb. melle ros. myrrh. ſar. her. vel liquir.* extendendo ſuper toto vulnere oriſicio emplaſtri modo, & in oriſicio vulneris, *oleum ros. calidum cum croco*, cum tenta ſuperficialiter imponendo. Interim ſi forte propter olei viciuſitatem ſuperſinitas aliqua in vulnere multiplicaretur, linque *oleum*, & procede mundificando cum *melle ros. re-*

reb. myrrhæ & croco, aut cum alio neruorū mundificatio noto, imponendo illud cum tenta in profundo vulneris, & tentam in ſuperficie, vt *dicta*. Imo ſi propter talis olei viciuſitatem, vel aliam cauſam, aliqua caro mollis vel viciuſa, aut quid ſuperfluum in vulnere oriſicio vel profunditate, videatur eſſe & generari, remoue id cum *ung. apoſt.* vel viridi &c. deinde in carnā & consolidā, & non omittas phlebot. ventofactiones & ventris lenitionem & dietam, tum alia ſæpius dicta. Si vero in ſagitte extractione fluxus te impediāt, conſtrictioni eius prius intende, deinde procede vt ſupra. Neq; eſt audiendus ſermo dicens (*inquit Guilielmus*) ſolum non debere poni in vulneribus neruorum, quia ſua viciuſitate marcorem & putrefactionem inducit: hic enim ſermo non ſemper veritatem habet, vt (*inquit*) demonſtrabimus quomodo nocet vel iuuat, *cap. de punctura neruorum*. Procede igitur audacter vt ſupra, non omittendo deſenſum circa vulnus. Si vero vulnus fuerit longum, latum & magnū, indigēs ſutura, tunc bene cōſidera, num ibi ſint aliquæ partes oſis inſeſæ, ſeparatæ a ſano oſſe, quæ cum ſano permanere non poſſunt: & ſic eas remoue ſubito ante ſuturam: deinde ſue, & cōiunge partes vulneris probe, dimittendo oriſicium in loco decliuiori: in quo oriſicio & ſuper toto vulnere pone vitellum oui cum oleo roſ. & croco, miſtis & calidis, viſque ad tres dies, vel circa, donec ſanies generabitur, niſi fluxus ſanguinis impediari: & iſte primo apparatu illi intendi: deinde redeas ad iam dicta, poſt hæc vero mundifica, in carnā, & consolidā. Si vero ibi fuerit pars oſis ſeparata & inſeſa, quæ tamen poſſit ſuo oſſi adherere & coniungi, ſive ibi non ſit aliqua pars oſis inſeſa, cōiunge partes, & cōſerua ſuturam cū pul. & linque oriſicium vt ſupra, in quo pone turundas in volutas in vitello oui, oleo roſ. & croco calidis, & ſuper toto vulnere etiam inducto linamento, & breuiter cum phlebotomia vel ventofatione, ventris lenitione & dieta procede, vt *dicta*. *ſepius oſenſum eſt*: deinde mundifica, in carnā, cōsolidā, vt noſti. De vulnere autem cruris cum enſe vel ſagitta, in principio huius Scholii ex Salyceto dicere cōperamus, quod etiam ſit metuendum, ita vt plurimos ex ratione ſuperius dicta videri intire. Si ergo, inquit, ſagitta vel aliud ſimile cruris intrauerit, aut ſaltem locū dictū & oſis ſubſtantia ſubintrauerit, tunc ſubito ſecundū ordinem cōſuetū ſæpius dictū mollitia locū ſagittæ & totius vulneris cū oleo roſ. calido, & modico eroco, aut pinguedine gallinæ iis admixta: & breuiter diſpone locum ad faciem ſagittæ exitū, aut cū dicto mollificatio, aut fortiſſimo, cum inieſione ſolerti & ingenioſe facta: & extrahet tunc ſagittā ſuauiter, vt in propriis locis dictū eſt: & que extrahā ſubito imples vulnus cū *oleo roſ. calido*, & *croco pauco*, non imponendo tentā in profundum vulneris, ſed ſolummodo oleū antedictum: tentā interim ponendo in oriſicio, ne claudatur ſuperficialiter, inquam, vt de cuxa & genu paulo ante dictū eſt. Circa vulnus autē ponatur etiam nūm

Guilielmus de Saboto lib. 2. c. 19. de vulneribus in genua, de enſe vel ſagitta.

Lib. eodem cap. 22. de his eundem conſulato.

De vulneribus cruris ab eo ſe vel ſagitta, cap. 20. lib. 22.

siuū *ex bolo armena, oleo ros. aceto, succo solatri, semperuina, plantag. aq. ros.* & huiusmodi cum croco exiguo: & hoc fit a principio vsq; ad finem. Oleum vero ad tres dies, donec sanies apparere incipiat, & tutus sis ab apostemate: postea mundifica locū, incarna, & cōsolida, vt paulo ante diximus: & si a vulnere sanguis exierit pauus, & virtus, & tas, tum alia sapius dicta cōsentiant, fiat phlebotomia vel scarificatio, chylisteria glādes, si opus est, & præsensbatur victus ratio cōmoda, vt in aliis vulneribus. Et nullo modo timeas de offe lso in isto casu, quia per viam mōdificatiui bene mōdificabitur. Si in actu extractiōis fugiat fluxu sanguinis impediens, subito cōstringe, & redeas ad suprascripta. Si vero vulnus fuerit magnū siue longum aut latū, sutura indigens, & cū fluxu sanguinis abundanti, subito coniunge partes vulneris, & sanguinem statim rēprimito: neq; omittas superponere suturā pul. cōseruatū, & dimitte locum ita ligatū in sequentem diem, vel vltra donec securus fueris de restrictione sanguinis: deinde procede cum mollificatiōe & doloris sedatiōe ex vitello oui, ol. ros. & croco, vsq; ad sanie generationem, deinde mundifica & incarna, & cōsolida: phlebotomiam, dietam, ventris lenitionem, & cetera sicut & reliqua præscribere, vt nosti. Si autem os cruris incisum fuerit ex trāsverso tota, ita vt non possint sibi inuicem partes adhaerere, tunc manibus tuis decenter coniunge, & leniter: deinde decenter partes carnis cum pelle suc, & pulueres cōseruatios inasperge suturæ, & circa vulnus defensiuo inungito, & rurūdis ac stuppis alb. oui, oleo ros. & croco inuolutis, loco decenti fascia ligato, vt de vulnere in adiutorio seu cubito ab eodem Guilielmo scriptum est, & sic procede vsq; ad generationē saniei, vitellum oui cum oleo ros. & croco, deinde adhibe cōmunia remedia, donec tutus sis ab apostemate: & rege tunc infirmum cum cibis duris, & viscosis extremitatibus animalium, ad porum sarcoideum generandum. Hæc autem plurima communia habent cum fractura & dislocatione ossium cum vulnere. Vulnera autē raseta seu nodi cauculæ pedis, ob multa ossium tendines & nervos difficulter sanantur, ita vt motus & sensus sibi ledantur, etiam spasmus subsequēte. Huius vulneris exemplū posuimus antea in hoc libro, vbi. 16. de quodā vulnerato in pede dextro adeo vehementer vt totus pes circa cauillam seu malleolum abscissus fuerit, cui inest dolor aderat, ita vt de spasmus metus foret. Vide pulcritudinē illam histōriam, quomodo est curatus fuerit. Ceterum, teste Guilielmo de Saliceto, si vulnus huius loci factū fuerit cum sagitta, aut alia re acuta incidente, tūc subito, vt sagitta extrahi valeat, mollificetur locus cū oleo ros. pūg. galbene croci momento calidius, & totū vulneris orificium: & attende diligenter, ne in isto loco pellis vel caro incidatur ad vulneris dilatationem aliquo inodo, ne propter infiltrationem, & cōue-

xionem nervorū illius loci ex incisione, ex transfurfo incidantur nervi ad motū & sensum necessarii in isto loco: nam si qui in eis non recipiunt cōsolidationem, saltem veram, cum membrū aut secundā partem aut secundū totū, motū & sensum amittat. Cum sola ergo aut cōdicta vulneris mollificatione stude, quantum possibile est, sagittam extrahere, vt proprio loco dictū est. Qua extracta impleatur vulnus cū oleo rosaceo calido, & croco, tentam seu linamenta non profunde nōdo, sed solum oleū antedictum guttatim in fundo vulneris cum linamento insillando in orificio vulneris breuiter tentam ponendo, ne vulnus claudatur, sed crassam, ex parte in dicto olco imbitam, ob crassam in vulnere coarctū genus dictam. Et hic obseruetur modus ad tres dies vel 264 circa, donec sanies incipiat generari, & ab apostemate securus fueris, tunc mundifica locū, incarna & cōsolida, & cōmunia iam sapius dicta remedia, cum opus est, adhibet ad cōsensuum etiam ex bolo armena, myrra, oleo ros. aceto, succo solatri, semperuina, plantag. aut illorum aquis circa locum continuo fiat. Si vero locus iste fuerit vulneratus cum enle aut re incidente, ita vt necesse sit partes cōiungere, tunc diligenter cōsidera, num ibi adfuerint fragmenta aliquis ossis separata ab offe sanos, quz, si possint, probe & leniter, sine infirmi molestia remoueantur: deinde partes ossis remanentis ad inuicem manibus tuis, ac deinde partes carnis & pellis cum sutura coniunge, vt de vulneribus cubiti apud eundem Guilielmum dictum est, vel cap. proprio de sutura & de vultucribus in parte nervosa, antea a nobis descriptis. Deinde pul. cōserua suturam, & procede, vt de reliquis dictū est. Si vero in tali vulnere nervus inclius fuerit ex trāsverso, secundum partem aut secundū totum, subito cōiunge partes nervi cum sutura, vt in capite de vulnere coarctū & genu dictum est: deinde & reliquas partes carnis & pellis cōsistenter super nervo cōserua, nec non suturam munio cum pul. sapius dicto, dimittendo orificium in de. liuori parte pro sanie expurgatione: deinde in vulnere & super totū vulnus pone vitellum oui, ol. ros. & crocū, vsq; ad tres dies, vel donec sanies ibi generetur: demū mundifica, incarna & cōsolida, vt nosti.

OBSERVATIO L.

De vulnere lethali sub planta pedis.

IOHANNES Bucerus, consul Alcmarianus, cū pedes more solito lauaret, cultello scriptorio, quo pēnz scriptoriz aptantur, acutissimo cū calum sub planta pedis abradere studeret & excindere, se ipsum vulneravit, vulnere quidem non magno: sed cum ei statim subsequeretur spasmus, antequam remedia idonca adhiberentur, subito exstinctus est. Eo tempore ipse non adfuit: nam tunc Alcmaria discisseram ad Delphensem ciuitatem, publico stipendio conductus, vt ibidem praxin exercerem, vbi mihi hic casus per literas amicorum innotuit.

De vulnere
raseta seu
modica.
De pedis
vulnere.
De Guilielmo.
vbi. 16.

decoct. madaefacta & molliter expressa appone-
rentur, simul probe inducenda fascia linea. Quo fi-
cto, egregie curatus fuit: tum alii quam plurimi,
per nos eodem remedio eodem malo laborantes
sanati feliciter fuere.

S C H O L I A.

EGMVNA libro superiore de cruentis vulneri-
bus, seu de ea continui solutione, quæ in car-
nosa parte ex vulnerando recens facta est, ac reli-
cta. Nunc igitur transcendendum nobis est ad id vi-
nionis etiamnum in carnosa ac molli substantia
factum diuortium, quod nec recens est, nec cru-
entum, sed iam inueteratum, & in quo vna vel
plures cõsistunt dispositiones, seu malæ affectio-
nes, quæ cutis vnionem, vel consolidationem re-
mouent atque impediunt, ex quibus saniosa &
purulenta quædam colluevis putredoq; excitatur.
Vocant autem vulgares medici & chirurgi
talẽ vnionis diuortiu, seu continui solutionem,

muniter solent a chirurgis assignari. *Vlcus vitiosum*, & *corrosiuu* siue *camedens*, *ulcus fœdus*, id æ-
ci *rhyparon*, & *purisid* siue *purisidid*, quod Græci
herpdon appellat, *ulcus canerofum* & *profundum*,
ulcus fistulosum, *ulcus canerofum*. Differentiæ
autem ab accideñtibus siue symptomatis & affecti-
bus, quibus ipsa vlcera complicantur. fere com-
munes atq; æquiuocæ sunt ipsi vlcus in temperie, quod
Græci *dyseraton* vocant, *ulcus cruciatu* siue *doloro-
sum*, *ulcus cum tumore aliquo præter naturam*, quod
apostematofum non minant: *ulcus canerofum*, *ulcus su-
percrefcent*, cum carne molli & *superflua*, *ulcus po-
nens* Græcis, quam Auicenna inter pres canem
additam super vulnus appellat, *ulcus durum simul
& terebrosum*, *ulcus canerofum* seu *gangrenofum*,
ulcus canum, *ulcus carofum*, id est, cum osse cor-
rupto, *ulcus cum varicibus*, *ulcus caecothel*, id est,
malignum & ægre sanabile, atq; id genus alia. Cete-
rum multæ ex supra commemoratis differentiis,
veræ vlcum differentie non essentur Galeno,
sed aliorum affectu cum vlcere complexionem,
cuiusmodi sunt *ulcus canerofum*, *gangrenofum*, *su-
percrefcent*, *purisididum*, *canum*, & cum tumore
aliquo, vt *ulcus phlegmonodes*, *eryspelasodes*. Putre-
do namq; *gangrena*, *phlegmone*, *eryspelas*, *caner*,
& reliqua id gen^{us}, ex morbo sunt genere nempe
affectu præter naturam, actionem vitiantes,
qui seorsim ac per se consistere possunt. Quod
enim consistere seorsum & per se potest, id nullus
vnquam alterius (inquit Galenus) fuerit diffe-
rentia. Isto igitur hoc ubi veli præcepto & re-
gula, qua discernere liceat, differetia aliqua sit,
alterius affectus complexum. Sed & alio rursus
modo vlcus cruciatu siue dolorosum, & vlcus for-
didum, seu quædam vlcis differentie dicun-
tur, cum tamen veræ aut propriæ differentie non
sint, sed complexus potius symptomatum cum vlcere.
Dolor namq; & sordes ex symptomatum sunt
genere. Pari modo & cum dicitur *eachemianu* vlcus,
id est, vitioso succo obfuso, aut fluxione vexa-
tum, quod *rheumaticu* Græce Galeno dicitur,
aut *erofum*, id est, quod exeditur, causa est affe-
ctu copulatur. Talia igitur multa pro differentiis
vulgaribus & medicis vulgaribus vsurpantur,
quæ reuera differentie non sunt, saltem apud
Galenum, sed alteri dispositionis complicationes,
seu affectus cõpositi. Simplicis igitur soliusq; vlcis
differentie veræ ac propriæ ab ipsa vlcis natura
sumuntur. *Vlcus autem simplex* hic cum Gale-
no appellamus, quod solū cõsistat, id est, cui nec vlcus tur.

Differentia
vulgarum ab
affectibus
quibus com-
plicantur.

Affectus cum
vulgarum com-
plicati.

*Vlcus quid
dicatur chi-
rurgu vul-
garior.*

*Vulnus at
que vlcus
propria dif-
ferentia.*

*Vulcrum dif-
ferentia a
quibus su-
manatur.*

*Vulcrum dif-
ferentia a
causis.*

communitur *Vlcus*: quamvis apud probatos au-
ctores vlcus & vulnus passim pro eadem sumat-
ur, *vt apud Galenum*. Sed nunc, si quendi vulga-
res chirurgi & Auicennæ interpretem, *Vlcus*
ita breuiter definitur: *Solutio continuatæ in car-
ne, quando iam continet sanem & pus, nemiatur
Vlcus*. At sicuti vulneris sunt differentie, magnæ,
*periculum, obliquum, aequale, inaequale, in sum-
mum, giden & in profundum penetrat, longum uem
& breue, recens & inueteratum*, ex veræ ac propriæ
sunt simplicis soliusq; vulneris, & cui nullus ali-
us adiunctus sit affectus, differentie, sicuti etiam
& vlcis quod solum consistit, *vt mox dicemus*:
quamvis vlcus potius compositus semper sit af-
fectus, *vt latius a Guidone habetur cap. i. de vlcera-
bus in generali*. Porro in definitione vlcis, ex
Auicenna paulo ante addit, per sanem & putre-
dinem, sordetis, squamæ & crustæ (quas Græci
eschera vocant) etiam inaudiuntur: quæ in ipsi
vlcis contingere possunt. Itaq; Auicennas
& qui eum sequuti sunt, *vulnus* & *plagam* vocant,
vbi nondum est pus: *ulcus* vero, vbi iam pus est.
In qua sententia quoq; fuisse videtur, Corn. Cel-
sus lib. 5. *in medicina*: vbi recensum & cruentum
adhuc plagam, *vulnus* appellat, vlcus vero, cum
iam vetustus occupauit, sine extrinsecus quidem
per vulnera incidit, sine intrinsecus corrupta
aliqua corporum parte nascitur. Quid autem sit
sanis, quid *pus*, quid *sordes*, postea dicitur. *Vlcus*
differentie sumuntur quibusdam a tribus
potissimum: nempe a causis ac excitantibus, a
a 69 membris & accideñtibus seu dispositionibus cum
eis complicatis. Alii vero breuitati studentes, eas
a duobus duntaxat desumunt, vt pote a causis
& symptomatis, atque etiam affectibus ipsi, qui-
bus complicantur, ea quidem, quæ a membris siue
laborantibus particulis sumuntur, discrimina
omnino prætereuntes, quippe quæ ad particula-
rem, non autem ad vniuersalem de vlcis trahenda
ationem pertineant. Sed de his obiter in huius-
modi agitur. Differentie quæ a causis sumuntur,
sæpe communiore & magis propriæ, hæc com-

370
Vlcis com-
plexus cum
symptomate.

Vlcis cum
plexus cum
sua causa
& meritis.

Vlcis ac
propria vel
differentia
unde sanam

Vlcis dif-
ferentia pro
pria.

quæ

Figura. divisionis magnitudine seu quantitate, a dimensione sine spacio ducuntur. *A figura*, vt vlcus rectum, vlcus unicum. A divisionis magnitudine sue quantitate, vt vlcus magnum, vlcus paruum. **Dimensione.** Ex dimensionibus siue spatii, vt vlcus longum, vlcus breue, vlcus latum, vlcus angustum, vlcus subtile, siue superficiale, id est, in summo residens, vlcus profundum, vlcus agnale, vlcus inagual. Extrinsecus vero accedentes vlcum differentie sumuntur a tempore & a generationis ratione: item ex eo quod totum vlcus parsve vlcis conspectum fuit, vel conspiciendum se prae bet. hoc est, a situ in parte affecta. A tempore quidem, vt vlcus recens, vlcus inueteratum. Ex generationis ratione, vt vlcus inersum, vlcus disruptum, vlcus partim inersum, partim disruptum. A hita in parte affecta, vt vlcus in conspectu sine euidenter apparet, vlcus intus conditum, siue non apparet, idque intus vel in parte: item vlcus in principio musculi, vlcus in fine musculi, vlcus in medio musculi. Ceterum quae ex loco affecto sumuntur vlcis differentiae (si tamen differentia censenda sunt) non vti que, vt Galenus inquit, a propria ipsorum natura, vt praecedentes, desumuntur. Loca autem in quibus consistunt vlcera, sunt partes similes & organicae. Igitur si a locis, in quibus est vlcus, differentias censcas, hoc modo fiet diuisio vlcis a loco affecto: vlcus in parte similari, vlcus in parte organica siue instrumentaria. Rursus vlcis differentias a parte similari affecta, hoc pacto diuides: vlcus in vena, vlcus in arteria, in ente, in musculo: censetur enim musculus etiam quodam modo inter partes similes, siue ad sensum. Differentiae vero a parte organica affecta eiusmodi sunt: vlcus auris, in faucibus, in aspera arteria, vlcus pulmonis, pectoris, in pene, sede, & sic discurrendo per singulas corporis partes, quas instrumentarias vocamus. Atque hae completa & absoluta est simplicis soliusque vlcis, & cui nullus alius adiunctus sit affectus, in sua differentis diuisio, quae a propria ipsius natura sumitur. Quod si affectus aliquis seu dispositio, quae seorsim (vt diximus) & per se consistere possit, vt phlegmone, gangraena, putredo, vlcis adinagatur, ab eo (vt supra diximus) sumi non possunt vlcis differentiae, talem verè & proprie dicte. Verum enimvero, quoniam ab ipso etiam Galeno locis sexcentis dictum est, non oportet de nominibus contendere, si quis putrescenti vlcis, & quae exeduntur, & quod gangraena & quod erysipelas afficitur, & cancrum & sinusum, & carisum, & caecothel, & delum, & malleum, atque id genus alia, vlcum differentias nominauerit, non erit enim eo contendendum, modo rectam illis rationem adhibeat. Vocabunturque vlcum differentiae, sumit ab eo eum quo complicantur, nempe differentiae vlcum a complexu cum morbo, differentiae a complexu cum symptomate, differentiae a complexu cum sua causa, & si quae sint aliae.

271
Locum affe-
rum.

Non esse de
nominibus
contenden-
dum.

Vlcus enim quidam diuturnum ac malignum in crure habet, nec id vilo modo curari aut consolidari possit. A varia chirurgi medicamentis adhibuit, etiam puluerem praecipitatum subinde inspergens, tandem supercuiens quidam medicus cortice granatorum in tenuissimum puluerem contundebat, ac vlcis inspergebat. atque hoc vnico tam simplici medicamento vir ille ab vlcere curatus fuit.

SCHOLIA.

Vlcus (vt dixi admodum annotauit Fernellus) est sceda impura; continui solutio. Impura quidem sit, non vt vlcus sanguine, sed vel humoris vitio, vel hinc genita sanie, vel pure, vel quavis alia corruptione, non extrinsecus, sed ex vulnere ipsa profecto. Vlcus extrinsecus accipitur; vlcus nonnumquam extrinsecus quoque, vt quum vel septicis medicamento, vel cauterio corpus inuritur: ac sapientis huic origo poeanea, ex interiori vitio est. Itaque omnis efficiens vulneris causa euidentis est: vlcis vero plerumque interior, quibus scilicet humor praeter naturam collectus. Hic enim vel exactione vlcis gignit, vel in vulnere accepto vetustate alia ueracione succrescit. Est autem vlcis interior illa causa duplex, Antecedens & Continens. Antecedens est corporis impuritas atque caecochymia, aut ex improbo vlcu, aut ex vlcum humor praeter naturam contracta. Continens est vitiosus humor, omnisque corruptio in affecta parte consistens ac harena. Vlcus ergo solitarium exsistit, neque illi causa effidet, vlcis vero sua semper comes est causa, quae quod genuit etiam nunc fouet. Praecipue vlcum differentiae ex iis quae dimanant, & ex causarum varietate, vt iam paulo ante diximus. Vlcus quidem, quem admodum & vlcus, magnum, paruum, summum, profundum, rectum, obliquum, aequale, inaequale, recens aut inueteratum appellare licet, at non illis propriae sunt differentiae, si ad causas species, forte intelligit Fernellus: nam has proprias esse diximus a rei substantia acceptas. Ab iis autem, inquit idem Fernellus, quae in vlcere succrescunt, manant species, haec sunt, vlcus saniosum, vlcus lentum, serdidum, putulentum atque verminosum. Est autem sanicus emensus quae sanies quidam, desunt tenuissima, minimeque glutinosa, subtiliora aut subrubicunda. Quod haec crassius exsistit, si glutinosum quoque est, siue Graecorum ichor sit, siue meliceria, nostris virum appellatur, pur vero crassius est & albidius, minime tamen glutinosum aut coarctans: hoc ex vlcere exit, iam, sanescente, sanies ex incipiente atque crudo, virum ex magno. Vnum quodque autem vitiosum habetur, simulatum tenue, dilutum, liuidum aut nigrum, mali odoris & acre: tolerabilis vero, si omnia obiecta ebitaria, Sordes hisc omnia crassior, glutinosior, est, ac minime profuit. si veluti concreta adhærescit vlcis. Vniversum totum tum putredinis soboles sunt, solentque in neglecto vlcere pccari. Vlcis porro differentia: ex continet causa haec sunt: Vlcus phlogmonodes, erysipelodes, cancerodes, carcinodes, exanthi, caecothel & putridi. Ceterum

TUM

OBSERVATIO II.

De vlcere quodam inueterato & maligno.

tum quoniam de causis vlcerū dicere cepimus, eas in vniuersum gentinas tantum chirurgorum possinitas statuit, nempe antecedentes seu *prædictas*, quæ Græcis *προδιαβητικὰ* dicuntur: vt continentis *τε* *εὐκταίας*, quæ *εὐκταίας* Græce appellantur. *Prædictas* vlcera namq; hoc est, *progressus* & *evidentes* seu *prominens* illis minimè tribuunt: quippe quæ dum carni incidunt, disrumpunt, aut laniant, aut quouis modo continui solutionem in ea efficiūt, nequaquam primo statim occurſu sanicm aut pus aut fordanicm (quæ *necessario* vlcera comitari arbitrantur) creare aut excitare possunt. Quomobrem cōsequio quodam id præſtare valent, nempe corpores, atq; antecedentes causas commouendo. Itaq; vlcera antecedentes causæ sunt cacochymia (vt diximus) id est, succorum vitium, cum scilicet sola qualitate peccant humores, non etiam quantitate: atque eorundem prauorum succorum, siue humorum in corpore existantium nimis exuperans copia, qui corporis ipsius particulas arrodere & tandem corrumpere possint. Porro cuiusmodi siue, orum prauitas, aut ex deprauata victus ratione generatur, aut totius corporis, vel alicuius *totæ* membri, v. l. hepatis aut lienis, vitio contingit, *vti plerumque* *et cō Galenus nobis testatur relinquit.*

Vlcera tan-
ta antecedentia
sunt.

Causa vlc-
erum conti-
nentes.

Causa vero continentes, siue coniunctæ vlcera dicuntur interperies illa, quæ *malum com-plexum* vocant, in vulneratis particulis ex causis proigamentis seu antecedentibus modo dictis, vel etiam ex ipsius vulneribus, aut abscissibus, aliisve præter naturam tumoribus (*sed malignis præsertim*) rupis, apertis, excitate. Quomodo enim ex herpete, tum militari, qui Græcis *cencheria* dicitur, tum etiam *est humore*, id est, ex *exedente*, qui ex bile fit crassior & acrior, vlcus *carbunculum* præsertim venenosum (*quod vlcus est ejusmodi* *et phlegmonem*, id est, sordidum, & ex abscissibus profundum & concavum siue cauernosum procreatur. Hinc & Ferrius: *Vlcus in genere cuiusque speciei, cuiusque continens materia, tum ex* *ris* (*vt paulo post etiam dicemus*) *tum ex eorum gra-*

374 *uassant substantia atque colore tum ex eorum a-*
ritate vel colore mescendo. Ad hæc vero vt perfectior instituat curadi ratio, causam quoque vlcis antecedentem, & quicquid in illius ambitu confedit, etiam atque etiam circumſpicere oportet, & accuratius explorare. Multa enim plerumque circumſilant, sine quorum animaduersione neque vlcis sanatio completi: cuiusmodi sunt interperies præter naturam, phlegmone, omnisque tumor, varix, contusio, aliæ carnis corruptio. *Interperies* deprehenditur partu colore, constanti, laborantis sensu, atque remediis non vsu. Tumor præter naturam quum tactu visuique fit obuius, per seipsum innotescit. Hic autem vlcis materiam pabulumq; fuggerit, vt (*si prout subtilis sit*) nequeat vlcus omnino sanificare. Varix quoque, aut quouis modo dilata vena, si in vicus materiam uictas, id agglutinari non sinat. *Contusio* autem, omnisq;

subiectæ carnis corruptio aut viciōsitas, haud fecus ac interperies, vlcus sanari prohibet. Neque enim id carni impleri, neq; agglutinari, neque cicatrice obduci sinat, ne convenientem naturæ suæ modum obtineat. Quinctiam vlcus, præsertim vero iccoris, atque lienis constitutio, totius denique corporis habitus tenendus, quod ex bono facili, ex malo habitu difficilis sit vlcis curatio: hæc ex causis hydropicorum & ictericorum vlcera ægre sanescunt. Itaq; & tria sunt ægre sanabilia vlcera: scilicet vlcus modum.

Tria modi
ægre sanabilia
vlcera sunt.

Primum, quod ex interperie subiectæ carnis pro-
nem. Secundus, quod ex vno confluentis sit sangui-
nis. Tertius, quod ex mensura seu copia vel quantitate confluentis nascitur, vt lib. 4. method. medendi. Gal. annotant. Qui & aliter ibidem positi fieri diuisionem tradit: nempe ægre sanabilia, rebelliumque vlcera, alia propter vlcis carnis interperiem, alia ob confluentem humorem talia fieri. Tum interperiem ipsam bifariam adduci, cum alias in qualitate sola naturæ modum egressa, subdita caro sit, alias etiam cum accessario quodam tumore. Iam etiam ipsum confluentem bipartito etiam scinde: nempe in confluentis succi tum qualitate tum quantitate. Quatuor igitur erunt in vniuersum contumacia vlcis & ægre sanabilia modi: nempe sola subiectæ carnis interperies, quam & *dyrrhamiam* vocant: interperies cum accessario humore influente, aut vitiosus, aut multus. Humor namque qui copiosior in partem vlcis laborantem influit (*tametsi vlcus non sit*) sanationem vlcis (*quod in eo exercementa creant*) moratur, atque in longum tempus protrahit. Ceterum quinquem modum adiecit videtur Galenus in *Commentario huius Aphorismi Hippocratis* *Pl. Hippoc.*

cera quæcumque animalis sunt, &c. nempe passionem ossis corrupti in loco vlcato. Vbi enim caro, quæ ossi subiaceat patienti, adhibitis (*vt oportet*) idoneis medicamentis, exsiccata, contraxerit cicatricem, statim quidam integræ sanitas restituta videtur. Rursus vero paululum aliqua influente sanie ex ossis corrupto, in parte penitior iterum aduenit inflammatio, & puris generatio consequitur, a quo cicatrix exorditur, raro vero exulceratur. Subiit autem Galenus loco *nuper ex 4. meth. citato*, interim dictorum affectuum siue dispositionum aut aliquos aut etiam pariter omnes miseri, atque ita multas, ac diuersas vlcum differentias iam supra commemoratas enalci. Porro tradenda est medendi methodus, non omnium simul, sed cuiusque speciei, quod in sequentibus faciemus, a simplicioribus quidem (*vt Gualdo quoque fecit, quem & Taccacium in omnibus sequuntur, & ideo si etiam eadem hæc reperies qua Taccacium dixerit & scripsit, idque et modo quo ipse imitatus est Gualdanum, nemini mirum videri debet, cum ipse Gualdanus Laurentium fecerit*) exordium sumentes, vt eorum curatione tradita, compoſitorum sanationis methodus facilius ac melius intelligatur. Ceterum quoniam passim cū de vlcibus tractatur, voces hæc,

Causa ante-
cedens, tum
ea quæ cir-
cumſilant,
ante vlcis
curacionem
diligenter ex-
ploranda.

sancti. *pau*, *virus*, *fordes*, & id genus aliz nobis occurrunt, non abs re. Cum putabimus, si hoc loco quid apud chirurgos & medicos significent, quoque inter se conveniant & dissideant, paucis aperimus, quamquam antea ex Fernelio de iisdem *et principio huius* § huius pergitur. Sed nunc sequentia ex Tagantio addicimus. *Sanies* proprie Latini est, qui Graecis *ἰσός* dicitur, qualis exit ex vulnere nec recente, nec iam sanescente, sed inter utrumque tempus: quihusdam *ichor*, sanguinis sanies interpretatur. Sanies duae sunt species, apud Celsum, Graecis distinctae nominibus, quarum una *ἰσός*, altera *μολικρία* nominatur: *ichor* tenuis, subalbidus ex malo vlcere exit, maximeque ubi nervo laeso inflammatione secuta est, ut alias ex *Longo ad Remmum mathematicum longiore sermone scriptissimus*, sed in aliquibus exemplaribus non *ἰσός* legitur, si d *ἰσός*. *Molieria* autem est crassior & glutinosior, subalbida, mellique albo subtilis similitur. Hae quoque ex malis vlcibus, ubi nervi circa articulos laesi sunt, & inter haec loca maxime ex genibus profluit. Apud recentiores autem & plebeios istius medicos ac chirurgos (quibus nusquam fere vilius vocis proprietas, & quae rei naturae conveniens sit, servatur) sanies communiter pro eo quod Latini apposite *pau* vocant, usurpatur. Genus tamen interduum sanies etiam faciente, ad *fordes*, *virus*, seu *virescentiam*, & *puru* etiam collumum, quam Graeci *μολικρία*, Romani *pau*, vocant. Nomine enim sanies, latius sumpto vocabulo, omnem humiditatem praeter naturam alteratam intelligunt. Itaque si tenuis sit humor, qui exit ab vlcere, *virus*, seu *virescentia*, si crassior, *fordes*, si vero mediocrius, generis appellatione, istius *sanies* nuncupatur. Et haec quidem in vlcibus (ut *aliis*) copiosa, in cauis vulneribus paucis reperitur. Est igitur sanies proprie vulgaribus medicis, & chirurgis, idem quod *pau* Latini & *μολικρία* Graeci: Cetero vero genus est, duas subs (ut *modo diximus*) species continens, Graecis distinctis nominibus, quarum una *ἰσός*, altera *μολικρία* dicitur. At Latinis Galeni interpretibus ubi possum Graece scribitur *ἰσός* *sanies* vertitur. Ceterum quod *μολικρία* Graecis, & Latinis *pau* proprie nominatur, ex sanguine vel carne confusa ortum habet. In eius autem generatione, semimala quaedam, ut *quisquam dixerit*, sit transmutatio, siue alteratio. Etenim enim tres in animalium corpore sunt alterationes, ut *lib. 3. Simplicius Galenus docuit*, una plane secundum naturam est, cum videlicet cibis in ventrem coquitur, aut in visceribus, & vas qui inibi generatur ficans, unde rursus pars vniqua quae nutritur. Altera contra plane praeter naturam est, nempe in putrescentibus omnibus. Atque haec quodammodo inuicem sibi contrariae sunt. Tertia ex utraque mixta & media est, partim secundum naturam existens, partim praeter naturam. Itaque transmutatio, seu alteratio, quae per generatorem medium inter optimam (qua *mixta est partim animalis*) & simpliciter malam (qua *cum putrefacta non sit vicia*) locum obinet. Neque enim a solo calore praeter naturam, neque a solo calore ingenerato & secundum naturam, plane vi-

cente, sit suppuratio, si v puris generatione sed mixtus quodammodo ex utrisque est calor inflammationis, quod cum ad suppuracionem convertitur, dolores, extensa simul, & calidissima praeter naturam inflammata particula: & si brevis, principio, id est, corde concallescito, excitantur. Atque haec duo quidem contingunt ex quadam veluti ebullitione, atque exultatione sanguinis, qui ubi ex toto exultus fuerit, si humidum eius sit pus, quemadmodum ex lignorum exultatione eius, ut *Galenus testatur* reliquis in *Commentario huius aphorismi Hippocratis*, *Quam pau conficiunt*, &c. Ex his igitur manifestum evadit, quod si *pau*, quemadmodum generatur, quae sit eius causa efficiens, & materia.

Nunc quid sit *virus*, seu *virescentia* & *fordes* apud chirurgos, paucis aperiamus. Virus ergo illis (ut *pau* ante quoque diximus, seu *virescentia*) si superfluitas subtilis, ex abundantia humorum aquosorum generata. Quae (inquit *Guido*) duplex est, calida & frigida, serosa & rubicunda. *Sordes* *Sordes*. autem eidem, est superfluitas quaedam crassior, ex humoribus crassioribus seu crassiorem substantiam habentibus procreata, quae quidem est triplex: quaedam enim, inquit, est spissa, inaequalis, coagulata, & alba: quaedam vero nigra: & alia velut fixa cruciata. Porro quod illi *virus* appellatur, Galeno Graece *ἰσός*, Latini *sanies* dicitur. Est autem sanies siue vires (ut *verbo vti docuit*) tenuius illud excrementum in vlcibus, quod ex humida reddit sicut *fordes* *crassum*, quod vlcus *rhypanon*, id est, *fordidum* efficit. Quamvis enim (ut *Galenus inquit 3. methodis*) omnem qualitateis alimentum mutationem, alterum crassius, alterum tenuius excrementum sequitur, ita & in vlcibus praefertim cauis, duplex excrementum provenire solet, nempe tenuius, quod Latine *sanies*, Graece *ἰσός* appellatur, & crassius, quod *fordes* dicitur. At ex tenui quidem excremento vlcus humidum redditur, ex crasso *fordidum*.

Quo fit ut vlcus ipsum duplicibus egeat medicamentis, vique ut humidum est, sic cantibus, ut *fordidum* ut quae expurgare possint. Sed haec sunt alterius contemplationis. Ceterum non diuam quandam aliquo modo substantiam fortitius pus, inter tenuem & crassum, si saltem laudabile atque optimum est. Optimum autem est (ut *scribit Hippocrates*) si album, leve, aequale, ac quam minime fecundum sit. At illud malum est Cello, quod multum, tenue, dilutum quae apparet, magisque si ab initio tale est, itemque si colore fero simile, si pallidum, si liuidum, si caecaleum est, praeter haec si male olet. Porro genus quoddam puris est apud eundem Cor. Cillum Graeca dictione *ἰσός* appellatur, quod in magis (inquit) vlcibus leni fecitibus apparet, tenue, subalbidum, quasi vinctum, colore, atque pinguitudine oleo albo non dissimile. *Sanies* autem mala est, multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quae et ipsum vlcus, & iunctam ei cutem erodit: nichil, non multa, modice crassa, subrubicunda aut subalbida. Itaque spes sanationis in his vlcibus maior est, ex quibus melioris generis quaeque praedictorum

Virus.

Sanies quid.

Pau medium est inter sanem & furdum.

Boni ac mali puris nota.

Pau ideale dicitur.

Male sanies nota, & moliora.

rum

Quid proprium sanies.

Sanies speciei duae Celsi.

Molieria.

Sanies vlcis proprie molis & suppuratur.

Virus, Sordes, sanies.

Quid proprium puris, & eius generis nota.

rum proueniunt. Sicuti & eius vlceris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit: Eam ob rem bonitatis atque malitiæ notæ, in horum singulis diligenter a chirurgo perpendenda sunt, vt & deprehendere, & prænuntiare possit, quæ vlcerata in nobilibus sint, quæque faciliem aut difficilem curationem habuerint, quæ res non paruum est momenti, vt chirurgus ipse & se aliis admirabilem præstat, & calumniam deuiter. Atque hæc de pure, & sanie & sordē dicta sufficiat. Nunc autem dicendorum ordo postulat, vt vlcerum signa subiiciamus, hoc prius more nostro interponentes exemplum.

OBSERVATIO III.

De vlcere alio quodam maligno non curato.

MERITOR quidam Theophilus dictus, cum vlcus malignum etiam in crure haberet, nec illo modo curari posset, quidam eadem consilium dedit, vt *agrimoniam* herbam superponeret basin die, mane: & sero: atque ita miraculi instar intra nouem dies sanitati restituitur est. Valet eadem herba, cum *clio succo* cum *sciamen* ad impositus, ad vulnera recentia tum antiqua. Et alius quidam, cum eadem intestinum rectum procerideret, ac ex hæmorrhoidibus doleret, puluere huius herbe assumpto tam in potu quam cibo, breui sanitatem recuperauit. Sed & in alio, cui lapis in vesica erat, cum crebro herbam hanc cum ovis comedisset, lapis per frustra cum lotio tandem expulsum est.

SCHOLIA.

179 **V**L CERIS cuiusque suæ sunt proprie notæ, quibus vnum ab altero distinguitur. Hæ autem ex singulorum disinctionibus petendæ sunt. Quo circa (cum de signis dicere institutum sit) præcipuum supra memoratarum differentiarum breuissimas definitiones hic obiter recēdere operæ precium duximus. Quod dum facimus, non tam verba, quam rem ipsam lectori spectare volumus. Malinissimum enim communibus, & ab omnibus chirurgie professoribus iam dudum receptis vti definitionibus, licet aliquantum rudibus, plebeiis & non ita elegantibus, quæ recipere se satis obsecro, verborum lenocinatis, & terrore sileo tenebras offundere crassam tamen illam & lupinam barbariem, quantum nobis licuit, hæc quoque deuotissimus. Ergo vt semel dicamus, *vlcus venereum*, quod & alio nomine *sanctissimū* dicitur, est in quo virus, hoc est, tunc quoddam, ac liquidum excrementum, quod *sanctissimū* proprie Latinis appellari diximus, extra erofionem abundat. Vlcus quod sua malignitate siue malitia, partem quam iam occupauit, erodendo atque interdum *estharam* (quam acris mordax quæ succus ad ipsam confluens excitat) gignendo, maius atque amplius indies efficitur, *corrosivum* seu *arrodens* nominatur. Sic Fernellius: *Sine tumore vlcus sit excedens, quod partem cui insidet, effundat excarnat exteriorē.* Quod si eius malitia adeo

creseat, vt non modo viceratas atque corruptas carnes, sed etiam sanas absumat, depopuleturque, *vlcus iam depascens* appellabitur. Sed & *depascens* (Græce *nomodes* appellant) quod non solum affectam partem exciuit, sed & vicinas quoque integras absumit, & quasi depascendo depopulatur. Græci omnes medici hunc affectum, *Neme*, Galeno etiam nomen, nominant, propterea quod pergere pascendo id vitium ab agris particulis ad easque integras sunt, locat, atque harum semper aliquid agris adducere. Cuius species est *phagedæna*, *ambulatorium vlcus* appellant, quod hæc atque illæ serpendo, cutim ac subiectam carnem, sed etiam tantum ac superficiale, depascitur ac rodit. Nunquam enim eiusmodi vlcus in penitiora penetrat: quo fit vt vlcus in summo residens, minime autem profundum dici merito debeat. Sic & Fernellius: *Phagedæna serpens quidem vlcus est, ambulatorium, sed si iam cutem, non autem subiectam carnem rodens ac depascens.* Omnium causa est biliosus, acris & mordax humor, alias crassus, alias tenuis conserit in partem effusus. Succedunt ea *herpes* & *erysipelas*, interdum & vulnere, quod acris medicamentum exasperauit. *Vlcus sordidum* est Galeno quod crassiore illo, ac viscoso scatetcremento, quod *sordidum* appellauimus. Græci *rhyparon* vocant. Recentiores vero aliter definiunt, nempe quod *crassus* aliquis habet *erassus* seu (vt loquuntur) *grossus*, aut carnem atque mollem, *crassum* & *superficium*. Vlcus *putridum* dicitur, ex quo vapor aliquis graueolens, seu (vt aiunt) fumus quidam sordidus & cadauerosus exspirat, atque attollitur, per similes illi qui a putrescentibus ac corruptis iam carni-bus effertur, habetque semper annexam sibi sordiditatem, atque extraneam caliditatem cum humi-ditate superflua, & plerumque febrem. Hoc a sordido differre volunt sola malitia, ac fraudulentæ intentione. Sic etiam Fernellius: *Putridum vlcus, in quo non insidit quod exiit, sed ipsa quoque vlcis in caro computrit atque molliis glutinosa, & cadauerosa iam reddita terram grauem, odorem exhalat.* Hoc enim nisi plenumque coarctetur, in sphacelum deducit. Oritur nonnunquam ex sola humoris perniciē, si d hinc tamen frequentius, quod partis insitus calor vel ab arteriarum obstrukcione, vel alia quauis ex causa sit exstinctus, neque iam possit partis substantiam & integritatem iuvari. *Cancerisim vlcus* appellatur, cuius orificium strictum est, atque angustum: profunditas vero latior & sensum effugiens, siue occultata, multoque anfractu habet, & cuniculos, siue vias hinc inde discurrētes, citra tamen callositatem & duritiem. Sunt qui & appposito nomine *cuniculosum* ipsum appellant. *Spississimū vlcus* nuper descripto cuniculoso seu cauenoso vlcere non differt, nisi quod meatus illos anfractu-osos & sinuosos, callosos habet & duros. *Vlcus cancerisimū* est visu horrendum, siccitudo, labra hæbeo duræ, crassa, tumida atque in uersa colore inter rubrum & nigrum medio, vtpote fulco, aue luido: ad hæc circa locum viceratum vena quæ-

*Vlcus depas-
cens seu no-
modes.*

Phagedæna.

Vlcus ambulans.

180.

Vlcus sordidum.

Cancerisimū vlcus.

Vlcus putridum.

Spississimū vlcus.

Vlcus venereum seu sanctissimū.

Vlcus corrosivum seu arrodens.

Vlcus cuniculosum seu cancerisimū.

Vlcus spississimū seu cancerisimū.

Vlcus dicitur
negl. id est,
intemperatū.

281

dam liuidū apparent, exalata, turgidæ, crassæ & nigriore sanguine plene. vt de cancro vicerato, vbi de tumoribus præter naturam diximus. *Vlcus dyscratū*, siue vt vulgus chirurgorum dixerunt, fuit, dyscrasiatum, est in quo quidam *luxuria*, id est, intemperies, seu mala qualitas præter naturam dominatur, vt caliditas immoderata, vel frigiditas, aut humiditas, vel siccitas, aut plures ex illis simul. Nominatur autem proprie nobis *vlcus cum intemperie*. *Vlcus cruciatū* siue *dolorosum* appellatur, quod laborantem atrociter molestat, seu (*vt ait Galenus*) in quo sensibilitas rei contrariæ reperitur, Græce *ἰσχυρὸν* dicitur pot. est. *Vlcus rheumaticum*, Galenus dicitur, quod aliunde fluentes humores vtantur se necesse. *Vermiculosum vlcus* appellatur, quod vermibus scaturit, *sceleratū* à Græcis dicitur: horum autem vermium (*vt Scholius præcedente diximus*) opifex est putredo. *Vlcera cacothæ* Galeno & Græcis omnibus medicis dicuntur, quæ omnibus rite deconterque factis, sanari tamen non possunt, quod scilicet in particula laborante siue vicerata, malignitas quidam adsit cæca, & nobis occulta, ea sanari prohibet. Nos eiusmodi vlcera, maligna, consumaciæ, rebellis æque ægre sanabilia dicimus. tale erat quod mercator, *vt in obs. præcedente diximus* laborabat. Sed & hæc enim difficile ad cicatricem ducantur, Græcis *δυσπλοῖον* nuncupantur. In hoc genere sunt *Teliphus*, atque iis deteriora *Chironia*. Ea fere magna, nō tamē putrida sunt, neque tædium odorem expirant, neque depascunt, neque dolere exerant: sed oras habēt tumentes, præduras atque callosas: proinde non facile senescunt, sed cicatrice interdum obducuntur tenui, quæ mox disrupta vlcus renouat: exulcerato cæcū fere simili, nisi quod tumore nullo obducitur in ambitu. Huius præter vulgare humoris vitium, cæca quoque malignitas (*vt Fernellus dicitur*, causā statuens, quæ vix abigi proligariue potest). Talia fere ex pestilentia relinquuntur solent. *Variicosum vlcus* nominatur, quando in partibus eo suspectis vena quædam eminentes, ac turgidæ crassæ sanguine, aut vitioso aliquo succo oppletæ apparent (*varicæ* vocantur) quæ ipsi vlcis fluxionem suppeditant, atque ita sanescere ipsū vetant. *Apostematofum vlcus* nuncupant, in quo tumor aliquis præter naturam est, ab humore quopiam procreatus, vt phlegmone aut erysipelas. Cetera latis ex præcedentibus innoscunt. Nunc ad prognostica deueniendum, hoc prius interpolito exemplo.

Vlcus cruciatū.

Vlcus rheumaticum.
Vlcus vermiculosum.

Vlcera cacothæ.

Vlcus dysplocum.

Vlcera Teliphus, Chironia.

Variicosum vlcus.

Vlcus apostematofum.

quidam in viceribus paruis excoctibus cutem & carnem in tibia ciuissim Minoriæ, quæ vlcera continuo madebat, prius super foraminibus vicerum apposuit emplastrū locis excoctis ex *cerofulthar, amr, myrrha, & oleo* rosæ coctis ad dunticem conuenientem, sed interim succo fenemine excoctis tunc vlcera lauabat, deinde pulvere *aristach, longæ & haccarum* sanari in splendorum pannum lincum in succo fenemine madefactum circa tibiā excoctam voluabat, superinductis fasciis a talo ad genu vsque, & ita tibia excoctata ab omnibus viceribus sana est.

SCHOLIA.

VENIENDO ad vlcera prognostica siue iudicia, sciendum est quod vlcera hæc maligna ob easdem occulta sanari non poterunt, nisi cum his quæ vim quandam occultam quodque in curatone similiter habuerunt. At vlcera, inquit Hippocrates, quæcumque annis sunt, aut ætate sunt iuniora, et obsecrare est necessarium, & cicatrice carni fieri. Quæcumque vlcera (vt Galenus ait in Commentario laniis apostematofum) longo tempore manent, vel cicatrice nullo modo adueniente, vel si facta sit, rursus resoluta (*in obs. de cicatrice medicis: in curatone delinquentibus*) cacothiam, hoc est, malignitatem quandam ostendunt, diffiniterque ad sanitatem reducuntur. Id autem accidit, vel propter influxum vitiorum humorum, vel propter dispositionem in membris ex humeribus in id confluentibus processu temporis contractam, vel ob aliquam vitiatam & corruptam obliuissim est. Vlcus quine (*vt scribit Amicemus*) quod postea quæ casu implentur est, & cicatrix illi induci debet, subito remouatur, periculū est ne in fistulam degeneret. Eadem mala vlcera iudicantur dura, & quæ ad virorem aut nigritinem vergunt. Eiusmodi enim color natiui particule viceratæ caloris extinctionem insignat. Vlcera (*vt idem scribitur*) frigida, albedine & mollitie dignoscuntur, & præsertim si calidis timentur. Calida vero ad ruborem declinant, & frigidis gaudent: sed & tactu etiam discernuntur. Itaque horum utraque agnosces, partim colore, partim tactu, partim, vt Galenus inquit) laborantis sensu. Quippe alias vllionem sentire se fatetur, alias mamellum trigus in particula, gaudens quod frigidis medicamine nris, vel calidis: & aliis quidem rubor leuis insidit, alius color magis albeat. Sicis quoque atque humidis vlcibus lux sunt propriæ nocte, quæ tactu maxime deprehenduntur. Hic namque sensus sicca atque humida, & quæ eas qualitates consequuntur, durum scilicet, mollium, asprum & leniorem experitur. Ad hæc si maligna vlcera totius corporis colorem repræsentent, vt verbi causa, candidum purpureum, aut fuscum vel cinereum extraneum, vitium aliquod etiam dignum hepatis, aut infirmæ sanguini, ac ipso necine procreato, corruptelam inefficacem significat. A. d. b. a. b. b. & liud: Vlcera quæ alio morbo insedant, ægre sanantur sunt. Aliud: Vlcera autem quæ a prius sunt, cum glabra sunt.

Vlcus prognostica siue iudicia. A. d. b. a. b. b.

Vlcus cruciatū.

283

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

Vlcus cruciatū.

hoc est, non videri pilis a circumiacentibus vlceri locū dīfueri, vel extem *ſquamulæ e ſumma parte dimittuntur, ſeu, ac indicato mō vlcus primum eſſe.* Prænos namque humores ſeu malignos ſuccos ad partem vlceratam tunc confluere veriſimile eſt, qui vehementer vlcus erodunt. Itaque eiſuſmodi maligni ſucci, neque radicales pilorum omnes abolere queunt, neque exulceratum locum ad cicatricē perducī ac ſolideſcere patiuntur. Cum autem pilli, qui prius deciderūt, tu iis, quæ circiter vlcus ſunt, ſidibus reſcalcantur, bono indicio eſſe ſolent. Vlcus quoque

Vlcus ante mortem vel in ipſo morbo aſſignū.
primo lib. Prædiſtinnam ſcribit Hippocrates ſive ante exiſtit, ſive in ipſo morbo natum eſt, diligenter oſervari debet: nam ſi moriturus æger

283 eſt, aridum & liuens, aut pallidum ante mortem apparet. Vlcera in quibus poſt longam ſaniet ſive virulentæ emiſſionem pus laudabile apparere incipit, bonum nobis præſentunt. Siquidem & naturæ robur & matricis obediētia notatur. Quæ autem ſint puris optimi ac laudabilis notæ, in præcedentibus dictum eſt. Vlcera quæ in

Vlcera in quibus partem paritulaſa.
extracorporalia muſculorum doſi vel tibiarum, aut brachiorum ſunt, periculo non vacant. Alioquin. Valde etiam periculosa eidem cenſentur, quæ interna membra occupant, aut ad ea vique perueniunt. Quibus vlcusbus ante al ſolutam deteſionem *ſarcotica*, id eſt, *carnem producentia medicamenta* adminiſtrantur, mala ac ſuperflua caro in illis generatur. Quæcumque vero probe & oportune expurgata, ſemper ad ſiccitiam promouentur, his caro *(inquies Hippocrates)* magna ex parte non ſupercrescit, niſi ſi contuſi ſunt. Vlcera in *aribem carumidella*, hoc eſt, *ratenda peſſima* (ut de vulneribus dictum eſt) eſſe ſolent, ac tarde magnoque negotio ad cicatricem perducuntur: proinde pueros ſubinde in perniciem trahunt. Itaque in eis conſilium chirurgorum eſt, ut cantheria figura illa orbiculariſ aboleatur, & linæe modo (quæ utrum ſaltem fieri poterit) in reſcūm diducantur. *Artium ſive extremarum partium vlcera*, ut pedum aut manuum, ſæpenumcro phlegmonas, aut alios eiſuſmodi præter naturam tumores in adenoſis partibus, ſeu glandulis (quas Græci *adenæ* vocant) accerſunt, atque excitant, præſertim vero vbi corpus plethora laborat. Hæc enim partes fluxum imbecillæ ſunt & raræ, facile tentantur quæſionibus. Si igitur ſit, ut & propter vlcus, quod in manus aut pedis digito ſit, eiſuſmodi glandulæ in inguinibus & aliis tum intumefcant, tum phlegmone occupent, cum de fluentem ad vltimos artus ſanguinem, aut alios quoliſ humores, priorie acceperint, & exceptos, ob eam quam habent laxitatem, & tartaſtem retinuerint; quin etiam cum in oculo, capite, vel aliqua vicina parte vlcus eſt natum, intumefcant. Nominant autem *(inquies Galenus)* ipſos adenas, cum ſic intumuerint, bubones. Cum medicamenta adhibita vlcerebus conſerunt, aut ſalutē nihil nocent, argumentū eſt, ea rite ac decenter adminiſtrata eſſe. Cū vero noxæ aliquid adſcruerit, & vlcus humidius educunt, aut ſic

eius, calidius, aut frigidius, indicium eſt, ea nō eſſe ſolenti morbo idonea. Eruntque magis deſiccitia, aut humectitia calidiora aut frigidiora, put res poſtulabit, deinceps admoenda. Quod ſi ex admodis vlcus eſt mollius redditur, adſcribitoria ſtatim erſa adicienda. Ceterū ſi *vlcus eroditur & profundius efficitur, ſe dulo aduertendū eſt, niſi id ex acutiſ ſuccorum vitio, & vlceris malignitate accidat, an ex facultate medicamentorū* (quæ admodum) plus quā oportet detergentium. Hæc eſt vlcera particulā arrodendo occultam ſanietem procreant, & vlcus humidius reddūt. Quo ſit, ut imperitos chirurgos atque impudicos ſæpenumcro ſalk contingat: qui dō putant vlcere acceſſa, id eſt, malignitate, eiſuſmodi ſanietem colluuiū, ſeu (ut ipſi loquuntur) virulentiaſi atque ſuperflua humiditatem puenire quæ ad huc efficaciam detergunt, pperant admoere. atque ita profundius & magis cauſi vlcus, imo vero & calidius, ac etiā interdum phlegmonodes efficiūt. Hinc eroſionē, ac mortificationis ſenſum laborantes perſentiſcunt. Sed hæc non minus ad curandū rationē pertinet & videntur. quam ad ſigna prognoflica, de quibus nunc agimus. Porro inter cetera quæ magis officiunt vlcetibus, venus eſt (ut Guido a Caulicaco Pontano: *armatus*) meridionalis, atque aeris ambiētis humiditas caliditati adiuſta. Hæc n. vlcetibus, putredinem inuehunt, niſi quid quæ putrefcunt omnia ex calido & humido ſic acciſcuntur. Hinc fit (inquies) ut tibiarū vlcera Avinionē ægrius ac difficilius multo curentur, quā Pariſis. Contra vero accidit in capitis vulneribus. Ceterū quæ modo plurima vulnerū iudicia vlcetibus etiam communia ſunt, ita & vlcetum, de quibus modo diſceſimus, iudicia per multa vulneribus adaptari poſſunt. Quocirca quæ in iudiciis vulnerum dicta ſunt, vlcetibus conuenientia, huc reuocanda erunt: reliqua vide apud Iohan. de Vigo lib. 4. de vlcetibus cap. 2. de diſtinctione vlcetum. & Beccapaliam tract. 3. de vlcetibus & eorum curat. & c. l.

Ceterum de curatione vlcetum in vniuerſum duo nobis ſpectanda proponuntur, nempe iſtius vlcetis quæ vlcus eſt, contemplatio, & vlcetis cum ſua cauſa, aut ſymptomate aliquo aut alia quauis diſpoſitione complicati, aut etſi hanc vlcis illam particulam occupantis cōſideratio. Omne enim vlcus, ut ſuprà diximus, aut ſolum eſt, ipſumque per ſe, hoc eſt, nulla alia aſſeſſe, vel cum ratione vlcetis, eo ſimil inuadentis, vel ipſum præcedente, aut, ut quæ, aut cum alio quopiam vno multive conſiſtit. Quorum alii non modū ſtatim ab initio vlcus excitant, ſed etiam nunc maius efficiunt, alii eius ſine quo non, ad curandū operationem obtinent. Ceterum vlcus omne, quæ vlcus eſt, vnam communem habet curæ diſtinctionem. Quod ipſum & Galenus ait, & omnes poſt eum medici experientia certa confirmant. Si quidem vlcetis quæ vlcus eſt, ſanatio, medioſis ſiccatio eſt. Hæc autem diſtinctiono communis etiam eſt vulneribus curandis, quæ ſalutē vulnera ſunt, id eſt, plæge vulnerando acceptæ. Sed hoc diſcrimen habent, quod hoc minori, illa,

284
*Si vlcus a-
 radatur.*

Nota.

*videntiaſi eſt
 hui vlcetis.*

*Vide Hippoc.
 & Galien. &
 Therap.*

*Vlcera
 tunda.*

Artium vlcera.

*Calid. capi-
 tu vlcera.*

Bubones.

*Si auxilia
 profuerint
 aut, necu-
 riant.*

*Cervicis vlcera in un-
 uerſum.*

*Duo ſpeltan-
 tu, mercurio
 tione vlcetis.*

284

*Vlcus ſanatio,
 medioſis
 ſiccatio eſt.*

(quod *humidiora sunt*) maiori dasectione indigent. Verum enimvero vlcera, quod cum alio affectu coniunctum est, cuius videlicet praecedere curationem oportet, eius curatio vt vlcera solius non est, sed prior illius affectus, secunda vlcera. Nam siue phlegmone quae prius, siue erysipelas, siue tumor is, qui oedema dicitur, siue nigritas, siue ecchymosis vlcera tam carnem obderit, primum meliendi eius curatio est. Quod si valentior aliqua intemperies (qua imbecillitas efficitur) partis causa esse solet) exulcerata carni addit, huic nimirum primo intendendum erit. Vbi autem intemperiei affectum iam sanaueris, exulcerationis postea affectum sanabis. Ita quoque de varices, quae saepe supra exulceratum locum sunt, prius sanabimus, vt deinde mos vlcus sanemus. Ceterum nulla barū curationū (inquit Galenus) ipsius est vlcera: sed alterius cuiusquam affectus, qui vlcus vel gignit vel certe fouet. Porro duplex in eiusmodi cum vlere complicatis dispositionibus consilium est ipsi Galeno lib. 4. *methodi meliendi*: nempe vt vel eiusmodi affectus e corpore prorsus eximas, vel in eodem quod inferunt, vincas. Verum hoc (inquit) vbi exiguis plane affectus est, fieri licet: vbi magnus est, duci ad cicatricem vlcus prius non poterit, quam illi affectui remedium attuleris. Talium igitur vlcera, quae sic cum aliis affectibus complexa sunt, quatuor sunt particulariter curandi intentiones. Prima vitæ rationem sanādis eiusmodi vlcerebus accommodat praescribit. *Secunda* materiam antecedentem auertit & intercipit. *Tertia* symptomata & dispositiones, quae cum vlcere complicantur, corrigat & summouet. *Quarta* correctis & profligatis iis dispositionibus, quib' vlcera complicantur, e amore vulnerum concauorum sanare praecipit. Ceteris primā & secundam intentionē assequimur, humores copia aut praua qualitate noxios, quibus laborāns corpus fearet, quique in partem vlcera tam influunt, tunc corrigēdo, tum vacuando & auertendo, fluxionemq; ipsam sciendū.

cepit Hippocrates. Talis enim deliquata meatu adstringit, per quos materia ad particulas vlcera tam influunt. Sed & quae ipsi vlcerebus admoventur pharmacia, sicce valentius oportet, quam ea, quae simpliciter admoventur vlcere. Quod si siue compellat; medicamentis influxus nequeat, causa eius inuestiganda est, atque hae prius adimenda. Ac si quidem ob partem, quae fluxum recipit, imbecillitatem id fiat, huic nimirum meliendum est: fuerit autem vlcera quoque partis propria quodam curatio. Nā propter sanguinis copiam, vitioque fuscum, vel corporis totius, vel alicuius suprapositum partium, illa scilicet prius sunt corrigenda. At imbecillitas quidem partis, propter quam plus iusto succorum illi influit, omnino ab intemperie prouenit, non tamen ab omni. Eoque fit, vt exulcerata caro non nunquam intemperata tantū sit, non autem imbecilla. Quippe imbecillitatis affectus partis, valentior intemperies causa est. Quomodo autem curari debeat illa dyscrasia siue intemperies, mox in sequentibus dicemus. Ceterum qua ratione quibusve modis fluxiones, quae vel a toto corpore, vel a membro quopiam in particulam vlere laborantem irruunt, interciperi atque auertere oportet, supra in tractatu de tumoribus praeter naturam abunde dictum est, & ex iis locis petenda hae sunt. *Tertia intentio*, quae symptomata & dispositiones, quae cum vlere complicantur, corrigat & summouet, perficitur, prout cuiusque symptomatis & affectus eum vlere complicati natura requirit ac deserviat. Porro (si Galenus sequimur, lib. 4. *methodi meliendi, quemadmodum & Gensio facit cap. 1. de vlcerebus in vniuersali*) tradenda est meliendi methodus, non omnium simul, sed cuiusque seorsum. Ita quae Galenus ipsum imitant, exordium sumamus ab intemperie, quae cum vlere complicatur, corrigenda. Reliqua vide in locis iam citatis, & cap. 3. *Joan. de Vigo lib. 4. de vniuersali curatione vlcera tam.*

287

OBSERVATIO V.

De quodam habente vlcus calidum in tibia.

QVI vlcus calidum in tibia habebat, cum intemperie calida, huic corpus decenter purgauimus cum infuso rhabarb. *Hy. viol. & ex infuso ros. cum decocto aluerant & refrigerante cum aqua casta*, etiam myrobalaanis citrinis, ob fluxionem: deinde vlcus lauari mandauimus cum aqua plantag. ros. & similibus: deinde vng. commodode dasectionum & incarnatum etiam refrigerans in tibia maxime ceperunt praescripimus: *Hy. cornu 3 j. litharg. 3 j. mastice, carall. rubei, reser. sang. drac. campobora ana 3 j. vng. popul. quatuor. B. olei ros. viol. aquae solatri, plantaginis q. s. lapidis calameuensis, assis. sepiā ana. parum. fuit vng.*

SCHOLIA.

lib. 4. method.

GALENUS de curatione vlcera tam dyscrasit, id est, cum intemperie iuncti, hunc in modum scribit. *Carnu intemperie, si signalius sicceque vide-*

In tollendis dispositionibus cum vlere complicatis duplex consilium esse.

Particulares in curandis vlcerebus supra

De primo & secunda intentione.

Si succus qui influit, nec exipiscit, nec maliguit.

ter naturam tumore exulcerata sunt, earum prius sanandus tumor est: fieri enim non potest, ut vlcus, tumore manente, ad sanitatem perducat. Quocirca omni studio laborandum est, ne phlegmone, aut quilibet alius tumor in loco vlcerato excutitur: quod si id prohiberi non possit, remediis dicatis curari debebit, vlcere tamen interim non neglecto. Quae autem omnis praeter naturam tumoris curandi ratio sit, in praecedentibus fusissime, scilicet in libris de tumoribus praeter naturam, dictum est. Compendiaria igitur obfcurarum phlegmone partium vlcerarum curatio, per id genus praesidia obitur Galeno, quae sane vel aff. cum prosus summovet, vel si quid exiguum, quod suppuret, reliquerint, alterum medicamentum aere, quod educere pus queat, requiritur: vel si tenuis circumposita crassitas sit, velisq; celerius explicatum zgum, sectio petenda est. Quod si cataplasmate ex hordei farina, aqua & oleo, quod calfaciat humectetq; illinantur partes vlcerae, quae phlegmone infestantur, lenientis (ut Galenus ait) tractatio est, non medentis, & contra malum pignantis. Id enim non ex prima ratione fit, ut remedium affectus, sed ut symptomatis mitigatio. Si quidem ipsius phlegmones remedia (ut auctor est Hippocrates) sicciorum sunt virium. Itaque si inflammatio vlcera aut etiam vulnera adhuc recentia obideat, vlcus est medicamentorum, quae desiccant atque inflammationem arcunt. Ex liquis (inquit Paulus) laudatissimum est vinum, deinde posca. Si vero sordes quoque cum inflammatione occupet, multa diluta conveniunt. Ex iis autem medicamentis quae siccandi potestate praedita sunt, communiter quidem conferunt, inflammationibus dicta, quae in libris de tumoribus praeter naturam scripta sunt, si oleosa acrique excipias: prius autem hoc proficit. Masum punicum dulce vino incoctum tritumque illioitur. Mirabile nimirum & (ut Paulus ait) multiplici usu commendatum est remedium. Facit enim tum ad capitis tum naturalium vlcera, tum etiam ea quae in toto corpore excruciant, oculorumque inflammationes. At si erysipelas aut cuiusmodi quippiam vlcera accesserint, utendum praesidiis, quae aduersus illa superius in libris de tumoribus praeter naturam scripta sunt.

OBSERVATIO VIII.

De cūctatione, in qua motus erat de abscesu frigidiora.

PRÆTUS Sabotus zythepia Delphensis distichus, annos 1558. cum cecidisset in genu, mense Decembri, post decem dies demum cum accitus sum cum chirurgo. Genu autem eo tempore circa patellam valde inflatum erat, sine inflammatione tamen. Chirurgus metuebat abscissum frigidum. Sed iniuncto oculo affecto oleo chamomillino, fistula reseruitur, & salina ac chamomilla flor., simul decocta sunt in ceruicia crassiore (quae adhuc ad refrigerationem ponitur) & cum panco lano inuncto saepe patellam chirurgus fouebat a genu: deinde inunxit cum oleo chamomill. posca pl. chamom. & denitibus cum gummi, fa-

scia semper diligenter circumiecta, facta resolutione breui curatus est, non accedente abscellu aut vlcere, de quo prius metus erat.

SCHOLIA.

DE simplici contusione, tum ea quae cum vulnere sit, in praecedentibus diximus: at nunc breuiter hic de vlcere contusivum, ordinem & cūctationem (ut polliceri sumus) iudicamus. Galeni ex Hippocratis testimonio sententia fuit, vlcera omnia, praeter ea quae contusa sunt, si cari oportere. In iis vero quae cum contusione facta sunt, quam celeriter pus mouendum esse. Si quidem necesse est carnes sic contusas putrescere, ut noua tandem caro gignatur. Pus autem ipsum siue carnis contusae suppuratio, cum aliqua putrescentia fit. Porro quae putrescunt, omnia ex calido & humido sic afficiuntur. Proinde sit, ut ea quae calefaciunt & humectant, omnibus afficiantur, his, quibus moueri pus expedit, semper admoeamus. Cataplasmata igitur ex hordei farina, aqua & oleo ite in quae ex pane, aqua & oleo componuntur, conueniunt. Praeter ea fomentum multae calidae aquae, & tetrapharmacum. Cataplasma supra naturam. Aqua calida. Tetrapharmacum.

DE simplici contusione, tum ea quae cum vulnere sit, in praecedentibus diximus: at nunc breuiter hic de vlcere contusivum, ordinem & cūctationem (ut polliceri sumus) iudicamus. Galeni ex Hippocratis testimonio sententia fuit, vlcera omnia, praeter ea quae contusa sunt, si cari oportere. In iis vero quae cum contusione facta sunt, quam celeriter pus mouendum esse. Si quidem necesse est carnes sic contusas putrescere, ut noua tandem caro gignatur. Pus autem ipsum siue carnis contusae suppuratio, cum aliqua putrescentia fit. Porro quae putrescunt, omnia ex calido & humido sic afficiuntur. Proinde sit, ut ea quae calefaciunt & humectant, omnibus afficiantur, his, quibus moueri pus expedit, semper admoeamus. Cataplasmata igitur ex hordei farina, aqua & oleo ite in quae ex pane, aqua & oleo componuntur, conueniunt. Praeter ea fomentum multae calidae aquae, & tetrapharmacum.

OBSERVATIO IX.

De superflua carne in vlcere.

CARO putrida cum excresceret in vlcere in muliere, pulvis remissum corrosiuum descriptum a Bertapalia de vlcere cap. 11. de carne addita super vulnera remouenda, qui minuit carnem mollem, & sine molestia, inspergebamus. Cuius haec est descriptio: *res. carices granat. gallica. & spongiae adustae*, & fiat pulvis, & ipsa spogia adusta sola minuit carnem sine dolore & zeri molestia. In altero quoque vlcere situm, & in multis frequentissime, *eng. & egyptiacae* corrodit enim carnem sine mordicatione, ut etiam pulvis solus *hermodactylorum*. Sed & trochisci ex arsenico apud eundem descripti. Vide eodem loco citato alios pulueres, & vnguenta quaedam ad hanc rem aptissima.

SCHOLIA.

De curis in
vulnibus ex-
crecentis,
quoniam Graeci
hyperfaze-
on nomen
sunt.

CARO in viceribus supra quam par est ex-
crefcens medicamentis exsiccantibus tol-
litur. E. quorum sane numero sunt *apbriges* (cu-
ius tria sunt genera apud Diofco.) inasperum aut
cataplafmatum instar inducitur, *squamma aris*,
*omni*que *testacea* combusta. Item *ecbum*, hoc est,
erinacei utriusque, ita res restres quam marini, cum
toto corpore concremati. Verum hæc non ad-
modum eximie, sed modice ac mediocriter dū-
taxat purgant, & supercrefcencia compescunt.

*Alia lapidei
sunt.*

*Salere cre-
mæ.*

Alia vero petra *fles* longe validius, & eo magis *fi-
ry*, *chryficilla*, *chalcetis*, *myfi*, combusta tam en-
nibus vellicant & rodunt: sed & *zris fles*, *chalcant-
his* dictus: & omnibus valconior *argæ*. Sales
quoque concremati, carnes cum humore flac-
cidas consumunt, ac liquefaciunt. *Lanamentum*
paucentis *disceps*, muria acriori imbuta, & de-
nouo resiccata, atque imposita, mediocres carni-
um supercrefcencias liquefaciunt & exedunt.

395
*Faulstini pa-
stili.*

Sed magis *Faulstini* *pastilli* a *Paulo* *lib. 7*. descripti:
12. auripigmentum 3 x. sandaracha (quæ rubrum est
auripigmentum, & a natura magis excoctum)
*3 vi. calcis rosæ 3 vi. 12. caria combusta 3 j. myrti
baccarum* succo vel decocto excepta in *pastillos*
redigito. trii inaspergantur. Valent & *cortico a-
spicodolom*, *Agropyrum ung.* & *apostolom*.

*Eng. Egypti.
Apostolom.
Cantus.*

Ceterum dum hæc caustica atque erodentia me-
dicamenta admoventur, partes quæ in eis cœta
sunt, refrigerantia desiderant, ne scilicet io partem
viceratam ex rosione, calore & dolore, hu-
morum fluxio aduocetur. Deinde crustæ vlc-
eribus inducitur resoluenda erunt, & vlcus ad sa-
nitatem perducendum. at de vlcis cum duritie
& tenebrositate seu decoloratione labororū, cu-
ratione, etiam hæc adsumus, nam etiam huic spe-
ciat. Cum labra tantum vlcis decolorata du-
rave plusculum fuerint, excidenda ea sunt (*Gal-
leno* auctore) ad sapam vsque carnem. *Auscennas*
autem decolorata eiusmodi duraque vlcis lab-
bra scarificanda esse præcipit, & ab eis sanguinē,
admotis etiam cucurbitulis, extrahendum. Sangu-
inem caute, quod sanis esse videtur, educto,
spongiano siccam, hoc est, nullo liquore maden-
tem, ac postea etiam medicamenta quædam re-
siccantia superimponere iubet. Sed de iis ante
Auscennas ad eundem fere modum sciipserat

*Vlcis cum
duritie & de-
coloratione
labororū em-
pæm.
Zucifis.
Scarificatis.*

Hippocrates, qui certe nihil omniuo corum,
quibus ad vlcis curationem est opus, omisisse
videtur. Hic enim non solum vlcis *apostolom* (*apostolom*
Galeno teste) quæ citra alium aff. ctum consi-
stunt, sanandos iun rationem inuenit: ut quæ
ficem *so*, ut supra dictum est, consistat) sed etiam
priusim per species aff. ctum cuiusque. Si quidem
vellundam, vel nigrum vel rubrum conspici-
tur, & scarificando, ac sanguinem emittendo:
mox spongiam statim ficiorem magis, quam
humiliorem, hoc est, siccam potius quam hu-
mectant superimponendo: post hæc vero etiam
si cautia remedia applicando: ab his, si res
polluket, rursus sanguinem auferendo, ac mox
iterum talia peragendo, donec parts omnino

sanitas sit: quod si labra vlcis dura, callosique
appareant, etiam ea excidendo; cum vero am-
plius progressus huiusmodi aff. ctus est, delibe-
ratio incidit, excidendumque omne id sit, quod
naturæ visum, an spacio potius curandum: pro-
culque dubio est, ægri animum hoc casu consu-
lendum esse. Aliqui enim longiori tempore cu-
rari citra sectionem malunt: aliqui quidvis sub-
ire, dummodo citius san- tur, sunt parati. Ce-
terum excidere (ut *posse* *Galenus* ait) res est pro-
tissima: maius vero quippiam atque artis egen-
t, medicamentis sanare. Huc quoque spectat vari-
um cum vlcere complicatarum curatio, quod
prius sanemus eas (nam ab eis contumax ad sanan-
dum vlcus redditur, quippe quod ex his hominibus
aliqua ad vlcis atque parit desinat) deinde mox vlc-
us. At quomodo varices curentur, diximus *lib. 27. obs. & curat. medicinalium nostrarum*. Si noque
illa curatio tibi satisfaciatur, his adiunge *cap. 12. lib. 3. Tagamus, de vlcibus*. Vide & *Æginetam lib. 6. cap. 5.*

296

*Varietum &
vlcis com-
plicatarum.
curatio*

OBSERVATIO X.

De vlcere vermum.

VERMES cum non solum in auribus & in in-
testinis generentur, sed etiam in abscessibus, &
apostematibus, ut *Albucafi* & *Auscennas* no-
tunt, imo etiā in virga & vena, ut alius accidit
se constat (teste *Bertapala* de vlcibus, *cap. 5. de ver-
mibus orientibus in vlcibus*) ita & in vulua cuius-
dam puellæ apparuere, & sub cranio cuiusdam pueri
in contusione cranii cum fractura: nam in quo-
cunque loco materia apta est, ibi efficitur scqui
potest. Ceterum cum hic *Dolphis* in vlcere quodam
vermes adessent, vnguentum in vlcibus ad
vermes descriptum ab eodem *Bertapala*, ad-
hibuimus: quod habet *olei amygd. amar. succi a-
rancorum acidiorum, vini melastici ana lss pul-
locyris, cantauræ ana ij. cera q. l. fiait vng.* Vide &
aliud vng. ac emplastrum quoque tum oleum pre-
tiosissimum apud eundem loco iam citato.

SCHOLIA.

VT vermes qui in vlcibus procreantur, ar-
ceas, primum quidem esse, ut humiditatem
putredinemque eorum opificem tollas. Itaque
vermes in vlcibus exortos interficiant, & pu-
tredinem simul auferant, succus & decoctum
abjunctus, & *agrimonia*, vel *centauri vel maritimi*,
calamitæ quoque officinarum (quod primum
genus est *calamitæ* *Diofco.*) succus iugiter in-
stillatus, atque id genus multa, quæ etiam auri-
um vermes necant. Priusim autem ad vermes,
qui vlcera infestant commendatur *Archigeni* &
Theodoro medicamentum quod recipit *coriæ
& polii parum mensuram*, cum *pect. liquidæ* illitum.
Conducit etiam magnopere *lanamentum suum*
terram hominis illitum & applicatum. Hoc vermes
etiā in auribus perimit, & cōcolores ei atrices red-
dit, ut testatur *Acorus*. Nunc ad vlcis disruptæ
cum olis corruptione complicatæ curationem
accedamus.

*Ad vlcem
nosa vlcem.*

297

OBSERVATIO XI.

De ulcere cum ossis corruptione.

VLCEUS cicatrice obductum denovo inflāmatum sua sponte ruptum est, & apparuit os corruptum sub ulcere latens. Chirurgus fracta ossium squamam ut excideretur, & exciderent ossium cortices, & ut caro bona renascetur, cōmo de hoc pulvere sequenti usus est: *aristol. rotunda, creta, myrrha, aloni combusta, pencedanis ad sicca aris corticum positi ana p. a.* fiat pulvis. adicet una est deinde mei, ut fieret emplastrum.

SCHOLIA.

VLCEVRVM nonnulla, cicatrice obducta, postea tempore huius ita multo interiecto denovo inflammatione tentantur, rursumque sua sponte & per se rumpuntur, & a continuitate sua discedunt. Osse enim quopiam subilstrato male affecto, hoc est, vitiatō & corrupto, circumdata ac superiacens caro ex facili quidem interdum ad cicatricem ducitur, & sana ex toto, sed vngueque relictura esse videtur: verū cursu humoris valido, paulatim ex osse in alto est. besectur, & putrescente, tū inflāmatū, tū pus oboritur, quod cicatricem laerant & dirumpit. Ceterum

198

Ossis vitia nota.

vitiatū ac corruptū ossis signa hæc sunt. *Primo* ferre pingue fit: *deinde* vel nigrum, vel cariosum. Quæ supernatis grauibz viceribus (ut *Celsus ait*) aut fistulis, huius vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis eueniunt. Quænam igitur horum vlcum curatio erit? certe eatenus exsiccare, quatenus squamma affecti ossis exciderit. Ideo & Auicenna dicebat: *Et si in vlcibus superueniunt ossium fragmenta, & panniculi aut alia similia, ne propriis ut extrahenda ossis modo procedas ut in cap. de vlcibz. ossium dicitur.*

Quæ ossium fragmenta excideri faciat.

Ossis. Ceterum ossium squamæ facile excident, si agrellis pap. & ficiatibz foliis cum polenta leuigatis, atque ex vino illitis ipsius ossis sinus coneuos replueris. aut alterci (quem Græci *hypocephalum* dicunt) semen, & aramentum suorum, pari pondere contrita imposueris. Sed & pencedanis radix contrita, subito squamas ossium remouet (ut *alibi diximus*) ac si parat squamas etiam ossium breui detrahitis, & nouam probamque carnem desuper renasci facit sequens medicamentum, quod admirabile vocat Auicenna.

Emplastrum Auicenna.

Recipit autem *aristol. vici, myrrha, aloni, cortici plantanæ* (ex qua fit succus opopanan diellus) *canabul* (quod apud Arabes genus est cuiusdam terræ rubræ minutæ vt arena, & Galeno ac Græcis *Eranthis*, vt & purat Tigautius, dicitur) *adulsi, scoria aru. cortici pins. di. portuensis* aqua: uelle omnia excipiantur. & fiat emplastrum. Oportet autem ante omnia vitiatum ac corruptum os nudare, vlcerē exciso: & si latius eius corrupti ossis vitii est, quum vlcus fuit, carnem subscicare, donec integrum os vndique pateat. Osse autem sic nudato, totum id quod pingue & corruptum est, eandem framentum semel iterumve (ut *ibi dixit*) admoto adurendum est, ut

ex eo statim secedat. Aut certe eradendum, donec iam aliquid cruoris ossēdatur, quæ integrioris & minime corrupti ossis nota est. Neque alia faciendū sunt, ubi aris & nigricis in summo osse est. Si quidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. Porro qui radat hæc (inquit *Celsus*) audacter imprimere ferramentū debet, ut & vix taliquid, & maturius definat. Finis est, cum vel ad albus os, vel ad solidū veniū est. Albo itaque finiri & a nigritie vitium (ut *ipse experientia in Hospitibus moris Baronia vidimus*) soliditate quadam manifestum est. Ac si caries adeo descendit, 299

cedere etiam cruoris aliquid integro supradditum est. Ceterum si caries alte descendit, per terebram vrgenda crebris foraminibus est, quæ altitudine vitium æquent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post hæc & resoluatur ab inferiori osse quodcumque vitiatum est, & is sinus carne replibitur, & humor aut nullus postea ferretur, aut inediocri. Sin autem nigricis est, aut si caries ad alceram quodque partem ossis transit, oportet excidi. Sed quod totum vitiatum est, totum amendum est. Si inferior integra est, eatenus, hoc est, vique ad subiectam partem ossis integram, quod corruptum est, excidi debet. Sunt qui post ablationem cauterium admouendum esse suadent: nec immerito sane. Nam si corruptela ossis ex humiditatecrementosa & suppurata, anca, ipsius ossis substantiam labi facit: ortum habet (ut *Cervinus* magna ex parte habet) nullum præsentis aut tutius remedium excogitari potest ipsi visioni, seu cauterio (ut vocant) actuali. Hoc enim decenter ad motum & cito & toto in summo quoque & alio (non secus quam ignis ipse actualis) desceat. Post visionem vero ferro candenti, factam, rosaceum calidum infundunt Guidosutem a Cauliaco post visionem canterio (ut dicitur) actuali (quod *alibi* hoc affert magno: & probat) decenter factam, rosaceum cui canis de lignore permixtum tribus primis diebus admouetur triduo vero alio sequente, loco albulinis, luteum cui (quod *tutellum* appellant) rhodino, id est, rosaceo commiscet: postea purpurum cum melle rosato infundit. Sed præstareius verba hoc loco subicere: Ego (inquit) post cauterium in posse oleum rosatum cum albimine omni per tres dies, utello omni, & postea purpurum cum melle rosato: & desuper impono aliquando mundificatum, vsque ad ossis corruptionem: & post cum pulvere emplastrati, hoc est, ex Auicenna superius commemorati, iterum & conficito. Hic ad adiungere poteris quæ Betapalia de vlcibus cap. 1. de regimine vlcum quæ disrumpuntur post confiditorem, scripserit: habes ibidem duo vnguenta ad ossa renouanda & extrahenda valde accommodata, & quæ iacitibz & Chironia dicuntur, veniamus.

Quæ post visionem ferri munda.

300 De vlceribus malis & malignis inueteratis.

AD vlcera mala Carpus vtebatur vng. ex litharg. coctus: *Re. lithargyri aurii & arg. ana 3 v. l. olei communis lb. a. misce, pone ad ignem, & fiat vng.* Sic qui magnum vlcus habebat, quod exficari non poterat. hoc sequenti medicamento exsiccatum est: *Re. argenti sublimati, auripigmenti, salis ammoniaci, seleni communis ana 3 j. aqua currentis lb. j.* bulliat omnia simul vsq; ad consumptionem duarum partium: & vsui reseruetur. Mulieri vero illi Delphensi, quæ vlcera maligna etiam profunda & inueterata habebat (nam plura quam septem annis durauerant) *descriptum Gualteri* cum herbis etiam appropriatis ad fistulas & sanguinis mundificationem continuo exhibui: sæpius etiam purgavi, modo cum confect. *hammech*, modo cum *pitula india*, modo cum *pill. fa-muterra*. Et ita tandem iotegre curata fuit.

S C H O L I A.

NEOTERICI quidam diuerso modo de vlceribus malignis scribunt: nam Ioannes de Vigo *lib. 4. de vlceribus in vniuersali vno capite* tractat de vlceribus virulentis corrosiuis atque malignis: & rursus *cap. 7. de vlcere, quæ cum difficultate sanantur*, agit, & de vlcere *difficile confolidationis cu proprietate occulta*. Alii scorsim de his scribunt. Ceterum omnibus barbaris, hic ea ponemus, quæ Tagautius e variis authoribus collegit *lib. 19. de vlcerebus cap. 15. de vlcerebus dys-splanis inueteratis, & rursus quæ cacoethis & Chironia dicunt*: nam & in eodem capite etiam ea referuntur, quæ Guido Cauliaco de vulnere difficulter curabili cum proprietate nobis occulta scripserit. Vlcera igitur quæ ad cicatricem ægre ducuntur, Galenus Græce *dysplanis* nominat. Quæ vero ægre sanabilia, dolosa, malefica siue maligna, contumacia, rebelliave dicimus, eidem & Græcis aliis, qui de re medica scripserunt, authoribus *cacoethis* dominantur. Hæc quoque, præsertim inueterata, & quæ vix cicatricem recipiunt, alii *Chironia* appellantur, ecu Chironæ medicinz peritissimo indigentia, alii *Telephus*, quod in tali vlcere Telephus conuenit. Galenus *lib. 4. de compositione medicamentorum secundum genera*, vlcera cacoethis diuidit pones vñeotentiz differentiam in *maligniora*, seu præter modum malefica, & *mediciora* seu *moderatiora*: atque hæc quidem imbecillioribus, illa vero valentioribus remediis curari præcipit. Illa autem non mediocriter, sed maxime maligna contumaciaque vlcera Atclepiades atque alii veteres (vel ipse Galenus teste) Chironia proprie nominabant. Ceterum Cornelio Celso auctore, *Chironiam vlcus* appellatur, quod & magnum est, & habet oras duras, callosas, tumentes, ex quibus exitus nec non multus, sed tenuis. Odor males, neque in vlcere neque in eius tumore est. Nulla inflammation, dolor modicus est, nihil ferpit: ideoque nullum periculum adfert: sed non fa-

cile sanescit. Interdum tonus cicatrix induitur: deinde iterum rumpitur, vlcusque renouatur, & maxime in pedibus & cruribus. Hia similia sunt, quæ Auicenna ægre sanabilia, & oculum quandam nobis proprietatem habentia nominat. *Hæc enim* (inquit ille) *neque putrida sunt, neque corrosiva, neque ambulatua, sed sunt vniuersi dispositionis plana, clauduntur seipsa, & recedunt a seipsa* (quæ Braslerio sacerdoti apud Diuum Agathum Delphis nunc eueniunt) *hæc est, cicatrix frequenter ducens, & rursus seipsa aperens, & renouans*. Porro multæ ac variz sunt causæ, quæ eiusmodi malignorum, contumacium, atq; ægre sanabilium vlcum coitionem remorantur & impediunt. Nempe fieri aliquando potest vt labra exulceratz partis callosa & dura, causæ sint, quæ minus sanescat vlcus. Potest etiam causæ esse intemperies, vel cum tumore aliquo coniuncta sit. Potest & varix superariens: vel lineis æctio & malua affectus: vel in icciorie vitium aliquod, præterque hæc omnia imbecillitas ægræ partis, quæ (vt Galenus ait) ipsa quoque intensæ quædam est intemperies, vlcera curationem in multos menses protrahere. Quin etiam vitiosus in toto corpore succus (*cacoethismum* vocant) maxima causarum est, quæ incommode vlcibus possunt, & ea diuturna contumaciaque efficere. Vesat sane non minus vlcera, atq; ea curatu difficilia reddit, succorum æquabiliter se habentium exuberantia, quam plethoræ appellat. Quæ omnes causæ, & si quæ sint aliz, in duas (vt supra diximus) reuocari possunt: nempe in carnis subiecti intemperiem, & humorem confluentem. Itaque si eiusmodi vlcibus dysplanis, id est, ægre cicatricem admittentibus, maleficis, contumacibus atque inueteratis aliquando velis mederi, necesse est causas, quæ illa creant, primum summoque atq; abscidas, deinde maligni ipsius vlcis curationem aggrediari. In morbo namque omnibus nedum vlcibus, in quibus efficitur causæ adhuc manet, ab hac incoanda curatio est. Magna igitur attentione inspiciedum atque considerandum venit, num corpus totum cacoethismum vel plethoricum existat, vel lien aut iecur male afficiatur, vel labra vlcis dura & callosa sint. Item num aliqua insignis subsit partis vlcera intemperies, aut etiam varix aliqua superariens fuerit, cuius occasione contumax ad sanandum vlcus redditur. Ergo si totum corpus cacoethymia aut plethora laboret, prius expurgare vacuareque expedit, quam medicamentum vlcis admouere. Si vero lien aut iecur male afficiatur, his prius providere, deinde ad vlcus curandum venire oportet. Eodem modo & verrucæ, quæ sæpe supra exulceratum lumen sunt, prius (vt supra dictum est) tolli debent, deinde vlcus sanandum. Intemperies quoque atq; imbecillitas, quam sæpe insignis quædam parit intemperies, antequam ad vlcis curationem accedamus, corrigenda erit. Breuitur, et quod fluxum in partem vlcis decumbentis est causæ, atque ægre

Varia causa propter quam non sanescat vlcus.

Labra callosa.

Intemperies.

Varix.

Lien aut iecur vitium.

Imbecillitas partis.

302 Cacoethymia

Plethora.

301 Resequale.

Cacoethis.

Chironia.

Telephus.

Chironia vel eoru descriptio, an Cor. Celso.

attendenda erit. Quod maximum Galen. censetur, inter ea, quæ ad horum vlcærum curationem pertinent, neglectum tamen (inquat) medicinalis materia scriptoribus. Nam hi solas vniuersales ipsius vires dicere Ruducunt: inter quos fuit & Dioscorides, quem nulli eorum qui in eadem quasi arena defudarunt, hoc esse, de medicinali materia scriperunt, secundum esse, vel Galeni ipsius testimonio quisquam dixerit. Sed & qui composita medicamenta tradiderunt, de his indeterminate & citra distinctionem scriperunt.

Dispositio.

Quid medicamentis determinate & extra distinctionem scriperint, erroris causa non debemus.

Neque enim virtutem ipsius medicamenti, an scilicet valdissimum, an moderatum vel imbecillum esset, explicauerunt: neque difficultatis aut malignitatis latitudinem ipsorum vlcærum, aut naturam habirumve corporum vlcere laborantium expresserunt: quæ nimirum distinctione omittit, per inuitos medicos & chirurgos, interdum male, pharmacis, quæ postscripta scripto reliquerunt, ut contingit: id eoque non nunquam corporum misceat adæqui; interrim ab illo errare, alio delabentes. Itaque non iniuria tam veteres, ut *Andromachum, Crisum, Asclepiadem*, quam recentiores scriptores accusandi veniunt, qui sine illa distinctione remedia scriperunt ad *adysipuliam*, id est, cicatricem difficulter recipientem item ad *cacothymia*, id est, malefica, siue maligna & contumacia vlcera, plurima etiam ex his sunt virtute in vicem longe diuersa. Si quidem nonnulla horum vehemenniora sunt, alia moderatiora, quædam vero imbecilliora. Adde quod & alia vlcera (ut diximus) magis, alia minus dyspepatica, & difficilia, malignaque sunt. Sed nec corpora eius generis vlcibus sciantia, eiusdem proferus (ut paulo ante dicebamus) naturæ ac dispositionis reperiuntur. Quare neque eadem omnino medicamenta desiderant. Itaque ad maligniora vlcera, & corpora duriora ac robustiora, valentioribus. vti videtur remediis: ad mediciora vero, & molliores ac delicatiora corporum habitus, imbecillioribus. Merito igitur (ut misit quartus lib. de compos. med. secundum genera scribit Galenus) omnis qui vnum duntaxat medicamentum vlcibus malignis cicatricem inducere promittentes habet, successu crebro frustratur. Nam duo (minimè) quæ idem pollicentur, eadem facultatem ostendunt, diuersa alioqui inter se non simpliciter maioris minorisque, verum (ut inquit illa) maxime ac minimi ratione, in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus vitia curare propoluerit. Nos itaque deinceps pharmaca, primum quidem simplicia, deinde composita recensibimus, ac etiam sciatiam enumerabimus, quæ vlcera (de quibus nobis hoc sermo est) citra demorsum & manutilla exasperationem exsiccare possunt. Ceterum cum varietatem sapientia dictum est) inter se differant, in eo quod nigris minusve laeuent, expressam eorum mentionem faciemus, quæ valde ac vehementer, quæ moderate, & quæ obsecutius, seu imbecillius exsiccant a metallicis, Galenum secuti, incipientes & quibus etiam retræ species adiuuauerunt. Secant igitur inodice

Lemnia sphyragis, siue *Lemniis sphydum*, ita quidē cognominatū ob impressam illi sphyragida, hoc est, sphydum *Diaue sphyraminos* & *Terram sphydum*, *Lemniis* sphydum vocamus. Idem potest & *Cauma*, quam *Chama* & *Cathiam* nominant. Hæc autem pluribus deinceps diebus sub Canis fetore ex aceto trita, aut vino plane gulo, & substantia pellucida, facultatem acquirunt magis siccantem. Quod si ex aceri aceto teratur, siccataque reponatur, vlcibus valde etiam malignis, Galieno & Actio commode inspergitur. Valentius cad. *Chalcitima* & *Lemnia sphydum* pharmacum est *chalcitum* (quæ species est vitrioli, apud Arabes *colicthar*, *chalcidus* & *Zeg* nuncupata) combusta, in codmizque morem trita, atque in puluere in redacta, & postea excuscata. Nam ciuda, hoc est, lignum non experta, tanta pollet efficacia, vti etiam cuti crustas inducat. Lota quam vltima minus deficiat, minulque mordax reperitur. Per simile quoque medicamentum est *argus crematus*, quæ & *argus argus* etiam dicitur, de vulgo hodie ab omnibus *viride ære*. Non combulla autem minus efficax medicamentum est, sicuti & *chalcitum* quæ ignem non experta est. Vtrum hæc (*chalcitum* inquam) non nihil etiam adstringit, & ea multo magis adhuc *chalcitum*, id est, *aurum cum sulfurio*, quod inter metalla maxime siccant. *Myri* autem & *syrichalcitid* genere cognata sunt ex vna, vti ita cum Galeno dicam, radice producta. Inque tria hæc (quæ sub vitrioli genere comprehenduntur) maioris tantum & minoris ratione differunt. *Sabi* siue *sistrum*, quod Græcis *Σαβίνα*, vulgo autem in officinis *antimonium* dicitur, magis quam fori deficiat & adstringit. Porro *alphyrges* appellatum pharmacum, vlcibus ægre humiditatis vitio ad cicatricem venientem aptissimum est. Valde enim deficiat, tamen modice mordax sit. Adhæc præter ærem eum qualitatem potentiam, vim habet adstringentem: quæ tamen vtrique fortiores & *chalcitum* cruda & *chalcanthum*, id est, arramentum futurius, repræsentat. Omne quoque *aluminum* genus vlcera exquisitè deficiat, & generose adstringit. Vnde nemo (inquat Galenus) solis his ad vlcera vitur, sicut nec cruda *chalcitide*, & *argurine*, vltima vero & hæc & *myri* vltima sunt, ac lota inorsu quidem remittunt, verum minus siccant. Illud enim metallicis omnibus commune est, quod combustis clotisque erosio, quæ prius adfuit, edomatur ac interit. Quamobrem his sic reccant & lotis vti quidem licet in pueris, enuchis & muliebribusque, præsertim candidis, imo etiâ & viris, qui curæ alba videntur, & molli carne naturæ sunt præditi: item in eis, qui ad stercidum habiles admodum sunt, & plethora, vitio quoque succo laborant. Talia cum corpora facile excoctis, seu rusione phlegmonem accerunt. Itaque cum permulta corpora quibus mordere cogimus, vti quædam dispositionem habeant, quæ vi hæmorrhæm cōmoriunt ferendum non sunt. ruitus est lotis quam non lotis vti. Ceterum alia præter hæc metallica superius commemorata, plurima adhuc

Moderate siccantia simplicia.

Argus.

307
Sabi.

Sabi siue sistrum, vulgo antimonium, Dapn.

Aluminum.

Erosio metallica per combustum edomatur.

Turris est lotis quam non lotis vti.

Ordo dictorum.

vlcus virulentum: ꝛ. *aluminis de rocha ꝑ.iii. gummi arab. ꝑ.ii. albumen oui i. aq. ros. plantagin. ana ꝛ. vi. bulliant ad consumptionem medietatis. Pro vlcere Cardinalis Rodulphi hæc scripsit: ꝛ. myrror. citrinor. ꝛ. i. bulliant in lb. iiii. aqua communis ad consumpt. medietatis ꝛ. myrrill. ros. rub. balaust. capul. gland. betonica. strobil. mencia. insigniam ana m. ꝑ. geryophyl. ꝛ. ꝑ. vini nigri lb. viii. bulliant omnia in dicto vino vsque ad consumpt. mediet. coloratus vsui referretur: in qua balneentur panni ex scarlatu. Deinde pro excoactione & incartatione eiusdem vlcis: ꝛ. *illoru. mastich. aristol. longa. centaurea. myrrha. aloes. sarcocolla. vernicia. opoponacu ana ꝑ. ꝑ. pul. subtiliter. & infundantur in ꝑ. i. aqua vitæ: deinde stent cum phiala per diem & noctem in aqua calida. Hoc etiam pro excoactione vlcere vtebatur: ꝛ. *aristoleb. longa & rotunda. centaur. minor. ana m. ꝑ. cauda equina m. i. corticem stauri ꝑ. i. vini nigri lb. x. mellis lb. ꝑ. bulliant ad consumptionem duarum parrium. & colesur. Pulvis ad vlcera ambulatoria: ꝛ. *viridis erug. ꝑ. & pone in acet. & bulliant ad consumptionem acet. id quod remaneat puluerizetur subtiliter. & vtere. Dominus de Mureul cum tibiã vlceratam haberet, vlcere virulento & corrosiuo, puluerem crassii humani adusti inspergebat, & supra dictum puluerem linamenta sicca ex pannis lineis decerpis apponebat, & ita curatus est. Qui tibiã vlceratam habebat cum calefactione ex vlcenibus virulentis & corrosiuis, hac aqua lotus, semel vel bis, prout expediens videbatur, sicut factus est: ꝛ. *argenti vini subtilissimi, aqua sumi q. ꝑ. decoquat, & ext. Ea tamen cum cautione vtendum suadeo. Guilhelmus chi.urgus de Molen, Brugis magni nominis, quosdam ab vlcenibus corrosiuis hoc modo curasse fertur: incipieb. q. viride poluerizatum; quo vlcera implebat: & de superi ponebat pannum siccatum, & loca vicina inungebat aliquo defensiuo. deinde *folia consida minoru pistabat cum modico ceru. & deinde contemperabat cum exiguo lacte bonico: & in loco vbi elchaza incipiebat separari, ponebat illud cataplasma cum proba lignea. seruabatque illud medicamentum in scutella lignea: & sic continuabat etiam post casum elchazæ vsque ad incartationem: deinde cicatricem inducebat cum puluere aliquo apto. Id autem quod sequitur sapius etiam expertum dicitur ad vlcus ambulatorium seu corrosiuum: ꝛ. *myrru. aristolachia rotunda. auricula muræ. hypericon. deficatorum ana ꝑ. i. cucurbita sicca, li.berggrii auri. myrrha. cerusa lota in aq. ros. tertia preparas. strobil. balaust. plicia. corticis felici. hematium. cineris sarmenorum viui. osimum olinarum insusurum in aceto ros. & postea excocturum ana ꝑ. i. ꝑ. sermili-pontorum. bordes. lenium ana ꝑ. i. ꝑ. mellu rosati celas: & i. i. succi granatorum acetos. & i. i. cerebutina lota cum aq. plantag. & i. i. cera & i. i. puluerizanda puluerizentur, & cribrentur per fundonem, & fiat vng. isto modo. primo mel &*******

succus granatorum decoquantur vsque ad consumptionem succi: & tunc remoneantur ab igne, & imponitur pul. postea terebinthina & cera simul liquefiant, & fiat vng. mediocriter molliciei. Pulvis ad idem: ꝛ. *ros. succarum. cucurbita sicca. li.berggrii auri. cerusa. plumbi loti. hematium. strobil. balaust. corticem bugie. corticis felici. cembusorum. tertia preparas. aristol. rotunda. aloes citrin. ana ꝑ. i. fiat pol. per fundonem. Vnguentum valde expertum, mundificans: consolidans omnia vlcera corrosiuambulatoria difficilis consolidatio: ꝛ. *succorum depuratorum pentaphyllon. plicella. consida minoru. bugie. absinthii ana ꝛ. i. succi cauda equina. virga passerii ana ꝛ. i. succi plantag. & v. ol. ros. & i. i. i. cera & i. i. mellu ros. & i. i. terebinthina & i. i. vel q. f. cerusa lota in aq. plantag. li.berggrii auri. tertia preparas. plumbi vsti & loti. strobil. balaust. corticem bugie. corticem cucurbitæ sicca ana & ꝑ. (forte ꝑ. ꝑ.) sang. de drac. sarcocolla nutrita in aqua plantag. myrrha. sturru. aloes citrin. ros. siccat. cinerum sarmenorum vitæ ana ꝑ. i. i. fiat vng. secundum artem. Sed & hæc non mirabilis habetur in excoactione vlcetum virulentorum: ꝛ. *succi perulace. plantagin. succi vtrius non maturatum ana pntam. albulmina ouorum numer. viii. aluminis crudi lib. i. optime pulueriscentur: & extrahatur aqua per alembicum.***

SCHOLIA.

Iohannes de Vigo de vlcenibus virulentis & corrosiuis sub vno capite; & de malignis vlcenibus tractauit. At alii seorsim de his scripserunt: & sic Bertapalia de vlcenibus, cap. 2. de virulentis vlcenibus egit: & de corrodentibus, cap. vii. ita & de ambulatoriis & difficilis curationis cap. viii. At Guido de Cauliaco de vlcere virulento & corrosiuo sub vno capite curationem comprehendit: nam vlcera ambulatoria etiam ad corrodentia ꝛ. eant ꝑ. ex. dicit. quamuis ambulatorium ad phagedenam refertur, nos autem de omnibus sub hoc capite tractabimus. Quid enim sit vlcus virulentum seu saniosum, & vlcus corrosiuum, siue atrodens, quid item ambulatorium, & depascens siue manducans, quod Græci *residu* appellant, & quomodo hæc inuicem distendant, in distinctionibus differentiarum vlcetum, abunde est explicatum. Sed breuiter iuxta Guidonem de Cauliaco: Vlcera virulenta à corrosiuis non differunt, nisi secundum magis & minus: nam in principio, dum non emittit nisi solum virulentiam ducuntur *virulenta*: postquam autem augeatur acuitas & malitia, & corrodendo augmentatur capacitas siue elchaza, dicitur *corrosiuum*. Et si incedit hinc inde, nō multum in carne se profundando, dicitur *ambulatorium*. Si autē in tantum augmentatur malitia, quod consumit membrum, dicitur *manducans*. Et dehinc transit ad *lypm* & *canceram*. Excitantur autem eiusmodi vlcera à prauis humoribus, sed præsertim

De vlcere virulento & corrosiuo, q. Græci residu appellant.

Causa.

fertim biliosis, acrisbus & mordacihus, qui propter aduersionem, caecorhiam quandam seu fraudulentiam (in *re. ant.*) hoc est, malignitatem acquirunt. Atque haec magna ex parte oriuntur post herpetas & prurientes pustulas, quas acris & biliosus humor excitauit, atque etiam post vulnura, quae mordacibus medicamentis exacerbata atque irritata fuere. Ceterum ut ad perfectam sanationem perducantur eiusmodi vlcera, triplici egent auxiliorum genere, sicuti & pleraque alia, nempe victus ratione proba, & conuenienti purgatione, quae succo pitauo, acris, & erosione nec in affecta particula excitanti sitae accommodata, & localibus remedijs. Age igitur, esto aliquis, qui sanus quidem sit, hoc est, omnia naturae munia inculpate exerceat, sed ex se habenda deretpente quapiam particula, veluti brachia, pustulam statim excitat, mox eadem ipsa particula iterum atque iterum pruritu vexetur, pustulaeque disrupta vlceris decolor, & inaequaliter erofum gignatur, atque haec in tribus quatuorve diebus a principio incidere. Hactenus hypothefi posita, dicat mihi hoc loco quispiam: quo nam pacto sanare huiusmodi vlcera conueniat? Certe ut eius curatio eo felicitate assequaris, imprimis qualis sit totius corporis talis vlcere laborantis affectus, statim tibi erit considerandum. Inuenies autem, tum ex vlceris ipsius symptomatibus, id est, accidentibus, tum ex notis quas totum corpus praese fert, cuius maxime generis sitis qui redundat succus. Atque hunc (si *Galenus* institum *seignare*) idoneo purgante medicamento protinus educes, nec protrahes, dum totius hominis cutibus affectum quandam contumacem re bellum; curatioque contrahat; quemadmodum facere solent Theriaca sectatores, iplius videlicet praecipua moribus obseruantes. Praecipuum namque ut ab omnibus sere (inquit *Galenus*) antiquis medicis, quicunque ratione quodam acmethodo de vlceris curatione scriptum erit, causas quae illa erant abstinendas esse, atque profecto ut ceterorum omnium morborum. Itaque hoc tibicanquam summame praecipuum esto, omnino in omnibus morbis, ne dum vlceribus in quibus effectrix causa adhuc manet, ab hac inchodam curationem esse: & *degeneria*, hoc est, *peruersione*, seu *distinutione* in medicamenta, ne quaque particulis quibusdam applicanda esse, ubi redudantia in toto corpore aut superioret particula subest: quippe quod haec si ad mora impletur potius quod educetur. Itaque tunc a totius corporis aut superabundantiae, immitentis particulae superiencis vacatione incipiente curatio est. Deinde ex ea potente auxilio viendum erit. Facta igitur totius corporis, ut decet, vacatione (in *salutem* quandoque *sunt in Romanae quae tam illigere suauiter, quae impetum ejusdem remanent, ut si ex den cras melleo primum habebat, qui saepe ad ad dem vlye ascendere*) ad curationem particulis afflicta, hoc est, ipsius vlceris arrodens deueniendum erit. Ergo si particulam exulceratam atque erofam, supra modum calefactam videris, ipsam statim frigidis stypticis defecantibus refrigerabis. Comode autem se-

ceris, li vlcus ipsum, & particulam totam vlcera-
tam aqua aluminofa abluentis: hæc etiam multo
magno vfu habet vlcibus effloëto. Quippe
quæ influentes humores poterit repellat, & ex-
candam faculatorem obtineat, vt est in eff. Anticna.
Poterit etiam affe-ctum locum itigare, vel aqua
plantag. & ref. vel aqua in qua ferrum candens ex-
tinctum fuerit, aut etiam decoctio cyperi, myrobol.
exprefsi, plantag. malicerni, helenifm, quod lius eff.
malpanci fiftifm, & fimilium. Vt autem ab in-
guenribus de fluxuionibus, vlcera partuula vi-
dicetur, optimum fuerit circumiacentes partes
pinguente ex bolo armata illinere. In medio vero vl-
ceris, puluis aliquis, qui vim deficcandam habeat,
appondendus est: vt ex fiftifm, plumbo vffo po-
mphygæ, quæ vulgo turca dicitur, antimomo, quod
flumini & fluvio Græce dicitur, æt combufto, eo al-
lo, lapide beniarie, ffofo, abietis, atque etiam f-
fidis, id est, turcibm maligrantem, vng. de vlcera, & id
genus aliis. Item pannorum locum in i. Inguenita
formate, vlcera, Græci vocant, vng. de alo & Rhaf-
illitæ, aut vng. quod sextam partem calis Rha-
receptat, in quo omnes consentiunt, vel in vnguento,
quod diaphanophlegm nuncupatur, fupra vlcus ip-
sum ponendū eſt. Cuius fupra eiusmodi pul-
ueteſ ac linamenta vlceri impoſita, puluillius, ſeu
puluinuiſſimis, quem plimacrolum vocant, poſ-
ca aqua ſiſinbutus adhibendus erit inde de con-
ueniens deligatura, quam exprimentum nominat,
cuius ſupra in tractatu de vulneribus meminim-
us. Guſdo à Caſaliaco in talibus vlcibus ſu-
tebatur poſt lotioem, nullo alio adhibito auxilio,
apponeſe leuamini plumbi tenuem peforati, in qua
vtrum amari vini, cum aqua plantag. vni erat infuſa,
& ligare ligatura, & exprimere, quod non eſt (ut
quæ) faſt loqui, propter idoroſas. Itaque tria hæc,
molybdes, id eſt, plumbum aqua aluminofa, de ligatura
decenter facta, miram ac fere incredibilem vim
habeoſt in fanandis euſinodi vlcibus. Porro de
ligaturam talem eſſe cõueniet, quæ ad vſum ma-
gis, quam ad elegantem formam conducit: hæc
autem duobus modis fieri, nempe vel vnico vinctu
lo ſe faciſſima, vel duabus. Itaque li vnus tan-
tum faſcia fuerit, principio eius verſus ſuperius
vleceris partem ſtatuto, oẽdenda eſt tunc ſura, ſi
vng. genu, quæ malleolus, ſine cubitus, ſive manus
ſumma, aut alia quævis pars quæ laborauerit. At
ſi duabus faſciis vni malueris, quemadmodum in
fracturis fieri ſolet, altera à parte affeſta, hoc eſt,
ab ipſo vlcere, ad ſuperiorem fertur, altera de ſu-
perius prius dicitur, in ſuperiore parte defi-
nit, oẽ videlicet loco quo in prius incepiſt. Ceterum
præ reliqua cõmoda, q̃ ex hac deligatione proue-
niūt, illud enā cõcedet, q̃ vlcera, q̃ ubi tunc erat
coſoleſcente nequeūt, obſolga redderēt. Soluta
autē ſi ſingulis diebus, ſed æternis facienda eſt. Neq̃
in ſolutione vlcus aqua inſpēdendū eſt molli li-
neolo, puro & ſiccoſanies derogaſſe. Quod ſi
partes vlcera ad necantes inflammate videantur, & iam
phlegmonosæ quippiæ præſentent, plaryſmum
exterius plurimo ſpacio ligd medicamē illiſſimere
oportet, quale eſt Galeni plaryſmū hoc eſt, & p-

Agave attenuata
 'Fasciata'
 Rapid grower
 Difficult to grow

Notes: Δ^{nd}
none.

*Palaeo and
colony, etc.*

Synthesis

gues, segundo
 formula de
 eipol para o
 Tugano. In
 o mesmo
 tem de ser
 para definir
 o mesmo.

Notre da
plumbea
luminosa.

*Deligam-
ra despici.*

D. ligatus
P. nitens
A. dichotomus
S. parvulus
A. nitens
S. ligatus
A. nitens

●கா.அ.சி.பி.
கா.அ.சி.பி.
கா.அ.சி.பி.
கா.அ.சி.பி.

Hypothesis
and Lib. &
Therap.

**A purgation
na recepção
da criança**

Li^+ , Th^{+}

Common
de degradation
dans les proce-
dés.

*Particula-
viciarius
viciarius
viciarius.*

multū confectum, vel aliquod simile, non quidem quocunque cōtēgerit diluendum, sed vino adstringente, quantum imbibere poterit. Sitque oleum quod addicitur refrigerans & adstringens, cuiusmodi sunt *myrtum* & *melinum*. Quod si hæc non adiant, *emphacinum* & *emotribes* nominatum adhibebis. At si durities circa partes vlcēri adiaceentes apparuerit, ipsum *phannum*, seu *emphacum* & *palmarum oleum veteri*, aut *ruinum* (quod officinae oleū de charta nominant) diluendum est. Tutiusque fuerit superpositæ regioni, quodpiam ex medicamentis repellentibus liquidis adhibere: quo si quid vel prauum, vel plusquam est, insinuat, regeratur. Atque id maxime cum in crute vlcus obortum, superpositam venam varicosam habeat. Quæ dum magna est, ac sanguinem nec colore rubrum, nec probū, sed atriorē & melancholicum continere videtur, excidenda, *vt prius diximus*, auferendaque est.

Oleo refrigerantia & adstringentia.

Si durities adstet.

Si vlcus non cedat medicamentis.

Cæterum si vlcera eiusmodi admoda medicamentis continentur, indiesque magis atque magis et oleo scilicet & augeatur, corpus subinde à viciosis succis repurgandum erit, continensque ipsa, *vt vocant*, communē materia depalcens atque atrodens inuisione seu cauterio, *vt loquuntur*, actuali absumēda veniet, & lesedicta modo laboratū id genus auxilium tui, atque vtile, ceterisq; aliis lōge præstantius, nō reformidet, ac reuaret. Quod si ferrū caudens obtimiditate ad delicatam nimis naturam parit, atque admittere noluerit, medicamenta acriora, & quæ ignis vires habeant, admoueas, cuiusmodi sunt *assidua de drema*, *M. fa.* aut *Passiva*. Vel trochisci *asphodelotum*, aut qui *calidissimi* nominantur, quorum formulæ ex *lib. Tagæti* referuntur. His etiam *aitamenum scripturum*, quod & *ycassum* vocant magna utilitate admonetur. Quod si hæc parum profecerint, *arsenicū*, quod *si lima*, ut nominant, modica tamen, *vt alibi dictum est*, quantitate, tuto adhiberi potest. Locus autem anibiens, hoc est, circumpositæ vlcēri partes, interim refrigerantibus perpetuo munienodus diligenter erit, ne tam vehementibus admotis prædidis fluxio irritetur. Porro si ne his quidem tam potentibus auxiliis malum aliquando victum fuerit, nec erosio ipsa depalcens quouis modo listi possit, membrum amputare necessarium est, *vt voluit Auerroes*. Ioannes Lembergius lib. 2. Epist. 30. ita scribit: *At ego fratri in vno antilicano tempore super gramina linteamentis rorē excepti expressi, magis, vt si fordidum granum adhaerens, expurgaretur, desquamaretur, detraci: & in delectis interuolis in defectis vlcēribus phagedenicū applicui, & rorē acrimoniam aspersi & succata, consilidauit: inter cetera quoque, non vno alio modo, & alibi in momento, consilidauit: omem non parum promouit.* His adiunge ea quæ Aetius lib. 14. cap. 48. ad depalcencias putridaque vlcera scripsit, tum cap. 49. de aridis erulis inducentibus ad depalcencias: & de iisdem ca. 50. & 51. de pusillis ad depalcencias vitilissimis. Nunq̃ ad fordida & putrida vlcera accedamus.

P. si vlcus fluxit.

Arsenicū.

Ad vlcera phagedenica.

Ad fordida vlcera M. Iodocus chirurgus, tum ad gangrenas, vnguento hoc abiter suo utebatur: *vt micam panis filicini*, & tempera eam in aceto vini ad horas vi. Postea eam contunde, & adde mellis ros. & salu q. s. extendatur super superficiem. Postea superpone plumaceolum infusum in aceto & aqua, ita vt comprehendat totum vlcus: interim non omitendo defensionem circa partes vicinas. At Iacobus Carpus hoc vng. tum lauamento utebatur in vlcēribus sordidis: *vt succi cbedionie, lapathi acuti, sumi terra, marrubii, rad. iroes, scabiosa, affibod. lotum ana quart. i. sellu tauri, porci, onis, capra ana 3 iiii. axungia porci veteris lib. ii. viridia aru 3. b. fiat vng. s. salu. elumum, plantag. agrimonie ana m. i. vini rub. quart. i. bulliant ad consumptionem tertie partis, & colaturæ (si necesse fuerit) ad de vng. *degyptiaci q. s. fiat lauamentum pro vlcēribus sordidis*. Sed & hoc vng. mundificatio mirabili ad vlcera putrida sine corrosione commode vitum: *vt succorum deperatorum apii, absinthii, bitonicae ana q. s. succi plant. q. s. succi agrimonie q. s. mellis ros. colas ana un. bulliant omnia simul leniter, semper mouendo vsque ad consumptionem quasi incoctum, deponendo spumam: deinde remoueatur ab igne, & incorporetur cum eo pulvis sequens, ad mellis spissitudinem: *vt galbanum queru 3 i. myrrha electa 3 ii. thura, mastich ana c. corina, sang. dracon. sarcocolla ana 3 i. p. s. idia, reser. rub. halesi. cernu sarnu: totum ana 3 i. fiat pul. subtilissimus per sindonem*. Aliud vng. mundificatorium mirabile in vlcēribus sordidis & fraudulentiis: *vt succi folior. lili. & aceti ana 3 i. mellis communis & b. misce. & coque in vase aëneo ad perf. Quonem*. Aliqui addunt *si corum absinthii, apii & plantag. q. l. & mirabiliter utepatur*.**

S C H O L I A.

De vlcēribus putridis & sordidis agit Iohannes de Vigo lib. 4. de vlcēribus cap. 5. & Betrapalia de vlcēribus sordidus cap. 3. in quibus locis commoda remedia, quibus hoc tempore Neoterici ad hæc vlcera viuunt, inuenies. Cæterum quid sit vlcus sordidus, quod Græci *byparon* vocant: quid item *putre*, seu *putrefactum vlcus* dicatur, supra diffiniuimus. Porro sordidum & putrefactum vlcus Guadoni dicitur, quod sine malitia, *vt eius verbum erat*, putrefacit membrum, dimittendo viscositatem, aut catnem mollem, siue, inquit, crustosam, sordidam, à qua fumus eleuatur foetidus, ac pene cadauerosus. Ac tale quidem vlcus etiam *frandulentum* appellant. Cæterum si eius malitia vlcērius progrediatur & serpat, in sphacelum (quem *rigum humenem* vocat) degenerat, & homini vitam adimit. Horum autem vlcērum cause sunt, succi prauī, crassi, sanguinis naturam quodammodo resipientes, hoc est, sanguinei, qui feruore quodam velut ebullientes, vne nescit, atque malignitatem quandam indispiscunt. Et hæc quidē magna ex parte carbūculos maleficos, siue anthraces, abscessus, & vulnera male

Fluxio sordidum & putre.

Vlcus frandulentum.

Cause vlcērum putridorum & sordidarum.

Curandi ratio.

OBSERVATIO XIV.

De vlcēribus sordidis & putridis.

curata

curata conſequentur. Porro talium vlcerum cura-
tione conſiſtit in proba viciſſitudine, & e-
uaſuationibus accomodis, quibus corpus vni-
uerſum ab excrementis, atq; à natura alienis hu-
moribus expurgetur. Vbi autem iam purum ab
excrementis, atq; à natura alienis humoribus cor-
pus vniuerſum tibi apparuerit, tum particula ipſa
laborans, hoc eſt: vlcerata, cucurbitulis, ſcanſica-
tionibus, hirudinib; atq; epithematis ſiue ſotib;
à corruptis ac deprauatis ſuccis ipſam occupanti-
bus, vindicanda erit, *vt præcipit Auicenna*. Poſt hæc
vero propriam ipſius vlceris curationem aggre-
diaris. Sordes igitur primo tibi ablueda erit, aut
hydromelure quiddè, aut *marina aqua*, vel, ſi eius co-
pia non eſt, falſa. Deinde mundificandum vlcus
vng. vulgo Apollinarum dicto, aut eo quod *Aegy-
ptiacum* nominatur. poſthæc deſuper adhue dan-
dum eſſe quiddam monet mundificatiuū aliud ex
abſinthii ſucco, melle roſato myrrha & ſerina herod.
compoſitum, & circumiacere vlceri partes *vng.*
ex *oleo arm.* illinunt, ac ſupra cetera prædicta pul-
uillos ex ſtuppes cannabiois ſtudioſe ac diligẽte
pexis, aut ex lineis pannis lenibus, pulſa aquoſa
(quod *oxyratum* vocant) imbutos apponunt atq;
alligant. Si vero ſordes in putredinem aut cor-
ruptionem degeneret, locus abluendus erit oxycra-
to, aut (*vt voluit Gaſſe*) aqua cineris vel ſaponis.
Deinde emplaſtrum ex caruib; piſcium falſorum,
ſerina orebi & aryletoſina longa (non autè rotunda)
& ſella, omnib; ex viuo coctis & cum melle mix-
tis, ſupra accoſmodandum eſt. Ad eandem inte-
tionem Auicenas ſubſequent medicamentum
de ſcicrib; multa (*vt affirmat*) experientia cõpro-
batum. Recipit *tragacanthi rubri* *℥. i. calic vna, a-*
lumini cortis granati ana ℥. vi. thuri, gallorum ana ℥. iiii.
cera & olei ana q. ſ. Aliud: *Pitrioli part. xii. chal-*
citudi (quod & colicorhar Arabes appellant) part. x. tra-
gacanthi part. ix. coquantur in aceto, & ex eis fiat
linimentum ac ſemper quidem *vng. ex oleo* in am-
bitu vlceris, *vt ſupra monuimus*, apponito: deſuper
vero ſtuppe puluilloſo *oxyrato* madefactos. Porro
ſi vlcera cuiusmodi deſapientia putridaq; couſq;
ſeritatis & malitiæ deuenerint, vt patet adiacen-
tes magis atq; magis erodit, ac ſine modo in illis
corruptelam exſcient, vehementiſſimis medica-
mentis (*qualia ſupra in curatione malignorum vlcerũ*
recenſuimus) indigebunt. Imo vero frequentes in-
uulſiones, atq; etiam exciſiones illis erunt neceſſa-
rie, ita vt quicquid vitiatum ac corruptũ eſt, pror-
sus extirpetur, & viua ac ſana digitatæ caro relin-
quatur, quæ ex oſtuo ipſius colore & ſanguinis
bonitate facile deprehendens. Inter cetera autem
medicamenta acia, quæ viuam à corrupto ſepa-
rant, & in hoc affectu celebrari ſolent, omnium
præſantiſſimum atq; efficaciſſimum quoſi diuino
experimento deprehenditur aſenicum, q̃ ſubli-
marũ vocat, vt aliqui oties alibi annotauimus. Hoc
enim conſeſtum malum ſiliit, id quidem line
dolore. Quod ſi medicamentis cuiusmodi malum
non ceſſat, membrum ipſum tali deſapiente ac
putrido vlcere affectum, cogimur abſcindere vt
cetera pars tuta ſit. Id autem miſerum atque vlti-

imum auxilium nunquã tentandum eſt, niſi dum
cetera præſidia nihil proficiunt, & à malo potius
victa ſint, vt alibi admonuimus.

OBSERVATIO XV. §

De vlcere profundo & cauernoſo.

Mulier quædam Delphenſis, quæ vlcera in
coxa habebat valde profunda, diuturna,
etiam ex parte corrupta, eandem cum ſæpe pur-
gaſſemus, ad decoctum *legni guaiaci* deueni-
mus: ipſis vlceribus abſterſis cum iniectionibus
& lotionibus ex *lexiuio, melle roſato, & calamine reſch.*
ſaciſnam & ipſe Auicenna, *vt etiam à lobano de*
Vigo lib. 4. de vlcerũ cap. 5. de vlcerũ putridis & ſordidi
curatione citatur, aqua aluminofa cum melle roſ. aut
aqua maris egregie conſert. Pro putrefactione cir-
calabia, vt etiam vlcerata ampliarentur, aliquando
præcipitatum imponere mandauimus: deinde
ablata elchara ad maiorem mundificationem et-
iam *vng. Agypt.* cum decocto *herod. & mellis* mo-
dico abluimus, & abſtergere mandauimus. Vlceri-
bus ſans abſterſis, quod ex loci lenitate percepi-
mus, tunc per tres dies, poſt applicationem mor-
dicantium dictorum, hæc lotionẽ vlcerata ablu-
iuiſſimus: *℥. aq. herodaceæ lib. ℔. mellis roſ. ℥. iiii.* De-
inde ad incarnatorem chirurgis deuinit hoc
ſequenti ex eodem Ioanne de V-go: *℥. terebinth.*
clara ℥. i. mellis roſ. ℥. i. cerocella ℥. iii. glutinũ pſicum,
tragacanth. ana ℥. i. antimonij, plumbi viſi ana ℥. i. b.
ſucci centauræ ℥. ii. vel eius loco pul. ℥. iii. ſar. herodi
eribras ℥. i. b. croci ℥. i. bulliar terebunthina cura
melle roſ. parum deinde omnia ſimul miſcerantur:
In iſto caſu mitabilis eſt incarnatio. Interim
in circuiſu etiam ab initio aliquo deſenſuum com-
modum appoſitum eſt. Poſtea *vng. de mum.* ſuper
linteum admoſum eſt. Erat cicatrizatione eſt hoc
vlcus.

SCHOLIA.

De ſinibus ex Galeno multa collecta videas
apud Aetium *lib. 14. cap. 3. & de ſinibus ar-*
tritis apud eundem cap. 35. quod ad vlcerola ſinu-
ſa & cauernoſa egregie commendantur: quibus
& cæua diungere poteris. hoc tempore etiam viſita-
ta, quæ Betapalia inter neotericos ſcripſerint de
vlceribus profundis & cauernoſis, *cap. 4. libr. ſui de*
vlcerib;. Ceterum de profundo & cuniculoſo *Plurca-*
vlcere, quod ſimul Latinis dicitur, inſequẽdũ Gui-
donem à Cauliaco *contra. 4. cap. 3. de vlcerũ profundo*
& cauernoſo, ſciendum, quod vlcerata cuniculoſa ſeu
cauernoſa ſupra appellauimus, quorum officia
ſtriſta ſunt; profunditas vero in latum ſe diſſun-
dit, & ſenſui occulta eſt, multos interdum oſ-
ſiſtaſtus habens, modo rectos, modo obliquos,
citra duriſſimam tamen & callum. Atque hoc vno *Fiſſula*
à fiſtula diſſidet, quamuis promiſcuè turba, eiuſ-
modi vlcerata omnia cuniculoſa fiſtulaſ nominet:
cum tamen fiſtula proprie vlcus ſiſtaltum, angu-
ſtum & calloſum, *Galena, Ceſſo, Aui & Paulo.* Ita-
que quod *profundum & cauernoſum* vlceru recentia
chirurgi appellant, id Latini appoſite ſinuam,
Græci *colpion* nominant. Fit autem, cum adiacens
vlceribus cutis, diutius ſubiectis corporibus non
L 3 coal-
ſcit.

Sordes ab-
luere.

Si ſordes in
putredinem
degeneret.

Emplaſtrum
Auicennæ.

Lavamen-
tum.

Aſenicum
ſublimatũ.

Semper quid-
dam diſ-
ſeruat
multiplex
est.

coalescit, glutinaturq; & cuius multæ ac variae sunt differentiae, nimirum ex *cauernarum magnitudine, sua figura, ac numero* desumpta. Aut enim breues sunt, aut alte penetrantes, iuxta carnem desinentes, aut ad ossa vel cartilaginem subeuntes; sursum, deorsum, vel ad latus tendentes; recti aut flexuosi, simplices aut duplices triplicesve. Galenus autem eorum duntaxat, qui à positionis figura sumuntur, meminit: ut qui præcipue curandi rationem immutent. Siue enim magnus, siue parvus aut brevis, vel altus aut iuxta superficiem consistens, simplex vel duplex triplexve fuerit. eadem semper est eorum curandi ratio. Aut vel sursum vel deorsum, vel ad latus, vel intro ad ossa tendit, curationem variat. Cum enim sursum tendit, facile per eius os saniosa colluuias, atq; ipsum pus effluit. Cum vero deorsum vergit, intus retentum pus, aut sanies cõtriguae partes erodit. Quare nisi factò ex aduerso (ut statim dixerat) emissario, nihil omnino profeceris, siue carnem generare, siue glutinare velis. Cum vero ad latus declinat, aut sursum vergit, aut intro fertur: sed si ita locati pars affecta vel assilata potest, vt libere sanies aut pus, è sinu effluere possit, incisione ex aduerso facta opus nõ est: sed de his adhuc in sequentibus. Cæterum *causa* eiusmodi sinum, seu cuniculorum in vicerum, sunt abscessus, siue suppurantes affectus tardius dissolui, & vulnere perpetuo curata. Pus namq; longum nimirum spacio in suppurato abscessu, aut in profundo vulnere, q non rite expurgatur, retentum ac delitescens, malignitatem, & veluti acetem atq; erodentem quandam naturam acquirit, & cuniculos tandem molitur, qui difficulter admodum carne impleri & glutinari queunt. Ad affectum namq; particulam, quæ iam imbecillitatem contraxit, vndeq; ex circumiacentibus, ac vicinis partibus, imo vero & ab vniuerso corpore, superuacanei humores confluunt; atq; ita ægre sanabile redditur vlcus. *Differentia* cuniculorum seu cauernularum eiusmodi vlcum deprehenduntur turundis (quas *tentis* vocant) & specillis, siue contis (quæ *proba vulgo dicitur*) argenteis vel plũbeis, aut ex alia consimili materia factis, in ipsos cuniculos leniter, ac blande immittis. Item minutis quibusdam, atq; exilib. radiobus, & cereis candelis, nec non & coloratis quibusdã iniectionibus. Color vero materiat, q ab ipsis cauernulis & sinub. egreditur, qualiterque eius manifeste insinuat: si n. tenuis fuerit & lorutæ carnis persimilis appareat, eadem esse haud temere eam iudicabis. At si candida visitur & ietosa, indubie frigida erit. Sed & saniei purisue bonitas, & paucitas, doloris quoq; & tumoris, q prius aderant, prauitudo, si nam carne impleti & glutinari demonstrant. Si vero cõtrita his adfuerint, glutinationem nequaquã adhuc fieri nobis indicant: vt Galenus hinc velibus nobis testatur reliquit lib. 4. de ratione curandi ad Glauconem: *An vero*, inquit, *alte sinu partes coalescant, ex manente (sanie deprehendit) si ea multa respansa, colla rediunda sit: praterea si neg, in ipsa sinu dolor sentiat, nec tumor appareat, sed totum locum aequalis sit, sicum, ac dolorem exeat. Quod si puris probe colla porio exigna in*

*ore conficiatur, multo magis de glutinando sinu sperandum est. Hæc de non de sinu differetis: his, causis & iudiciis dicta sufficiant. Itaq; tempus est vt ratione sinus seu vlcis profundis & cauernosi, non tamè adhuc callosi, curandi aggrediamur, & quæ poterimus breuitate, nunc plequamur. Cum sinus, quo de hic agimus, vlcus sit cauum & profundum, geminis in eo curando scopis ac finis medenti proponitur, vnitio scil. & repletio. Vlcus .n. quæ vlcus est, vnitionem; cautitas vero impletionem desiderat. At quæ dissident, ea vniri non possunt, nisi prius cauitatem, si iam vlcere, vt tu sinu, cinnati a sit, impleuerimus. Ordo igitur curationis postulat, vt à cauitatis impletionem ordiamur. Sed cautitas rursus carne impleti non potest, nisi laborans particula & iusto temperamento sãdita sit, & sinusiple omnino purus, & ab omni iorde immunis extiterit. Itaq; si vel phlegmone, vel erysipelas, vel gangræna, vel interperies aliqua simplex aut cõposita, partem affectam obfederit, manifestum est, q nisi quis illos affectus prius sanauerit, implere cauum vlcus nõ poterit. Fieri .n. non potest, vt lib. 3. meth. videtur: *Galenus inquit*, vt in vlcere vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio, recte vniq; cedat, nisi subiecta caro, p naturalis modo se habeat. Ad hæc cū in ipsa nouæ carnis generatione, duplex puenire excrementum necesse sit, alteru quidè crassius, q *sordes* proprie appellatur: alteri u tenuius, q Græcis *ixor*, nobis vero *sanies* dicitur: ea ex tenui quidè hoc excremento, vlcus humidum redditur, sicuti ex crasso sordidus: duplicibus sane medicamentis sinu uosum vlcus egebit, anteq; carne repleatur: nepe vt humidus est, siccantibus, vt sordidus, xpurgantib. seu detegentibus. Ordo igitur sanationis à sorde expurganda in sanido sinu incipiet; q videlicet nec glutinari quicq; nec carne impleti possit, priusquã purum, hoc est, detersum & à sordib. rite expurgatum fuerit. Vbi vero iã ab omni alio affectu immunis, & purus ab excrementis sinus fuerit, tũ primũ agglutinandis medicamentis vtendum erit. Hæc aut nec detegent, nec expurgant, vt farcorica, i. carnem generantia: sed contra propterea (inquit Galenus) subilantiam omnem in idem cogit. Cuiusmodi facultatem habent medicamenta ea, q *assistera* & *adstringentia* vocantur. Hæc .n. sicant tantisper, dũ humoris redundantiã, qui secundum naturam esse, absumunt. Sed de his alibi scripsimus à nobis diu est.*

Pone ergo in eadẽ particula sinu occupata, interperiem aliquã vel phlegmone, aut consimilem actũ, & cauitatem & vlcus, & sordem simul cõfistere, ordo curationis expostulat vt primũ phlegmone aut interperiem, secundum loco sordẽ tertio cauitatem, & quarto vlcus persanet. Siquidẽ iusta subiectæ carnis temperies, causæ rationem habet, vt quæ concessere secum, q vlcetatu est, faciat, & cauitatem impleat: puritas vlcis, rationem eius sine quo nõ. Atq; hanc sordes interpellas curationem moratur. Habet vero & scilicet cauitas, ad vlcus rationem eius sine quo non, vt lib. 3. Therap. Gal. annotatur. Quando, inquit, nisi cauitas

Ratio curandi sinu seu vlcis profundis & cauernosi, non tamè adhuc callosi. In curando sinu prima ratio est scopum.

In noua carnis generatione duplex puenire excrementum: alteru quidè crassius, q sordes proprie appellatur: alteri u tenuius, q Græcis ixor, nobis vero sanies dicitur: ea ex tenui quidè hoc excremento, vlcus humidum redditur, sicuti ex crasso sordidus.

Vlcus sinu seu duplo eibis eget medicamentis.

Agglutinantium facultas.

Hypotheca.

Quæ sunt differentiae eorum ad rationem curandi.

Causa & effectus.

Si vult differentia quomodo deprehendatur.

Iudicia.

ptus impleta sit, induci cicatrice vlcus non possit. Arque hæc in vniuersum dicta sint de ratione curandi sinus, quod & vlcus profundum & cauer-nosum nostri chirurgi appellant. Cui magna ex parte complicari solet, quæ supra commemorauimus. Hæc igitur vniuersali methòdo præmis-sa, particularem ipsorum sinusum differentiarum quas curanda rationem variare diximus, sanationem subiungamus. Constituitur igitur imprimis sinus ad superiorem partem porrectus, ita vt eius orifi-cium deorsum spectet: talis certe non adeo mul-tum negotii in sanando facies. Quandoquidè per os eius facile sanies effluit, arque ideo promp-te conglutinat, adhuc saltem si quæ itam diu de-clinat, aut intro fertur, aut etiam deorsum vergit, incisione ex aduerso facta opus erit, si passim ipsa as-sidua locari possit vt libere sanies ex eum emanare queat. Itaque ponatur sinus, artus aliquis, nempe cubitum, aut semper occupare: poterit v-tique declius figurat, circa diuisionem ex aduer-so factam coalescere. Etenim in cubito eum oræ gibbeto vicinæ sunt, summam manum elatus protendens, sinum ad effluxionem incohibet. Hic & in femore, si sinus deorsum vergat, & ad genu terminetur, os aurem ipsius sublimè supra femo-rem protendens, sinum ad effluxionem incohibet. Hic & in femore, si sinus deorsum vergat, & ad genu terminetur, os aurem ipsius sublimè supra femo-rem protendens, sinum ad effluxionem incohibet. Hic & in femore, si sinus deorsum vergat, & ad genu terminetur, os aurem ipsius sublimè supra femo-rem protendens, sinum ad effluxionem incohibet. Hic & in femore, si sinus deorsum vergat, & ad genu terminetur, os aurem ipsius sublimè supra femo-rem protendens, sinum ad effluxionem incohibet.

imperius profluens sanguinis, omni candido, atq; al-bus id genus suppressis & sanguinis profusione di-catis auxiliis, cōpescendus. Post hæc autè cetero alt-us, quando opus erit, detergente aliquo medica-mento imbutus, indendus erit; atq; vt id omni-dius fiat, aliter qui sinu adhuc occupat, ut assue-tor, aut alligabitur. Poterunt et ellychnia, seu li-namenta in mundificatio aliquo tincta in sinu ipsū imponi superq; atq; in ambitu dāda sunt, quæ mox infra dicimus. Porro si neq; in uno ip-sius sinuosi vlcetis, plaga comode fieri possit, neq; canitas rota dissecari, sinus totus eluendus erit, col-lum omib; primū quidem deterfentis, si in haren-tem saniem subleuè suspicatus; deinde sarcinosis, id est, carnem generantibus: postea vero ad glutina-tionem medicamentū trāsmissū erit. Ptoinde Gal-lib. 2. de ratione curandi a. 1. Glaucomē, sinu ipsū nunc mclerato solo, id est, melle, nunc quidem puro vino. nunc vero melle eluendum esse monet: sed præsertim in sinu cuius os deorsum spectat, per quod sanies libere effl. at. Hanc namq; sinus, p-funditatem totam, ad glutinationem aptū vt Gal-enus inquit) sola reddere p. rest inuncta mella. Ad purgandū vero sinuū & t. borā lum, vbi scilicet adhuc aliqua leuis caridam foris derel. & su-spicio est. vel ipso eū Aetio auctore, melle sume-hig m-s. At vbi carnem in sinu medio ceteri re-geant, omnino purā esse conecimus, & gluti-na-tionē quæ imas, vino puro subaltingente sinū ipsū eluimus. Vinū n. e iusmodi, q. medium est inter dulcē & asstringens, leuiter glutinat. Si autem cruentus fuerit usq; sit humor, qui ē sinu excernit-ur, oxy-meli (& auro auctore) ceteris præstat. Au-tem & qdā alii, sinū, præsertim maligniorē & vehemētē foetidū, detergent, & eluūt ut lixi-uo, aut morina aqua (vt in obs. præstatent quæ, duxi-mus) aut etiā aluminosa, quæ in hoc affectu præ-stātilissima est. Hæc n. præterit quod potēter for-des abluūt, & parte quoq; affecta eluxione arceat, & repellit, Albucahis chirurgus insignis pag. 2. expri-mū cū aqua & melle ligatur, in sinu cuiusmodi, & deter-sionis & corrigendæ malignitatis gratia immittit. Galenus quoq; vbi sinus ipse, aut situs aut al-terius cuiusvis occasione, foetidior aut humidior est, medicamēta, quæ valētius q. multa d. elicent, & detergūt ad mo veda, esse suadet. Cuiusmodi est medicamētū ex cōbusta charta cōpositū q. ad hanc modū reperatur: Squama erio. galli. nympha singulorū pōdo denariū octo: sandaracha, arsinia, steris, id est, succi cactumeri agrestis singulorū pōdo denariū quatuor: thuris pōdo denariū triū, acramēti siccioris, (quod Græci chalciditū vocāt) trāundē, charta quātū satis est ad inducendū colorē. Debet autē exiguū eius-modi medicamentū portio largo tofice misceri, quod & eius vehemētia remittatur, & per angustā foramē in sinus p-fundum, p. fistulā aut aneā ad cornearē recto ductā foratā possit iniri. Iniecto autem medicamento, vlcetis os linamento con-cerpto claudūdū est, ne id t. fluat. Nisi enī diu-tius maneat, exiccat non poterit. Ceterū si vlcus et aliud fuerit, hoc est, calidā intemperem sibi ad-iunctam habuerit, & vlcus ab ipso sinu oso vlcetis

Si sinus o-rificium deorsum spectet. Incisus ex aduerso quando sinus sit deorsum, quando non.

Ex Paulo. Ex Gal. 2. ad Glaucom.

Si sinum effluxum mollior possumus facere aut puri insti-tui.

Adhuc pu-ri copia: monda est copia si sinus sit deorsum, si non, prius aduerso di-midat. Specillum quod in sinu mittitur, quod sic in sinu mittitur, leue, hoc est, minime asperū esse debet, vnde quo aliquo (vt cura dolori immittit p. sit) illitū. At hæc parte posteriore perforatū esse decet, in modum acus, vt in eo imponi possit ceto aut luto (vt vocant) ex stuppis cannabi-nis, aliqua gracili fascia, aut certe fasciculo quopi-am molli, vt cannabino fascis. Incisione autē fa-cta, dolor qui per ea excitatus est, sedātus erit, &

Si neq; in uno ip-sius sinuosi vlcetis, plaga comode fieri possit, neq; canitas rota dissecari, sinus totus eluendus erit, collum omib; primū quidem deterfentis, si in haren-tem saniem subleuè suspicatus; deinde sarcinosis, id est, carnem generantibus: postea vero ad glutina-tionem medicamentū trāsmissū erit. Ptoinde Gal-lib. 2. de ratione curandi a. 1. Glaucomē, sinu ipsū nunc mclerato solo, id est, melle, nunc quidem puro vino. nunc vero melle eluendum esse monet: sed præsertim in sinu cuius os deorsum spectat, per quod sanies libere effl. at.

Atulium.

Pianum sicuti p. ran.

Oxy-meli.

Aqua alu-minosa.

Medica-mentum ex charta cōbusta.

Ex Paulo. Ex Gal. 2. ad Glaucom.

manans, rubrum & loturæ est nris retentur macta-
ta perfumile appareat, non alienum fuerit ipsum
ablueri meliorato, hoc est, aqua multa recentiori,
in quolenticula, hordeum, rose & balauftium in-
cocta fuerint. Si vero vlcus frigidum sit, & sanies
tenuis & aquosa conficiatur, multa in qua inco-
cta sint matrubium, *albinum*, *pipinella*, & *myr-
ra*, eluendum est. Porro vbi sit ab omni foris
puro sinu efficeretur, carne replentibus medi-
camentis (*sarcinica* Græci vocant) sicani saltem
fuerint, deinde glutinantibus & tandem cicatricem
inducentibus, similiter reliquis vicinibus vt-
tendum erit. Carne autem replent, quæ humidi-
tatem siccant, & sordem detegunt. Itaque idem
medicamentum primario arque ex se se *sordis*
detersionem Galeno appellatur, altero vero signifi-
catu *sarcinicum glutinans*. Quippe quod tali im-
posito medicamento, vlcera carne replentur ac coe-
unt. Opus enim ipsorum proprium est (*vt alibi*
scripsit Galenus) affectam partem recrementis vacu-
are, ne videlicet sanies carnis generationem
glutinationemque impediat. Sarcinica igitur de-
tergendi etiam vim habent, sed omnis rosionis
seu motus expertem. Finis autem glutinantium
est, nullam inter coitura subnascentem humidi-
tatem permittere. Glutinatorum namque (*vt tertio*
metodi Galenus ait) vnum id propositum est, vt
eius quod secundum naturam est, redundanti-
am consumat. Epuloticum vero, id est, cicatricem in-
ducentium medicamentorum finis est, non hanc
totam subnascentem, ac redundantem humidi-
tatem impedire, sed etiam nunc consistentem in
iis quæ mox cicatricem ducunt consumete, ad
hæc callo obducere, & adstringendo indurate.
Sed de iis vide Tagatum fufius lib. 6. & *Andro-
tarium Guidam*. Quæ autem sint vlcera minime
malefica, quæ cicatrice indigent, ad longum do-
cuit ipse Actius ex Galeno lib. 4. cap. 35. & cap. 37.
de aridis medicamentis quæ vlcera nequaquam
malefica consolidant, & cap. 38. de emplastris quæ
vlcera non malefica ad cicatricem ducant, quæ
omnia non opus est hic ad longum explicare. Sat
est locum indicasse ex quo ea remedia petenda
sunt. Ergo (*vt ad propositum reuertamur*) si causus si-
nus catrem tequirat, primum medicamenti,
quod charta consistat, aridi, paululum cum multo
rosaceo inferi conuenit. Deinde carpo linamen-
to os obturari. Inde emplastrum liliis aut Machæ-
reosis aut simile quoddam, vna cum rosaceo ce-
rato liquidiorè solum inicitur. Vbi vero me-
diocriter carne tepletus est sinus, aliquid ex glu-
tinantibus medicamentis non vehementer sic-
cantibus adhibendum est, quod crescentem
tenellam canem blande & sine motu cogat, non
aliter ac si recens aut cruentum vulnus curetur.
Curatur autem hoc mollibus, blandis, mini-
meque dolore excitantibus medicamentis, qua-
lia sunt *embæa*, quorum opus seu facultas est
conungere, & diuisas partes conglutinare, vt in
pristinam vnitatem particula redatur. Multa
(inquit Galenus) eiusmodi medicamenta inueni-
untur, alia quidem ex bismine confecta, vo-

tanturque nescio quatione. *vt idem ait*, empla-
stra Barbara: alia vera, quia fului & fulci sunt co-
loris, *viridis*, & *pæa* nominantur, ex argenti spa-
ma & æugine liberalius decocta. Horum autem
medicamentorum multas, Galenus, Paulus &
Celsus docent. Sed præter de hac re interpretis
vulgaris Auicennæ verba subiicere. *Ad incarnan-
dum*, inquit, *oportet quod medicina fiant currentes la-
uatiue, cum viscositate adherere, & incitantur in tu-
morem chyliferum. & immittantur cum chylis & tenui*.
Et nos quidem iam experti sumus emplastrum
apostolicum, id est, *apostolicum*, & *centaurum*, quia
cum ea implentur, & est mirabilis valde. Suc-
cedit huic *symplyon*, deinde *urdu* *illyrica radix*
postremo aris farina. & id genus alia, quæ glutinan-
di facultatem habent. Porro sequens medicame-
tum, quod in frequenti est vtu apud chirurgos,
miram vim habet in glutinandis seu incarnandis
eiusmodi vlcibus: & aqua decocti *hordei lib. 2. mellis*
ros. 3. sarcinici 3. myrræ, thuris ana 3. vni *modi*
riseris 3 vi coquantur omnia simul vsque ad terti-
as, id est, vsque ad consumptionem tertie partis.
Quibus & addi potest interdum aliquid aloes.
Cæterum post glutinantia medicamenta imposi-
tionem, sula *spongia noua ex mulse*, iuxta Galeni
consilium, circumponenda est, quam fieri potest
molliorima. Eius autem deligatura à sinu fundo
incipiat, & eius ore finiat: fasciatum vero spiræ
sive circumflexum, sinus profundum sine dolore
circumæ paulatim vsque ad os eius relaxetur,
eidemque (*orinquinam finem*) indatur medicamen-
tum molle, circumducto forinsecus emplastro
ad os ipsius sinus forficibus disicillo, vt sanies ef-
fluere possit. Effluet autem à sinu sanies, suppo-
sito aliquo paruo emplastro ad solutionem vsque,
quam tertio die quoque faciens, hoc ipsum tan-
quam operculum circumpositum auferes, reli-
cto eo quod totum ambit suum, medicamento.
Ideo autem tertio quoque die, aut certe citius
aut tardius, prout res efflagitat, demenda spon-
gia est, ac paruum emplastrum, quod superposi-
tum erat, vt si qua humotis colluies in ore sinus
collecta sit, vacuetur, exploremusque an ake si-
nus partes coaluerint, an minime, quod ex ma-
nante sanie (*vt docet Galenus*) deprehenderet: si
scilicet ea multa vel pauca, coacta vel crudas sit.
Itaque alias ipsius partes coaluisse demonstrat,
pus coctum ac paucum: præterit si neque in ip-
so sinu dolor sentiatur, nec tumor appareat; sed
locus totus æquabilis sit, sicut ac de doloris experts.
Cumque spongia tuctus impositus, tursusque
(*vt diximus*) adalligaueris, postero vel tertio die
soluito, *vt dictum est*, semper linetolum sinus ori
ad motum permittans, quod eodem emplastro
illitum, totum os ambitur cingat. Neque vero o-
mnino appressum (*vt Galenus admonet*) esse debet:
sed ita, vt pet id tota sanies vacuati possit. Itaque
cum secundo vel tertio quoque die (*vt iam semel*
arque iterum dictum est) spongia vel paruum em-
plastrum extimitur, considerandum, nulla ne an
pauca, cruda an cocta materia ad os vicinis af-
fluxerit. Deinde experts ne sit an particeps dolo-
ris locus

*Circa & pæa medi-
camenta.*

*Medica-
mentum
incarnans
& glutinans.*

*Modus de-
ligandi si-
nus post
glutinan-
tia medica-
menti
imposi-
tionem.*

*Tertio
quoque die
spongia ac
paruum
emplastrum
demon-
stranda.
Lib. 2. de
arte curat.
ad Glan.*

*Si vlcus
sinuosum
frigidum
fuerit.*

*Idem me-
dicamentum
detergen-
tium, sordis
detersionem, &
glutinanti.*

*Sarcinico-
rum facul-
tas. Glutinan-
tium finis.*

Epuloticum.

Actius.

*Si causus si-
nus car-
nem requi-
rat.*

Embæa.

de recte dicebat Arnoldus, humiditas dominans
 & acellas frigidas corrupta fistula viam præst.
 Hæc autem nomen accepit ab humiditatem
 fistularum translatione, ut Paulus annotavit. Quan-
 doquidem in eis tantis quedam deprehendit-
 tur, humiditatem cavitatibus similis. Fit au-
 tem fistula in omni fere parte corporis; habet-
 que quædam (ut Celsus ait) in singulis locis
 propria: Sed de communibus hic dicimus.
 Differentiæ igitur fistularum plures sunt, sicuti
 & sinuum, quæ ex situ, figura, numero, magni-
 tudine, & aliis id genus sumuntur. Si quidem
 aliæ sub cute extrinsecus sunt, aliæ altius penet-
 rant, aliæ rectæ, aliæ flexæ & tortuosæ sunt: aliæ in-
 carnem desinunt, aliæ ad ossa aut cartila-
 ginem penetant: aut ubi neurum horum sub-
 est, ad interiora perueniunt. Aliæ nervos at-
 tingunt, aliæ venas aut arterias occupant. Aliæ
 præterea simplices sunt, aliæ duplices, triplices-
 que, ab uno utriusque ossis, quæ tres sunt, aut et-
 iam in plures finis diuiduntur. Aliæ deinde fac-
 ile, aliæ cum difficultate curantur. Arque etiam
 (inquit Celsus) quædam insanabiles reperiuntur.
 Hinc ego a vulgaribus fistulas ad Diuos relatas
 esse puro, quod eorum opus indigeant: quare i-
 diota tum vulgares foramine Diui Quirini fistulas
 vocant. At hæc deinceps de signis & indicis
 adiciamus. Fistularum itaque dignosciones su-
 mendæ sunt ab his quæ secundum essentialem
 rationem ipsius insunt, atque etiam his quæ consequen-
 ter accidentibus & effectibus. A substantiâ autem ipsi
 dem inherenti, ut ab illo (inquit Guido) co-
 ccoloso, & a forma fistulæ instrumentalis & fa-
 cturæ. Callositatis namque cum forma fistulæ,
 est naturalis est differentia ipsius fistulæ. Ab ac-
 cidentibus vero & effectibus, ut à violentia illa
 horribili, quæ aliquando ab ipsa fistula effluit, e-
 manante. Item à dolore, quoniam ea medicus esse
 si let, nisi dum partes quæ iuxta nervum sunt,
 occupat. Cæteri um simplices ne fistulæ sint, aut
 in plures partes diducantur, cognosci potest ex
 modo prius. Cuius si plus fertur, quam quod
 simplici spacio conuenit, plures finis callidos
 esse manifestum est. Corporis quoque inquini-
 tatione docet, num in plures partes fistulæ pen-
 etariat. Quia sæpe cum quis aliter decubuit,
 aliterque membrum collocauit pus ferri, quod
 iam deiecit, incipit: testaturque non solum
 alium sinum esse ex quo descendat, sed etiam
 in aliam corporis partem eum tendere. Cum-
 que fere mixta sint caro & neruum, & aliqua
 nervosa, quales fere tunicae membranaeque
 sunt; genus quoque pus docebit, num plures
 finis rursus disierit à corporis genera petroferiat.
 Si quidem ex carne (inquit Celsus lib. 5.) pus laue,
 album, copiosius fertur: at ex nervoso loco
 coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus
 ex nervo pingue & oleo non dissimile. Cuius sen-
 tentiæ retragitur videtur Aetius, sic de nervi fistu-
 la: quandoque humores inde de clausa tenuior est, ei si-
 milis, quæ ab ossibus de fluit, non quidem oleagi-
 nus aut pinguis, sed viscosus & glutinosus. Sed &

ex aliis notis quam ex pule, deprehenditur nervi
 fistula; nempe dolor: & saporis enim punctio-
 nisque sensum incutit. Deinde motus, quia
 eo nervo pestifici solet, deiecit apparebit. Sed
 in specilli attactu (inquit Aetius) molestus a-
 cutusque sensus redditus, tum manifestissime
 indicabit. At fistula locum erodente, si vena su-
 berit, tunc crassus sanguis effunditur: si arteria
 aperiat, tenuis & flans cum multo spiritu
 stidoreque exibat. Ante omnia autem (ut re-
 ste censuit Celsus) demitti specillum in fistu-
 lam conuenit: ut quo tendat, & quam alte
 perueniat, scire possimus: simul etiam proxi-
 mus humida an siccior sit: quod extra specillum
 patet. Si vero os in vicino est (ut quid dicit porci,
 an ex fistula iam penetravit, an non) quatenus no-
 cuit. Nam si molle est, quod vicino specillo
 contingitur, intra carnem adhuc vitium est: si
 veto magis id remittitur, ad os ventum est. Ibi de-
 inde si libitus specillum, nondum caries est: si
 non labitur, sed æquali inhiit, caries quide-
 m, verum adhuc lauis est. Si inæqualis quo-
 que & asperum subest, vehemens caries ex os
 est. At cartilago ubi subest, ipsa sedes ducet,
 peruenit: quæ esse ad eam ex renixu patet. Ce-
 terum si oblique fuerint fistulæ, flexumque ali-
 quem, vel plures habuerint, ut specilli apex pro-
 gredi nequeat, vigulam plumbeam, stanneam
 vel conlabimus, aut ceream potius candelam: as-
 sumemus, quæ iter penetremus. Cumen enim sic-
 xilis admodum sit, ad hitulæ figuram facile ac-
 commodabitur. Hactenus de signis fistularum:
 nunc de indicis seu prognosticis. Fistulæ si al-
 tius penetrant, ut ad vrimas demitti collu-
 rium non possit, si tortuosæ atque intricatæ
 sunt, si multiplices, maius (inquit Celsus) in ma-
 nu, quam in medicamento præsidium est, mi-
 nusque operæ est, si sub cute transierit: fecun-
 tur, quam si recta intro tendunt. Expedita quo-
 que curatio est in fistula simplici recenti, intra
 carnem, adiuuatque ipsum corpus, si iuuenile,
 si firmum est, iniuncta contenta sunt. Item
 quæ si fistula, os, vel cartilaginem, vel neruum,
 vel mûculos lædit, si articulum occupauit, si vel
 ad vesicam, vel ad pulmones, vel ad vuluum,
 vel ad grandes venas arteriasve, vel ad inaniam,
 vel guttur, stomachum, thoracem penetran-
 tur. Ad iniectionem quoque eam tendere, semper pe-
 riculosum: sæpe perislerum est. Quibus mul-
 tum mali accedit, si corpus vel ægrum vel leni-
 le, vel mali habitus est. Ægre (inquit Paulus)
 consuefcit in ano fistula, quæ officio caret, tum
 quæ delitescit & in os terminatur, multifican-
 que fistila est. Sed (ut etiam Guido ait) omnis
 fistula ex toto genere difficilis est curationis,
 maxime profunda, tortuosa & in veterata plures
 habens cõcavitates, quæ est in mēbro mobili, vel
 ad interna penetrat, ut pedus, vētrē & vesicā, aut
 aliq ex costis, aut spoudyles, vel iūcturas subest,
 potiusquam manus, aut pedus: tales omnes sus-
 pectæ sunt, & difficilis curationis. Et occupatio
 in ea est (ut recte dicitur Alincasus labor, & ignorā-
 tia. Sed

Nervus in
 fistula, con-
 sistentia.

Fere aliquæ
 arteria &
 vena signa.

Fistula he-
 rille maxi-
 me exple-
 ramus.

Officiarii
 est nota.

Obliquæ
 fistulæ quæ
 modo ex-
 plenda.

Fistulæ
 indicia seu
 prognosti-
 ca.

Cer. Cel-
 sus lib. 5.

Paulus.

Guido.

Alincasus

Vnde fistu-
 læ nomen.

Fistulæ
 differentiæ
 multiplici-
 bus.

Cer. fistula
 ad Diuos
 relata.

Signa
 quædam fi-
 stularum.
 Fistulæ
 rectæ & qui-
 bus pen-
 etantur.

Quædam
 nota de
 fistula, ut
 signa
 si fistula
 ad mû-
 ctum.

Alincasus

ria. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia & noxae. præterea autem simplices hæc sint, aut multiplices. & in plures partes diductæ. Hic genus igitur de fistularum diff. rentiis, signis & indicis. Deinceps vero de medicamentis ad easdem conferentibus differere oportet, atque de fistularum in vniuersam curatione dicere. Nam hæc harum curatio alia, *teste Guido de vniuersali* est, alia particularis. Vniuersalis autem tres scopos curandi habet, ut præscribendi viçus rationem, seu viçus regimen, aut constitutionem, *ut vocant*, materię peccantis enacuationem, tertium ut membrum internum robotando, fistulam exsiccando. In primis igitur genus videtur conueniens, & quod substantia & qualitate, causis, quæ fistulæ consolidationem impediunt, aduersatur, instituito. Deinde corpus vniuersum à superuacaneis & noxiis humoribus illis tamen primis, si ita res exigat, expulsiui parati idoneo cathartico medicamento purgato. Mox portionibus robotandis ac deficiendis interioribus partibus accommodis, fistulam ad consolidationem præparato. Cæterum tamen si porciones multæ ad hæc intendentur à variis authoribus descriptæ sint, duæ tamen sint (ex *Guidone de Causis*) quæ frequentius vñ & felici successu à recentioribus medicis probatæ sunt. Prior ad huc modum habet: *ne agamus part. ii. plantag. part. ii. folium oleæ part. i.* Scindantur minutim, & contendantur postea in vino albo coquantur, & fiat colatura, de qua quolibet die sub aurorum cyathus vnus administretur. Altera: *ne osunda (que si firmarij Dufor.) part. iiii. gentiana part. ii. ceruaria part. i.* coquantur in vino albo, quæ vt prior administretur. Hæc postrema etiam valde efficax est ad ossium corruptorum expulsiuonem. Ego hæc etiam tum similia de coqui iubeo cum decocto ligni gualaci. & eam potionem permagna eum vtilitate etiam ad sinuosa vlcera, commodissime sæpe propinaui, tum ad fistulas omnes. Quod autem ad Topica pertinet auxilia, & regimen (*ut vocant*) particulare, quatuor sunt ordine peragenda. Primum quidem fistulæ officium, si non satis hiet, aut si nimis strictum fuerit, imo vero sinus ipse fistularis vsque ad fines eius, si fieri possit, dilatatari debet. Secundo loco callum eximere, fistulamque auferre, atque omnino destruere conuenit. Tercio, post exitum (quocumque modo id fiat) callum, sordidus detegenda veniet. Quarto, ubi purus iam ab omni sorde sinus videbitur, similiter reliquis vlcibus ad sanitatem perducetur; nempe glutinatotis, seu (*ut loquuntur*) incarnantibus medicamentis, & epuloticis, id est, cicatricem inducentibus, atque etiam (*si carnis aliqua fuerit amissa*) sarcocticis, id est, canem generantibus pharmacis. Ergo si nec aduri nec incindi commode possit fistula, & eius os, aut sinus totus, siue vnus ac simplex, siue multiplex fuerit, non late satis pateat, immisso collyrio aliquo, seu (*ut vocant*) centa ampliatari ac dilatatari debet. Materia autem ad conficienda collyria, dilatandis e-

iusmodi fistulis & sinubus non callosis idoneæ sunt radices gentianæ & mali reitæ (quam *li-floretiam* Græci nominant) præter item hyssopus, hoc est, vitis alba, & dracuntis seu draconculi, præter maioris, qui *serpentaria* officinis, & Romanis veteribus celeberrima nuncupatur. Sed supremis huic negotio accommodata sunt fustula spongæ contorta & valide compressa. Ex his igitur contra collyria siue penicilla (quas *remias* vocant) altera quidem parte tenuia, altera paulo pleniora. Arque ea parte qua tenuia sunt, demitti oportet in fistulam, sed filo semper appendice, vt tutius, si alius descenderint, & promptius, si nimis hæreant, extrahi possint. Dimittantur autem horis duodecim, aut certe plus aut minus, donec late satis de hiscat fistula. Cæterum orificiū fistulæ, atque eius sinus, sufficienter dilatatis, ipsius destructio prorsus molienda est. Id autem trifarium fieri conuenit. Nempe vel medicamentis acrioribus, & callum exterenitis, vel incisione sinus, & vitione: vel incisione circa vitionem, cum calli euulsione. Ergo si recens fuerit fistula, aut non adeo multum antiquata, necetiam admodum profunda aut flexuosa, & chirurgiam, hoc est, sectionem & vitionem, prorsus recuset æger, medicameura callum exterenita adhibebimus. Deinde remoto callo ad curacionem reliquis vlcibus communem vertemus. Itaque callos eliduntur atque exciduntur, quæ ex Galeno, Paulo, Aetio, Cornelio Celso & aliis recentioribus chirurgis subiungam. Spondylii radix circumcisa, & fistulis impoluta, earum callos eximit. Item veratrum nigrum duobus tribusue debuis infectum idem præstat. Ad hæc amara cocta, & in colutionem adbibita. Ad idem, elaterium, id est, succum cneumetis agrestis, seu (*ut vocant*) asinini, terebinthina exceptum in collyria cogito, imponitur: vel læscipiti radices succum infundito. Id quod sequitur etiam callos confirmat Paulo Agenteæ Argenteæ ꝑ xii. annorum i. 5. u. excepta aceto in longum diducuntur, & fiunt penicilla. Hoc medicamentum expeditissimum atque ex primis esse ad callos eximendos, ex præcepto Megetis nobis testatur reliquit Aulus Cornelius Celsus. Verum exemplaria omnia eo loci corrupta sunt. Pro drachmis enim *lucida* habent tantum denarios duos. Plurima eius collyria, hoc est, fistulis callos exterenita, à modo nominatis authoribus describuntur, ex quibus quæque, quæ suo proposito magis conducere videbuntur, potent deligere, & in vsum assumere. In communi autem vñ (*ex Guidone de Saliceto*) apud recentiores chirurgos sunt collyria siue penicilla ex trochiscis aphodelorum, & iuxta Rogerium ex sapone & calce. Adhæc quæ auripigmento, hoc est, arsenico illinuntur penicilla, neminem vnquam fecerunt, vt præter quotidianam experientiam, recentiorum fere omnium scripta testantur. At vero si fistula multos & valde anfra-

*Fistula de-
structa sed
interfic-
tio.
Trifarium
fistula de-
struimus.*

*Callos ex-
terenita.*

*Locutio
Ger. Callo
amendat
luc.*

*Trochis-
aphodelo-
rum
descripti.*

*De fistula
cum cura-
tione in v
niuersum.*

*Rationes
vidæ vni-
uersale.*

*Potiones
fistula i-
doneæ.*

1.

2.

*Ratiocina-
di particu-
lari.*

*Simul fistu-
la amplia-
tio.*

duos aliosq; cuniculos habeant, ita vt in eos colliria eiusmodi, prout res exigit, inda nō possint eadem ex aceto aut liqore aliquo ad rem accōmodo per anticulariū clysterem intro infundenda sunt, vt scilicet per omnes multiplices ipsius fistulæ anfractus perferantur. Mixtice autem prodest in antiquis fistulis & admodum callosis sequens iniectio: *℞. vnguenti Egyptiaci ℥ss. subtilissimi ℥ss. lixivii ℥iiss. aquæ rosæ ℥ss. arfenici ℥i. aqua plantag. ℥iiss.* bulliant vsque ad consumptionem tertie partis. Iniecto medicamento, fistulosi vlcetis os, linamento concepto (vt de fistula dictum est) aut quouis alio claudendum est, ne id resiliat. Nisi enim aliquandiu maneat, nullum effectū effatu dignum præstare poterit. Si autem duplices aut multiplices eiusmodi fistulæ, breues, intraque carnem sint, eadem enim medicamenta quæ callos elidunt, arida in calamus scriptoriorum conici possunt. Calamus igitur ille ori fistulæ aptandus est: postea in enim infusillare oportet, vrea medicamenta intus compellantur. S. quando vero longior (inquit Celsus) & transueria fistula est de nullo specillo, contra principium huius incidi commodissimum est, & collum vtriusque demitti. Hinc & fistula tortuosa & intricata nunquam pericuri (vt docet Arnoldus de Villanova) nisi telles aut nitrosos liquoribus imbatur. Aqua fortis Alchymistarum, saltem prima, in eiusmodi tortuosis, atque labyrinthi modo flexuosis fistulis, mixtice prodest. Hæc enim (inquit Guido ex sententia Arnoldi de Villanova) omnes fistulas mortificat & dissipat. Secundus modus abolendi fistulas est, qui peritiam per incisionem rotius cauitatis fit, deinde per aduersionem, quæ vel caustico medicamento, vel ferro candente & ignito inducitur. Certe sunt quæ magnas artenas, vel neruos, vel tendines notat dignos, aut membranam colles succingentem, aut aliquam principalem particulam deueniant, vel nequaquam (vt supra diximus) vel certe cum multa artificiosaque diligentia, ac prudentia attingendæ sunt. Reliquis veru hunc in modum manum admoventur. Primum quidem tentabimus, an testæ sint vel oblique, demisso intro (vt paulo ante inquirimus) specillo, vel cereæ candela. In quibus autem duæ pluresve oræ habentur, quæ specillo aut consimili instrumento tentari minime possunt, ita notantur. Clystere in sinum per vnum os liquorem compellimus, exque transu eius in reliqua ora, facile deprehendimus, vna ne, quæ multa ora habeat, an nullæ fistulæ sint. His ita exploratis, si in summo fuerit sinus, atque in angustus, specillo demisso explicandus est, supra quæ id accommodata figura, scalpello incidendus. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo & ferro persequendi sunt idemque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ ventum est, diuiso vlcetis imponenda sunt penicilla, cui candido liquore imbuta, quæ labra solutæ coniuncturæ distendant, & mulierem coire non sinant. Postera die locus aduen-

duserit, vel ferro candente, vel caustico, seu adurente aliquo medicamento, nempe vel puluere alphodelorum, vel arsenico, aut alio consimili, quod facularis sit eandemque vlcetis. Aucennas hyd-argyrum, id est, argenti vium, sublimatum admouet, quo efficitur, vt nihil corruptum, nihil callosum, nihil denique quod præter naturam sit, in vlcere remaneat, quod non omnino desiccetur. elidatur, & absumatur. At si non summa occupauerint fistulæ, & sub cute non transuerse ferantur, sed rectæ intendant, vbi quam profundissime potest, & quatenus licet, incisus fuerit sinus, obiculatum totum callum, modo qui nuper dictus est, si fieri possit, auferemus. Quod si aliquid ex eo relictum fuerit, adurente id medicamento absumemus. Si autem multum sit, quod ex callo remansit, nec medicamento cedat, candentibus ferramentis adurendum est. Cæterum super poneuda sunt atque in circuitu semper admouenda quæ refrigerent & reprimant. Nam fere quæ circa fistulam sunt (vt Celsus ait) aliquid habent inflammationis. Quomodo autem sequeantur os corruptum, superius fuit dictum. Signum autem quo dignoscimus medicamentum acce atque adurens, suum effectum, quod cum est, induxisse, est vlcetis elatio siue tumefactio, & (vt Rogerius dicit) trium dierum mora, vt communis vltus habet. Itaque aduulsa, & vt oportet, siccatata fistula, mirgatorio aliquo medicamento primis diebus vitior, vt oleo cum ouilureo mixto. Deinde itaque crustas, ferro ignito aut adurentem medicamento indutas resoluunt, ac deiciunt, admouet: cuiusmodi est hyssopum, aut aliud aliud simile, pingue ac vltuosum. A quorum vltu non prius desistito, quam crustæ deciderint & in pus conuerse fuerint. Morificata autem fistulæ euidens argumentum est, cum pus quod ante multum & crudum apparuerat, nunc paucum, & coctum visitur. Tertius modus abolendi fistulas est; qui per incisionem fit, siue cauterio, vel actuali, (vt vocant) vel potenciali. Itaque facta quemadmodum ante prodium est, incisione vsque ad finem, seu fundum ipsius fistule, callus rotus vel vnguibus, vel acie scalpri, vel cultro rasorio, id est, nonacula detrahid debet, ita vt locus, seu sinus ipse, purus & ab omni sorde mundus appareat, quod viuz ac probe carnis præsentia deprehenditur, vt docet Aucennas. Et hæc vera est fistulæ curatio, quam statim, si nihil obstitit, aggredi debemus, quoties fistula nobis sananda & abolenda proponitur. Cæterum fistula in torum abolita, detergentibus, si quæ sordes adhuc supersit, & sarcoticis, siue incarnantibus medicamentis vltros oportebit: qui postremo duo scopierant in sanandis fistulis proposti. Ergo callo fistulæ eliso, atque absumpto, si fordes aliqua subsistuerint, vel aqua in qua eruum coctum sit, sic vt huic quoque mellis paulum adiciatur, locum abluito, vel sequenti medicamento repurgandis fistulis, vitior. Terebinthinæ in aqua vi-

At antea
quasi &
valde cal-
lescentia

Si fistula
longior &
transueria
sit.

Aqua al-
chymista-
rum.

Secundus
modus abo-
lendi fistu-
las.

Argentum
vium su-
blimatum.

Si fistula
superficialis
sit, non
inducit.

Quid possit
augere
& resili-
re in
fistula ac-
cedens.

Morifica-
ta fistula
signum.

Tertius
modus
abolendi
fistulas.

Vera fistulæ
curatio.

Tertius
scopus
curandi
fistulas.

Miferabilis eſt ille caſus cuiuſdam viri ſexagenarii, habentis excreſcentiam cancroſam viceratam, ad quantitatem pilæ, emittentem virulentiam, ad hæc magnitudine ſua ita excedentem, viſque adeo vt oculum plane deſitſet, nec conſpici poſſet, vt quando conſpiciebatur, viz piſi magnitudinem habere videretur. Excreſcentia autem hæc originem capiebat ex argulo lachrymali. Cæterum non poſuit coſtodi cædentibus medicamentis, ob lenium, & propter debilitatem partis nec conſumi, propter continuum fluxum. Ideirco D. Iodocus, chirurgus inſignis, qui accitus erat, ſibi ſcopum palliandi & ioborandi oculum propoſuit: & per triduum apud eundem manens, vng. diapombylyſis præſcripſit: & diſcedens collyrium pro conſolatione oculi, & etiam carnem coopertentem oculum conſumens præſcripſit: quod erat tale: *Animum ſericum aqua capriſoli ʒ i iuriæ præpar. & extrinſicæ aqua roſ ʒ i. b. cimelia ʒ y puluerizentur, & cribrentur vt alibi, & cum aqua roſ. deſict. membra ʒ iij. miſce & fiat collyrium, addendo in fine camphora pulueriſata ʒ. b. Deinde præſcripſit vng. palliarium exticcans, vt non creſceret ſed conſumeretur: ꝑ. aqua capriſoli, roſ. ſolatri ana ʒ i. iuriæ præpar. cum aqua roſ. terra ſigillata, mini ana ʒ i. plumbi viſi & loti cum aqua roſ. ʒ iij. pulueriſentur ſubtiliter, & miſceantur cum aquis prædictis per hoc em: mane vero cum olei charivi q. ſ. & cera ʒ i. thuri pulueriſati ʒ. b. fiat vng. adiciendo ʒ. j. camphora. Cum iſto vng. fecit emplaſtrum: prius loto oculo cum collyrio.*

SCHOLIA.

De cancro non vicerato diximus lib. 4. obſer. & curationem: chirurgicam noſtram: & de tumore præter naturam obſervationes. & quomodo cancri fiant, & in quibus locis abunde quoque diximus lib. 17. obſer. & curationem noſtram medicinalium, cum de mammillarum affectionibus ſcriberemus, poſſiſſimum Scholiis Obſ. 25. de cancro in membra ſiſtente. Iam quoque plurima de cancri viceratis & non viceratis tum occulſis egimus lib. 26. obſer. & curationem medicinalium, Scholis Obſer. 35. quando de vteri carcinomate loqueremur: etiam Scholis Obſer. 3. lib. 4. obſer. & curationem chirurgicam, de cancroſo tumore, & quomodo curetur, ad vnguem ſcripſimus: deinde eodem lib. obſer. & Scholis euſdem, de cancro vicerato, quomodo fiat & curetur, abſoluimus, vt nõ opus ſit eadem repetere, quare eadem loco iam citata diligens lector perſcrutari poterit: & ita omnem vicerum curationem committam, tum earum differentiarum vlcera famoſa cõplectentiam abſoluimus: nunc teſtat paucæ de iſis ſubiungere, prout in quibuſdam ceſtis particulis ſunt, quæ particulæ vlcere præſcripſit quandam ſibi curationem requirunt: & vitra intentiones cõmones, quas de vlcerebus curandis nunc explicauimus, non ſolum in prognoficis, ſed etiam in curatione variare ſolent. Nam vlcera capitis ſi vſ-

M

que

Medicamentum ad ſiftulam purgans ac diſcuti.

*Viſa abſoluta ʒ iij. ſucci apii, ſucci cynogloſſi (quod Romanſi linguam canis appellant) ana ʒ vi. mellis roſ. cocti ʒ i. b. ariftolechi. retund. ʒ. j. farina lupinerum ʒ. b. coquantur ſucci & terebinth. cum melle roſ. vſq; ad conſumptionem mediæ partis focorum, deinde reliqua commiſceantur. Si prædicto medicamento abſorſio myrrha ſarcocolla, rad. perſicani arida, & iris, ſingulorum momentum adieceris, optimum incarnans medicamentum effeceris, modo ex eo turrida illinatur. Aliud Aetii Amydeni experimento probatum, callum externum, & incarnans. Radicum liliorum crematarum cinere ſiftulam repleto, & callus excider; quo ablato ſimilacem herbam fumo, arundinibus ſe implicantem, flore candido, foliis horteniſi phaeolo ſimilibus: qua areſceta, viſa, trita ſiftulam replebis, & incarnabitur. Aliud aridum Magiſtriani, ab eodem relatum ſiftulas incarnans: ꝑ. Chamaleontis nigri radices, pini corticem, ribus maſculum, ariftolechiæ longæ pari pondere terito, ſiftulæq; nulla ablata aridum applicato. Sequens quoque collyrium à quodam chyruugo noſtri temporis vſurpatum, ſiftulam agglutinat, inſigniter deſiccant, & affectæ parti robur addit. Aqua viſa ʒ iij. vini maluatici ʒ. j. mellis roſ. ʒ. x. myrrha, radices perſicani trita ana ʒ y. ſarcocolla, aloës hepatica ana ʒ j. b. miſceantur deinde bulliant omnia ad ignem moderatum vnico feruore, & per oticularium clyſteterem, quam ſyringam vocant, inſincentur in ſiftulam. Aliud ad ſiftulas vſque ad os attingentes, ex Aetio: ꝑ. Squamarum eruginiæ, amomiaci thymiamati partes æquales, ex aceto terito, & paſtillum, id eſt, trochiſcũ conſiſto. Deinde collyria, hoc eſt, torundas, ſiftulæ æqualia formaro, & imponito. Quomodo autem oſſi viciato & corrupto mendendum ſit, in præcedentibus diximus. Hæc de vera ſiftulæ curatione. Si tamen ea ipſa ſit in tali loco vt cutari nõ poſſit, & quando eſt in membris ſublimibus, & in locis vicinis neruorũ & venarum, vel ſi eger ſit debilis, neque poſſit ſuſtinere chirurgiam, aut eam abhorreat, vt poſſius cum ea ægritudine permanere velit, ac præſtantis ſit non curari eo modo quo diximus, cum peior forte affectus ſuccederet, vt in ſiftula longanoniſ, inuoluntarius fecis exitus, tunc neceſſarium eſt ipſam palliare (vt dicunt) cum victus ratione, purgatione, & diuerſione materię ad partem minus nobilem, & mûdificare ipſam à carne fraudulenta & vinctuoſa. Deinde repletur (vt Guido annotauit) exſiccantibus domeſticis medicamentis, & cooperiatur diapaſma, aut emplaſtro nigro: hoc enim modo diutius quia manebit: interim cauendum eſt ab aqua, à ſitu dolore inferente, & motu laborioſo. Et iſtam palliationem ponit Auicenna: & Azoſolus de Villanova ita de ea commentum tum rationem attulit, cum dixit: *Atcarum innatas a lû, quod dicitur menſis, vt in ſiftula inuenerit, obſtari nequit abſque metu grauioris incommodi, niſi manatio conſueſcit ad præxiat deſinetur.* Hæc de ſiftulis dicta ſufficiant: nunc ac vlcera cancroſa.*

ſaæcenda.

Quoniam ſi opus, carnis generatio.

Medicamentum ad collidationem & incarnationem. Aliud ſiftulam incarnans.

Medicamentum ad ſiftulam longam optimum.

Aliud ad ſiftulam vſq; ad os pertingentem.

Palliatio.

Vlcera
pura.

que ad cranium aut meninges perveniunt, & ad meningas internas, ut in talpa & testudine sepe contingit (vt Guido c. 2. de vlcibus capiti doct. secunda de vlcibus prout insunt in membris) (oppositis annot. aut.) haud exiguum in operando infertur periculum, maxime iuxta commissuras. Et ideo consilium quoque Rogerius potius tale curationem relinquere, q̃ opere psequi, & hoc (inquit Guido) considerans vna cū Lanfranco, in talibus plus consulere solo palliationem q̃ curationem. Nihilominus & ipse Rogerius, quantum ad chirurgiam, in tali casu si aeger affectet & requirat, præcipit vt cutis tota radicitus separetur, & cranium infectum trepanetur, & eleuetur, & à dura matre separetur: & postea cum panis & ellychnis in melle rosato infusus, & aliis auxiliis tepurgetur, & incarnetur, vt de vlcibus capiti dictū fuit. Id & præstabat præceptor ipsius Guidonis vt ipsemet Guido, in Graeco quodā, qui fistulam & corruptionē ossis in capite pone aures paciebatur. Iamertius autem post trepanū & ossis depurationē, ad hunc palueret deveniebat: *¶ Rana aquatica cōfusa ē b. gallarū, salina, myrrha ana 3j. fiat pul. & super vulnus duppalma aut emplastrū nigru ponatur.* Cæterum de excrecentiis cū vlcetatione q̃ in capite sūt, vt de talpa & hydrocephalo, ac harū curatione, diximus lib. 3. obs. & curat. chirurgicū nostrarū de tumorib. præter naturam. obs. 5. 6. 7. & præcipue in Scholiis eandem observationē. De aliis quoque vlcibus. capitis, vt de achoribus, tineis, saphat, frusis, & ptyctacia dixim⁹ lib. 2. obs. & curat. medi. in alibi obs. 11. & 12. & in Scholiis eandem observationē. Iā quoque, de vlcibus. q̃ in facie eueniunt, vt est Noli me tægere, de eo quoque affectu lib. 2. obs. chirurg. nostrarū diximus, obs. 9. quibus si libet, adiciat, c. q̃ Guido de lib. 2. c. 2. de noli me tægere scripserit. Neq̃ hic opus est eae cenere, q̃ ipse eodem loco citato de vlcibus. & cancri, p̃fisi rupti, & elevatione vna oculorū, tū de rupta a cornea, & exitu vnae, ac fistula lacrymalis scripserit, testificare; cum de his omniib. lib. 13. obs. & curationum medicinaliū egerimus, quando de oculorum affectibus scriberemus. Iā quoque de vlcibus nasi tū nariū egim⁹ lib. 14. obs. & curat. medicinalium nostrarū obs. 13. de ozenis & naribus vlcetatis, & obs. 14. de polype. quib⁹ et si placeat, ea q̃ Guido de lib. 2. scripserit cap. 14. citato, adiungere poteris. De vlcibus. oris & aphthis, q̃ in febribus sepe contingunt, in libris febriu diximus passim in multis locis, deinde & lib. 15. obs. & curationū medicinalium obs. 3. de aphthis & oris vlcibus. & de labiorū fissurā, gingivarū, vlcibus in propriis locis tractauimus. Sed & de quibus quoque supputatis & vlcetatis, lib. 14. obs. & curationum medicinaliū obs. 3. & obs. 4. de parotide. At vlcera q̃ in collo & dorso sūt, non habent ab aliis diuersitatē, nisi in iudiciis, quia sūt periculosa pp venas & arterias & nervos & vias seris & cibi: & q̃ sūt in dorso manū periculum denuntiant pp nuchā. Et vlcera omoplasæ & brachiorum, nullam habent diuersitatem ab vlcibus aliarum partium, nisi in prognostico & modoligandi, de quib. satis fuit dictū, lib. 1. præcedente de curandis vlcibus ipsarū, Vlcera præterea q̃ sūt in pectore, si non pe-

netrant, curantur vti alia: q̃ aut penetant, in genere fistularum reponuntur, & curatio, vt præcedente Scholio dixim⁹, non hēt locū, sed palliatio, semper præsupposito optimo vitæ instituto: vt de vlcibus. pectoris dictū fuit. Interim obseruandum an materia intus eoactura vel ad interiora decubat, anhelitusq̃ impediatur, & an non possit per locum affectum probe expurgari, foramen ampliandū est imposita turunda cūculata, vel ex gentianæ radice, optimæ ligata, ne introcadat, & postea expurgandum ac detergendum melicrato, vt docet Gal. 6. Therap. aut vino mellito, aut lotionē aliqua descripta in curatione vlcum pectoris: ad quē locum recurrendū, & desup imponendum in mundificationū mox melle coctū aut ea q̃ trahunt materiam à fundo & ab vlcis concantibus. vt de vlcibus. eauer nos diētū est hac tñ cautione adhibita. q̃ medicina acuta ibidē descripta, vel est & est flor arū, iniiciendē non sūt. Si autem non possit cōmode expurgari collumies, aperiat⁹ intra quartam & quintam colatam, vt eo loco latius explicauimus: & cutetur illud vlcus vng. apostolorum aut alio mundificationū cōuenienti. Vlcus antiquum superius, consumpto callo fistule cum cantherio, permittat⁹ consolidari. Poriones superius quoque descripte in hoc casu valde cōmendantur. Iute: quas vnā præcatemseligit Henricus, qua vidit plurimos sanitate consecutos esse. Constat aut radicib. cardui fulgonis triuic, & cum melle maffi; ex hibetur; mane & sero vespere, ad quātiteram nucis cōmūg. Hinc Auetroes 5. colligit, Cardo fullonū, inquit, salidus est in secundo, & ficus in tertio mundi: sed omni putredinem per vinū, solū cum vino, & remanet axillariū & totius corporis ferorū, & generaliter resistit à tota specie omni putredini, & medicina cibalis & saporsā idē dicunt de Cinnam, qua in cibis delicatis vimur, q̃ forte & ipsi Arabes solā intellexerant, non autem vulgarē nostrum cardum fullonem. Cæterum vlcera ventris q̃ non penetant, et curantur vt alia: q̃ vero penetrant, similiter ad fistulas reducuntur, quorum et parum valet curatio, sed sufficit sola palliatio (vt dicunt) cum bono tegimine, & cōuenienti potione, & mundificatione cū emplastro mundificationū & consolidatio. Vlcera aut ancharum & partium eius (vt scribit Guido tract. 4. de lib. 2. de vlcibus membrorum organicorum ca. vii. modo sūt in membris continētib⁹, in continētib⁹, vt in procedentibus in procedentibus, vt in virga, vteri collo, ano. At in continētib⁹ curantur vt vlcera ventris. Quæ vero sūt in membris continētib⁹, vt in testibus vesica, & aliis potius ad medicos quæ ad chirurgos spectant. Quæ aut sūt in procedentib⁹, vt in virga, vel vteri collo, sūt exseruationes, infestationes, callositates, vlcera vteralis, purida, scordētia, cancrosa. In anorbagadia, vlcera, fistula. In vterisque, hamorrhoides, carnis excrecentia, ficus & condilomata, omnibus in propriis locis diximus, vt non opus sit ea repetere. Quibus si addere velis ea quæ Guido capite iam citato scripserit, doctrinā hanc clariorem habebis. Nunc ad illa vlcera quæ in aliis partibus externis sūt, properemus, ad q̃ curanda maxime chirurgus acceditur.

Vlcera
vbi
sūt.Vlcera
an
charum
aut
partium
eius.

Vlcera
fieri
in
Vlcera
oculorum,
Vlcera
narum.
Ocena.
Polypus.
Vlcera
oris.
Vlcera
an
rum.
Vlcera
collis.
Vlcera
am
plata
et
brachiorū.
Vlcera
pa
deris.

OBSERVATIO. XVIII.

De vlcere tibiariu.

Quidam qui vlcera in tibiis habebat hoc cera to de plumbo, quo vti solebat M. Angelus de Patma, tandem curatus est, & antimonij, ceruſa lota ana & B. plumbi vſti, litharg. teretib. ana 3. j. olei roſ. comp. & y. cera alba. & j. B. liquif. a cera in oleo addatur teretib. bina, deinde pul. & fiat vnguentum. Aliud vnguentum exiccantium in vlcere tibiariu: 3. oſi ſepia & y. lapidis calaminarij & iij. reſtarum oſtea cathemij auri ana 3. j. bol. arm. 3. B. axungia porci recentu ſine ſale 3. B. cera y. olei communij veteri lib. B. ponatur oleum cum axungia ad ignem, & liqueſcant, deinde quali inſignitibus imponantur pulueres, & fiat vng. Sed & hoc egr. egi probatū eſt ad vlcera tibiariu oſtracola: 2. cera, reſina ana 3. j. ſepi caſtrati & y. picis naualei ana & iij. maſticu, thuris, myrrha ana 3. j. litharg. 3. j. B. ceruſa 3. B. coquitur ſimul eleum, reſina, ſipum & cera, vſque ad bonā glutinoſitatem, & poſtea addantur reliqua, de tertio autem die in tertium vlcus debet lauari vino calido monrano. Hęc tela quæ ad Galenum reſertur, etiam competit vlcere tibiariu: 2. olei roſ. & x. ij. ceruſa. & iij. litharg. & iij. B. thuris maſticu ana 3. B. ſang. drac. & B. myrrha, ſarcocolla ana 3. j. coquiſiſt parum vſq; ad rubedinem, & extrahatur ab igne, & imponatur tela antiqua ex lino. Ad idem de minijs: 2. olei roſ. lib. j. niny & iij. litharg. auri & B. plumbi vſti & y. cera & iij. pulueriſanda pulueriſentur, & cinro excipiantur tenuiſſimo. litharg. primo cum oleo coquatut vt inſpilleſcit; poſtea ponantur reliqua & ſiar in forma emplatri, & iſto incarnantur vlcera tibiariu poſt diebus mundificationem. Sed & hoc vng. optimū exiccans exiſtit, quod loco diſponitū yem qui vſurpate poteſt cum non habeatur: 3. ceruſa & y. litharg. & j. olei roſ. lib. j. cera & y. fiat vng. in mortario plumbeo. Poſtea addidit D. Laurentius Bruninc. & tunc præpar. in aqua ſalatri, ſilicet plumbi vſti ana. & j. & iterum ducebat in mortario plumbeo, & hebat vng. Aliud exiccans pro vlcere tibiariu antiquis: 2. boli arm. ceruſa, litharg. auri ana & j. axungia porci ſine ſale quart. j. miſceantur & temperentur ſimul per ix. dies in aceto fortiſſimo, poſtea extrahatur ad aceto, & cum oleo roſ. fiat vng. Ad idē (exiccans: lapidu calaminarij lib. j. ſepi ſepia lib. B. oſi oſtea, cathemij an quart. j. bol. arm. quart. B. olei antiqui lib. j. axungia porci veteri & y. cera. quart. j. fundantur & coſentur. deinde in fine adde pulueres. Aliud empl. ſtrum: 2. cera lib. j. ſepi aruſina & iij. olei oliuæ ana & v. diſſoluatur omnia ſimul ſuper ignem. poſtea a. moueatur ab igne, & 2. lapidis calaminarij lib. j. B. minutiſſime pul. ad ice & in fine & y. teretib. bina lota cum aqua roſ. & fiat empl. ſtrum. alijs vtuntur emplastro Gracia Dei dicto. Hoc vnguentum vebatur chirurgus quidam Antvverpianus magni nominis ad vlcera antiqua tibiariu (2. cera alba, ter. ſinth. reſina ana & j. thuris, maſticu ana 3. j. ſtoracis calamus a 3. j. gummi elemi. 3. v. ariſtolech. rotund. 3. j. ſucci millefolij & betonica ana & B. olei roſ. olei teretib. ana & B. fiat vng. promolunatur cera, reſina, teretib.

thina, & olea ſimul diſſoluantur: dnde imponantur fucci: & cum inſignitibus inſerpt, pulueres addantur. Hoc vng. vſat eſt M. Guilhelmus Drayere chirurgus doctor in ſiſtulis thoracem penetrantibus & non penetrantibus, applicido exteriori & dando agro vinum album deſideriſſimi capiterij, ſalvia agriſſi: & quam plures curalle dicitur eo modo. Vng. vero ad vlcera tibiariu, quo vtebat olim M. Guilhel. Buſcoduſenſis Illuſtriſſimi Ducis Burgundiæ chirurgus: 2. Lapidis calaminarij & iij. litharg. auri & j. ceruſa. & B. olei roſ. & iij. ſepi renum mutoni & y. cera & j. vini albi Rhenenſi & iij. teretib. bina & j. fiat vng. bulliendo vſque ad conſumptionem vini lento igne: & in fine addatur teretib. bina, ſemper ducendo cum ſpatula, quocuiſque inſignitibus fuerit. Aliud vnguentum in vlcere tibiariu M. Gualteri de Turnour: 2. cera, reſina ſpeculeri, quæ magis alba & ceteris putior exiſtit, ſine ſcece, teretib. lib. a in aqua roſ. ant. plantag. ana & iij. albi roſ. & iij. meliſſi roſ. & B. liqueſcant: deinde adde medium vitelli auri pul. boli arm. 3. j. y. terra ſigill. 3. j. myrrha 3. j. ſang. drac. 3. j. ſ. ſimul incorporentur, agitando ad ſpiffitudinem.

S C H O L I A.

Vlcera (inquit Guido de Cauliac traſt. iiii. doſt. y. de vlc. membr. argan. cap. viii. de vlc. tibiariu cœxarum tibiariu & pidiu) quæ in coxis tibus & pedibus ſunt, neque alium modum ſpeciale curandi habent. 3. alia iam dicta, excepta ligatura, quæ in coxis incipit, in genu, in tibia ſuper caullam vel malleolum, & indiget maiori quiete, propter promptitudinem deſcendendi humores ad ipſa: quamquam & hoc notandum dignū q. cancrum, qui in eiſmodi particulas ſunt, vulgus tum etiam Rogerius ipſe in coxalupo vocat, in tibus vero gangræna: Lanfrancus vero eſt ſub mœno vocat, & facit diſſerentiam inter ipſas & malum mortuum, quæ eſt ſubſiſſa. al. plurimum hæc mala inter ſe diſſerunt, vt de tumoribus præter naturam diximus. Sed hoc ſciendum vlcera ipſa, quæ in tibus ſunt, maiori exiccatione indigere. Verum ſi hæc ipſa vlcera fuerint gangræna: aut cancroſa (vt ipſe Guido an) procul dubio alia curatio indigent. Nā ſi (inquit) talia vlcera cancroſa non curantur cum aqua aluminofa & plantag. vt ſupra dictum eſt, placeat mihi ſecundum Lanfrancum vt totaliter cauterizentur cum cautero cultellari: & cum ipſo eorū forma rotunda reducatut ad longam, vt citius conſolidetur: & poſtea migtur ignis cum auro & oleo roſ. & maturetur & mondificetur eſchara cū emplastro de apio, & defendatur locus cum vng. de bolo, vt frequenter dictum eſt. Si vero oſ fuerit contaminatum, & ſuperipſum aliqua eminentia apparuerit, præcipit Rogerius vt munis circumſerentis cum aliqua peſta, vel penno cerato, vel diachylone aut alio emplastro frigido adherente, caro ſuperpoſita impleatur aliquo caustico, & ſtetit à mane vſque in vespertum, vel è contra. & poſtquam caro fuerit denigrata & mortificata, ad extinguendum ignem deluſer oñum cum oleo roſ. factu, li vis apponatur, & procurrat cū butyro & caulis

Vlcera tibiariu, tibiariu & pidiu.

Doſt. y. m. i. cap. 13. de gangræna, tibiariu, tibiariu in cancrum, & malum mortuum.

*Fractura
aliphridin
facta.*

*Fractura
perit
fractura
facta.*

*Hippocrati
de fractura
cum tribus
Galenico
mentariis.*

*Dua potissi
ma fractu
rum dif
ferentia.*

*Composita
fractura dif
ferentia.*

Methodi.

Et sit in extrema tamen lunata euadit. Atque hæc etiam calamitudo, id est, harundinatio ab aliquibus nuncupatur. *Aliphridin* ad similitudinem farinæ vel pollinis dicta, est, cui os in multastenuis partes confringitur, quæ & ipsa *carpedon*, id est, nucarum, à quibusdam vocatur. *Apophoranthi*, quæ & *apocor* dicitur, id est, abfissio sen præcisio, est cum pars ossis per summam rupturam seu superficiem abruptionem detrahitur, ita ut pars ea quæ detrahita est, & recessit, supereminere, ut fere sit cum squamula ab osse resoluatur. Cæterum hæc fracturarum differentia curiose nimis (ut *Galenus* inquit) atque ambitiose à medicis Hippocrati in notis, his propriis nominibus interpretatae sunt. Nō cōtēnti fuerunt oratione, os quævis seu multifariam sit fractum, explicasse. Ab eiusmodi autem appellationibus omnino abstinuit Hippocrati. sed quoad fieri licuit, vilitatissimis & vulgo satis cognitis vtrius nominibus, oratione ininterpretari non est gratus. nō has modo fracturarum differentias, verum etiam quæ in capitis ossibus inveniunt. Cæterum quæ fracturam tractationem de fracturis diligenter vult pascere, & harum omnium citationem, videat Hippocrati librum *de fracturis*, cum tribus Galeni commentariis, nuper etiam per Vidium Florentinum editum, & figuris illustratum. Quæ omnia diligens lector perlegere poterit, ut hæc nostra, quæ nunc de fractura scribimus ad vnguem intelligere possit Breuius, duæ potissimum sunt fracturarum differentie simpliciter Galeno à quibuscumque indicationibus sumuntur, nempe quæ *per transversum*, & quæ *longitudinē* facta est. Cornelius Celsus tertiam addidit, quæ *scilicet obliqua* sit. Omne (inquit) os, modo rectū, ut legum in longitudine finditur, modo obliquum, ut transversum, interdum obliquum. Cæterum de his fracturis nonnunquam carnis quoque vulnus accedit, sed potissimum cum ossa multifariam fracta sunt, sepe enim dolor ingens, & interdum inflammatio. Contingit etiam aliquando ut aliud os super aliud efferratur, ex osse male ferruminato ac commisso, veluti *topaceum* aliquis nodus relinquatur. Horum autem affectuum & symptomatum cum ossium cōiuncturæ solutione cōplexus, cōpositas fracturas differentias, iuniores medici vocauerunt, cum tamen propriæ differentie non sint. Quandoquidem quod scortum & per se consistere potest (ut alibi ex *Galenus* diximus) nunquam alterius erit differentia. Vulnus autem, dolor, inflammatio, & id genus alia scortum & per se consistere possunt. Proinde veræ fracturarum differentie, & à propria ipsarum natura desumptæ nec reuera sunt, nec recte dici possunt. Quod si à loco quoque, seu parte in qua est fractura, differentias censeas, veluti si *nares, auris, maxilla, osse, clavicula, palmaria, spina dorsi, humeri, brachia, femora, crura, digiti, fractus* ut patitur, fuerint, prædicto & ipsæ fracturarum differentie Alibucasi: nō vtiq; à propria ipsarum natura, sicuti hec quæ præcedentes, deumpe, sed à locis in quibus consistunt. Verum enimvero, quoniam ab iis omnibus supra cōmemotans agendorum sumuntur indicationes, donec eas cum recentioribus medicis & chirurgis differentias appellari. Nūc ad cau-

sas, signa & indicia & in vniuersum fracturæ veniamus. Causæ fracturarum internæ nullæ sunt, externæ vero ea omnia, ut breuiter dicam, quæ contundere, aut diuidere ossa possunt. Quæ contundunt, ea dura grauique, & in mole nō exigua sint oportet, vehemēti impetu defertæ ac irruente. Ossa diuidunt, quæ vulnerando incidunt: item casus ab alto, si certum si ossa sicciora sint, nec admodum crassa, fractura quoque ossibus interdum accidit ex circumtortione in laetantibus: ut si tribia sine cruce Diocles, cruce aduersaria Socratis cum eo laetantis per transfuendum suppositum sit, ita ut vtraque eius capita, & iuxta pedem, & iuxta genu deorsum vehemēter deprimantur, os procul dubio ipsius Diocles, si certum si infirmum sit natura, hoc laetationis genere medium disrumpatur, seu si manus frangeret. Id quod in lignis quoque quæ à nobis ipsis circumtortentur, videre licet. Si enim lignum aliquod neque magnum neque valdum sed paruum & imbecillum semur impositum tuum, ex vitroque capite deorsum vehemēter manibus vtgeas statim id in media parte frangi aspicias. Sed & illis quibus rota currus super femur, crura aut brachium agitur, os quoque subinde frangere solent ita fractura in femore euenit puerperæ illius quæ extra portam qua ad Mosam itur: fuit tamen hæc probe curata, erat autem fractura sine vulnere. Signa vero ossis fracti, & præsertim per transfuendum atque in artubus, hæc fere sunt. Tactū ossis partes diuincitque separare ac varie repetitur: membri figura inæqualis percipitur: dum membrum dimouetur, & manu vane tractatur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex collisione auditur. Pars afflicta, contracta dolet: corpus membro fracto haudquaquam inniri potest: tantæ quæ si angustia aut cōtunduntur, præcesserit. In aliis vero quod per longitudinem fractum est, substatitæ eius crassities non naturalis tactu percipitur: cætera signa non adiunt, præterquam quod dolor & inæqualitas, indicio sensus, etiam deprehenduntur. *Progreffus*: Ossa minus periculosa media franguntur in humeris, brachiis, femoribus, cruribus, & digitis. Quæ autem propior fractura capiti vel superiori, vel inferiori ipsius ossis est, eo prior iudicatur. Nam & maiores dolores adfert, & difficilior curatur. Ea item quæ in artuum vicinia est, curatu difficilis est, vero potissimum nō mine quod commodè ligari non possit. Atque hæc ut plurimum mortem relinquunt difficilē. Maxime tolerabilis est, simplex transuersa: peior vbi fragmenta plura sunt, atque vbi aliquæ, pessima autem eadem acuta. Nam & carnes vulnerant, interdum neruum quoque & musculum. Fractura quæ cū dolore & inflammatione aut carnis contusione incidit, mala. Quippe quæ infaurari nō possit, donec ea prius curantem receperint. Si ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit, in malo erit eger est, maxime quæ si id musculi femoris aut humeri senserunt. Nā & inflammationes multo grauioræ, & (vtriusque Celsus) promptiores cancores habent. Adde quod in eiusmodi fractura neque ferulus neque canalibus (inter qua vulnus sangetur)

Causæ

signa

indicia

*Pro canore
hic gangra
na & fistula
etiam in al
laxo, sicuti
Ch. alio qui
hæc iam lo
quitur.*

Office of the
Public Defender
San Francisco, CA

OBSERVATIO II.

De quodam qui fracturam cruris periebat.

*Fraffura
non pari di
erato mame
ro compluti
namur.*

ana & g. anisi & mellis. q. fiat instar pulvis, p. defen-
sivo. 3. serinae scharum & iij. balenstiarum, nucis cupressi
ss. res. rub. an. & j. stachad. arab. abys. bis an. & j. sem. myr-
til. 3. v. terra sigillata & iij. sentalorum rub. 3. iij. pulve-
rizanda puluerizentur, & cum vini sypis & aq. plā-
tag. q. fiat emplastrū in fine addatur sang. draconis,
nucis ana & j. bullit in cyamarum rub. foliorum salica,
agrimoniae, res. rub. an. m. j. sem. plantag. myrtill. ana & j.
abys. bis m. B. p. fide, balenst. capul. gland. nucis cupressi,
acacia, sumach. ana & j. bulliant omnia in aqua ex-
tensionis ferri ad lib. j. B. coletur & in colatura ad-
datur alemeis rocha & j. B. iterum bulliant vnica e-
bullitione, postea dissoluentur in colatura lapidu
salaminarij, serina ana & g. acetos. f. & iij. musc. 3. sum-
mitatum anethi, flor. chamomel. mellis ana & j. folior.
agrimoniae, abys. bis, myrtill. stachad. arab. ana. m. j. cor-
tic. granat. nuc. cupressi ana & j. B. sem. myrtill. versand.
prop. an. 3. iij. sem. lini seringer. anap. q. fiat omnium horū
pulvis, & cū vini rubi & lictus anap. aq. & serina sa-
barū ad pondus emulsi fiat cataplasma. addatur in ō-
ne & B. sental. rub. & omnia linoli miscantur.

SCHOLIA.

VT autem ad generalem curadē fracturæ me-
thodum veniam: quoniam fracti ossis soluta
partium continet: est, vt que (inquit Gal.) finis
quoten detis, qui fracturas curabit, salē primus
vinitio est. Quod uis primus in curatione propo-
sit finis per adēcturam partium simplicitatem perfici
non possit, testat alter; qui est, vt alterius cuiusdā
interuentu dissuēctis ossis partes glutinētur. Qui
finis ipse comparabilis adductur in snabile esse
vitium dixit. Quod igitur coalescere (saltem per
se & nullius alterius op.) nequeat tam durū os, quā
id quod in iuuenibus & adolescentibus & viris,
multoque magis in senibus cernitur: id pfectio (in-
quit Gal.) vel cuius patere potest. Quocūq; etiam
concretesse & coalescere debent, omnino mol-
lia humidaq; sunt naturaliter, oportet. Quae igitur
dura si cūque sunt, eorū diuise partes coire simul
nequeant, sed glutinum aliquod vinculiū, quo
cōmissa maneant, requirant. Itaque potest certe
illud os tantum vnitione per se, & nullius alterius
interuentu recipere, quod abunde molle est,
cuiusmodi cōspiciuntur in pueris: in adultis vero &
ficcioribus corporibus, separatae fracti ossis particu-
lae, nō p se vnquā, sed substantia duntaxat quā piā
interueniente, ceuglutino quodā, serrum an vol-
garisq; scū possunt. Interuenit autē ea substantia,
quoēq; omnis particula sibi familiare trahit ali-
mentū: os autē ea affluat ceterū magis, quā aliud
quoduis nō sibi corpus membrū alimentū ad se
allicit, exurgat. Quod autē ex hoc ipso proptio
ac maxime idoneo ossi alimentum redundet, & in
labris fracturę concreuit, suo ipsius interuētū os-
sis extremitas, dura licet & sicca, conglutinat, vt sa-
pe videntur euenire conspiciuntur. Vocatur autē corpus
id, q. sic fracturis inuoluitur, Graecis τριγερ. Latini
verō callos, qui (vt supra de valacris ossium diximus)
medio crurante in crassie detentur, duntic et-
iam ac mollitie tetet, oportet. Sed de hoc adhuc
in sequentibus. Age igitur dicamus, quo modo finem
hunc primū, quo tendit, id, quā fractura curat, as-

pe vnitionē, assequi valeamus, initium quidem fa-
cientes ab ea fracturę diff. rentia, quā p transuer-
sum os frangitur, & suo loco excidit. Quidē quidē
hoc fracturae genus saepius incidit. Itaq; quatuor
mehercle intentiones, in hac fracturę differentia,
quā per transuersum os frangit, curanda est opus,
quas & scopos appellare possumus. Prima intentio
est, vt fracti ossis partes recte cōmittant & in natu-
rale sitū coaptent. Secunda, vt tunc cōmouilla ossis
perfecti extrema cōiuncta atque immota mane-
ant. Tertia, vt poro (vt supra dicimus) callo interueni-
ente dissuēctis ossis partes agglutinent, coalescāt.
Quarta est symptomatica, h. e. accidentis, q. fractū
ram sequi cōsueuerūt, eorū cōtractio. Quod ad primā
intentionē attinet, cū in hac fracturę diff. rentia,
quā ex latit. & pparatib., id est, p. transuersum fieri
diximus, sic alē fracti ossis partes disti deat, vt ē di-
rectio non iaceant, clarum est primum id esse a-
gendum vt in directum agantur. Directam autem
hic vocamus, quoniam in figuram pristinam, natura
lemque situm reducantur. Sane (inquit Gal.) cum
situm habuerunt, si quis ea, quae sic disti dent, in-
tegrę partis exemplo vsus, in contrariū adducat:
qua nimirum certissima iudicatio transpositionis
eorum est. Fieri. in. q. vt, utrum protransum, tum re-
trotransum, tum in hac parte mēbi, tum in illā facta
translatio sit. Quae cūq; igitur retrotransum magis
sunt acta, ea primum impelli conuenienter nec min-
us alie. & quoq; fracti ossis partē modice ad contrariū
tum reduci. Contra, quę protransum sunt emota, hec
turis ipsi quidē retrotransum, reliquam partē in sen-
sim duci protransum. Eodē ēt modū & eorum q. ad
dextram sunt, detorā medicatio est, si ad sinist., &
ducantur contra; eorum q. ad sinistram, si mu-
teatur ad dextram, semper scilicet altera parte modice
in contrarium acta. Guido ad Cauliacō (praefatus
quibusdam praecipis cōmuniū. q. hic suo loco referemus,
quomodo primā hanc intentionē in assequi possit) verbis
non adeo multis perstringit. Itaq; iuber inprimis
membrum perfractum (si esset, si scilicet q. lapsum ē-
tingit, exciderat aliud, super aliud esset, q. fractū
ad caput suū retrahit) suū decenter intēdendum esse.
Deinde os depresso attollendum, & eleuatum
deprimendum; atque id, quatenus fieri licet, sine
dolore, donec ossis fracti hines recte concurrant,
& in naturale sitū coaptentur. Neq; n. vnquā fra-
cta eiusmodi ossa, & suis ēt sedib. mota, in suū lo-
cum veniant, nisi illa per vim aliquā intēdant. In-
tendere autē dīgunt, vt aliud quodq; membrū,
si adhuc cernitur est, ēt vnus homo potest, cū al-
terā partē dextra, alteram sinistra apprehendit. At
vero valentius membrum duobus eger, quin di-
uerter contendat. Si firmiores nerui ac tendines
sunt (vt in vris rursus, maximeq; coram sumis) &
cruris aueni) habentis quoque vel lineas fasciis, v-
trique capota articulum deligenda & per plu-
res in diuersa ducenda sunt. Cauendū autē semper
est, ne immoderate confectum membrum ex-
tendatur. Immoderate enim distensio, in diuisi-
fictum & sicce corporis. vehementes dolores, se-
betes, cōuulsiones & cefolus. n. nes interdū inducit.
Quin ēt p diuelli ac dissuipi musculorum ac

Ratio, quā
per trans-
uersum for-
ta sunt.

Ratio, quā
per fractu-
ram inuol-
uitur, & cō-
tractio.

H. ppar. lib.
de fracturis

Guidonis
praecipitis
de reduci-
tis fracturis

Callosi & c.

Pulvis finis
primus, quo
tendit uis, qui
fracturas
curat.

Quod si
fractura
non sit
simpliciter
fracta, sed
quodammodo
fracta.

Pari, id est,
callosi, quod
est, quod
necesse est.

Callosi modi
veritas.

Stupi, quod
est, quod
necesse est.

nervorum fibras aliquando contingit. Proinde tumma in hac re prudentia opus est. Igitur ergo in sedili collocato, vel resupinato potius, *vt Soranus placuit*, ministris duobus iubebimus. huic, *fracturā illi, infra digitos circūponā, atq; sic tensionē pficiant.* Quod si valentior opus sit intensio, non solū manib. sed et, *vt diximus*, habenis aut funibus intēdere aggrediemur. Ergo duos funes aequales fracturā mēbro, vbi grātia, brachio aut cruri circūdamus vñ *fracturā*, alterū infra atq; vñ mīnistro ad egrotantis caput cōsistente. Alteri in xtra pedes, capita funiū trahentibus, iubemus in diuersa mēbrum pfractum distendere. Vbi paulo longius, q̄ naturaliter esse dēt, mēbro vim fecit distēlō, remittenda est: ac tū de mō ossa manib. in suā sedē cōpellenda sunt. Offisa autē repositi certū indicium est dolor sublaris. Ceterum ossib. fracturā id sic pbe coaptatis. iuxta Hippocraticā consuetudinē mēbr. u deligandum erit, *vt statim subiungemus.* Modus alius reducendi ossa fracta in suū locum & naturalē sitū p distensionē *libro de fracturis tractatur ab Hippocrate*, qui & 3 Paulo refertur lib. vi. *super opus de re medica*; quo et, si velis, & patara habes q̄ describitur instrumenta, vñ potius. Sed hic modus quē, nota posuimus, longe facillior, & magis ad manū est. Atq; eo et Soranus medicus utebatur, est; hocie apud nos in frequentiore vsu. Oportet (*vt sumum autem dicamus*) aut manib. ipsis, vtiq; si cōst. actū mēbrū exiguū est, aut vinculis impositis, si minus est, & validiore tractu opus sit, aut eiusmodi instrumenta q̄ nobis Hippo. describit, *anastasis* ossū facere. h. e. nec totum extrahere, & directō cōmittantur, exactaq; corū coniunctio fiat, sic vt pfectā vñonē imitentur. Postea vero q̄ abundē retracta fuerit, & nullus amplius suplit motus, ne se in adducendo contingatū in directū opponere, vinculis relaxare, & musculis ipsis diductorum in idē cōmissionem pmittere opus est. Interim vero, *vt Galen. ad mēt.* re ipsam quoque q̄ operi preces manib. subfultare expedit, ac si cubi aliquid paulū subfultet, ac pmaneat, cor rigere atq; formare. Ceterum in adducendis siue suptrae pteffim, cōtrario motu partib. ne aliquē frangantur ossium extantē, non leue periculum est. Nō. n. velut (*inquit Galen.*) in setra descēdis visitur, laevis est semper vñonē; partis finis. Quod si illae (*opit. inquit, extantia*) forte fortuna frangantur, nō poterunt adamussim secum coaptari fracti ossis fines: itaq; q̄ forsan fragmenta inter partes vñendas intercederint, tum et q̄ quidpiā ossium forte extra ceciderit, & communis non penent: vnde spacia inter applicata mō ossa maneat mania: in q̄ sanies collecta, atq; tēporis tractu putrescens, eorum patiter mēbrum secum corrumpit. Atq; haec tractandae fracturæ ratio omnibus optemodum cōfractis artib. cōuenit, vbi plerum ossa fracta suo loco (*vt sapienter contingit*) exciderint, aliudq; sup aliud effertur. Neque enim femur manu franguntur ossa, suis sedib. moueri cōtingit. sed interdum fracta in suo loco, ac naturali situ remanent. Quod ante omnia (*vt nos ad mēt. Colus*) considerari debet: & sunt notæ ceteræ, quibus id disernim

deprehendere possis. Namq; si suis sedibus mota sunt, resima apparent, punctiōisq; sensum re praesentant: tactu (*vt supra annotauimus*) inaequalia sunt. Vbi vero loco suo non exciderant, neque punctiōis sensus vilis, neq; vlla q̄ tactu percipi possit inaequalitas adeſt. Ceterum si primis distēlō ipsa pfecta & suis sedibus mota reposita nō sunt, non leue inflammationis periculum subest. Sub qua & difficile & periculose vis neruis & tendinibus adhibetur. Atq; hæc de prima intentione dicta sufficiant. *Secundus scopus* in curandis fracturis nobis propositus est, vt ossib. id sit (*vt supra scripsimus*) pbe coaptatis, & ē directō ad motu, eorum positura seruet, & exacte cōiuncta maneat, sic vt pfectā vñonem imitentur. Porro nequāq; phubere poteris, quin diuisi eiusmodi ossa, q̄ sic effinxeris & adamussim secum coapta ueris, sua se de moueant, & rursum distēdant, si laborans quoquo pacto, vel vigilās, vel dormiens mēbrū fractum dimoueat. Ergo, vt secundum hoc scopū assequaris, pfectū mēbrum proflis immotum cōiunctat necesse est. Quod si ipsi quidem egrotati, vt quietudini mēbrū pspiciat, pmissis, vigilās fortallim (*quādammodi inquit Gal.*) pbe id curauerit, at dormiens omnino mēbrum mouebit. Vt quia non dormiens modo hominis sed enī ad deligendum, itemq; cum cubile reſter nitur surgentis, eorum q̄ tite formata & exacte cōiuncta sunt positura seruetur, tuta deligatur & cōplecti fracturā oportet, q̄; fracti ossis partes cōi coarctate ad amussim possit. Tuta autē nō erit deligatio, si vel nimis arcta, vel laxa nimis fuerit. Quandoq; dem p laxiore ossib. moueri licet; per arctiorem vero & vehementi addit gentem, & alimēti in locū affectū distributio prohibetur, & dolor (*q̄ humores in agrā partē affluxum euocat, & phlegmonas creat*) excitatur. Danda itaq; opera est, vt vtrumq; excelsum declinemus. Cōstructio igitur mediocris esto, tū nōstis sensus, tum ipsius egrotati iudicio. Aſciquidem equalis esset cōstructio mēbrū q̄que. vtiq; latissima fascia (*vt Galen. ait*) cōmodissima esset, vt pote q̄ totum equaliter cōtineret; ex omni parte fractum os cōplecteretur. Sed quoniam id nō est, q̄ deest nobis ex fasciarū latitudine circuituū numero pensabim, vt in artub' ipsis, q̄ omnib. maxime fracturæ p transuersam fasciæ, expositi sunt. In talib. namq; vtilior est angusta deligatura, q̄ valde lata & remissa. Quippe q̄ nec rugas, vt ea q̄ latius fascia sit, cōtrahat, & totius mēbrū cui circumdara est, cutem cōtingat. Eo igitur vsq; angete tibi latitudinem fasciæ licet, quoad nulla eius pars laxior efficiatur. Ceterū in eiusmodi deligatura, q̄ fracturis (*in medio pferuntur brachiū, vel tibi vel femur in extensile*) adhibetur, duabus fasciis lineis mollibus (*iuxta Hippocrat. dogma*) opus est. Has autem Hipp. ipse nomine peculiari *in rebus aut, id est, subligamina, seu malis subligamina* appellauit. Primē fasciē initium sup fracturā iniici debet, ac circa eā bis ter re cōuoluta, sicutum versum ferri, & quasi in cothleā serpere, atq; illic desinere. Id tñ ppetuo obseruandum est, vt multum partis sanæ fasciæ hæc cōplectatur. Ita. n. fiet,

Nota esse fracturam sedis mota.

Secundus scopus.

Membrum fractū pfecte repositū & firmatū.

Id est, mota.

Ossis fractum deligantur, q̄ q̄que.

Deligatura media.

Comment. lib. Hipp. de fract. et de Therap.

Angusta deligatura est, subligamina.

Ratio deligaturæ arctæ pfecte, ut sit, ut sit, ut sit.

Gal. Colla.

Argo quomodo collocaudus, in fractis artibus.

Distensio quando remittenda.

Anastasis.

Lib. 6. Therap.

Ossium etiam.

vt & firmitus reposita ne confirmata ossa contineantur, & magis ab istis loco in circumuicinas partes humores elidantur, magisque, ne hi a superiore parte eo defluant, impediuntur. Altera etiam super fracturam debet incipere, priori aduersa, deorsumque (vbi primus complexus super fracturam facit) tendere; atque inde iterum reducta in superiore parte ultra priorem fasciam delinere. Quocirca dimidio longior prior esse debet. Terminus autem longitudinis eorum fasciarum non vnius ac certus statui potest, sicuti neceriam latitudinis: sed pro magnitudine fracturæ, & persi acti membrorum facilitate, vt que dimensio varianda est. Hunc Hippocrates libro 4^{to} in 7^o de fractura, id est, de medicina, seu Medici officina, & libro De fractura, trium, aut quatuor, aut quinque, aut sex cubitorum longitudinem, digitorum vero latitudinem constituit. Digiti autem in cubiti interligendi sunt eius ipsius qui deligatur, nempe vel tri aduili vel prae tili. Hæc autem duplicis deligaturæ ratio, ex ipsius natura defumitur. Quando quidem duo hæc prima linea fracturam quidem munuere ac stabiliunt, nec phlegmonem (qua in hac re impurus est accenda) citri sinunt. Si quidem & ab integris ad laborantem partem tunc sanguinem confluxum a ceteris, & quod iam collectum est in ea expungunt. Prior quidem deligaturæ quod in lesa parte continetur, ad superpositam expellat, que elidit quod vero exiit (superposita inquit parali) in locum petfactum confluat, repellit. Altera vero primis quidem complexibus, quos (vt supra diximus) super ipsius fracturæ locum facit, itemque dispersione deorsum tendente, quædam ad inferiora extrudit, quædam ne quid exiit in loci fracturæ cõstnat, prohibet. Reliquis vero deinceps complexibus (quibus videlicet ab infimo partibus fracturam: seu sunt reuocare deligaturam diximus, vt eodem tali loco com priore fasciam, secunda desinat), tunc ad superiora, vt & priore ligatura, respicimus, tum confluxum ab eis prohibemus. Ceterum priusquam fasciis huiusmodi fractura deligetur, vnus aut alter panniculus lineus candido oui liquore & rosæ oleo lubructus, nudo membro non absque fractione ac cenditibus chirurgis superaccommodatur; ea quidem magnitudine, vt etiam aliquid partis sanæ comprehendat. Sunt autem eiusmodi fasciæ duæ prælongæ, nempe quatuor aut quinque, aut sex, vt diximus cubitorum, & circiter tres quatuordecim digitos latæ, aqua aut posca potius madefactæ, & postea expressæ, præfictim hi fractura inflammatione vacet. Si vero dolor vehemens, aut inflammatio adeit, laniat uenibus mollibusque aut suppis leuibus oleo vel oxyteto imbutis membrum contegendum est, & nõ ardere deligandum. Satis enim fuerit tunc, si deligatur adhibeatur, quæ & membrum vtrumque fulcrat, & admodum medicamenta, ad hæc symptomata, peliganda idonea cõtinuat. Verum enim uero cū hæc duæ primæ deligantur, ad ambos hos vias quos supra retulimus, (nempe ad fracturam munimentum stabilimentumque, & vt phlegmonem excutiat prohibeat) non satis adhuc faciunt, plectum solæ, earum quidem tunc & fracturæ

stabilimentum Hippoc. remediū exegitauerit, vt scilicet, plagule, huc ipsa in splenis formata appellata vna cū extenioribus fasciis, quas & Hippoc. & Galienus gamma vocat, desuper adhiberent. Et hæc quidē tertius deligaturæ rationē quibodlibet obtineat. Splenis enim eiusmodi siue plagule, dantur ipsarum fasciarum, quæ peculian nomine vnde Hippoc. & Galienus na Hippoc. appellantur, si manentia sunt, vt commemorat in libro De fractura Ga. in annotat.

Ne autem phlegmonem suscitetur, mediocriter quoque exiit, quæ inflammationi iniuriis accedit, vt censuit. Quæ & membra est Ceratū humidi huiusmodi, quod cuncti scilicet ex ceteris in rosæ oleo aut oliuoli colligata, aut e. 1^o loco rosæ oleo Huiusmodi est, & Cornelius Celsus lib. 8, sic inquit: Super his (duas inquit primas deligaturas) ponendum latere latus ceratum est, quod in continet. Quod si ossis fractura, carius quoque vulnus acceit, neque ceratum neque rosaceum tutum admodum: quid quidem hæc vltima in fructum tunc putre efficerent: sed in vicem eorum poluisti phlegmoni nigro styptico imbutum, itaque emittenti erunt. Reliqua aurea ematio quæ eiusmodi fracturam eum vulnere inciditibus continet, alias dicta est, & in sequenti describetur. Porro præter hæc modum ad nos commemoratas deligationes, quasdam adhuc alias quatuor commemorat A. Cornelius Celsus, cap. 10 libri paulo ante citati. Si autem ea dispensat, vt semper insequens priori aduersa sit, & tertia fasciæ (qua duas primas, splenis comprehendit) itum in inferiori parte, tres reliquæ in superiore finiantur. Quia scilicet est (inquit) leuius circuite quod adtingere. Si quidem id quod adstrictum est, alienatur, & cancro opotuitum est. Quo loco (si scilicet) ceterum pro splacelo, quæ vulgus medicorum splacelum vocat, vltima vt & quibusdā aliis locis, vt auctor diximus. Ceterum cum multis complexibus atque inuolutionibus duæ illæ superiores commemorat Hippoc. ratas deligaturæ & fracturam contineant, alias enim parum tunc aperiunt numerosis fasciis opus esse minime censo. Itaque enim in membro ipso petfacto præter solitum copio, & pruritus & dolorum (que duo symptomata a fractis membris diligenti studio accenda sunt) excitare, atque etiam eius quod inhiat fracturæ est inspiratione phibere possunt. Præterea & ipsius Khalis cõstitutum est (vt Galienus quoque annotauit) quod circa sed septimū fructus deligaturæ incipit: in principio tamen & sine laxiore, ob timorem apostematis seu inflammationis in principio, & vt com modior fiat nutritio in fine. Porro vbi deceteris membrum constrictum deligaueris, de appositæ repositionis ipsius figura, maxima tibi sollicitudo habenda est. Si quidē sub alia forma aut figura membrum petfactum deligere, in alia vero mutare ac reponere, non dolorem in odore (vt inquit Galienus) excitare potest, verū et ossa inturquere. Necesse enim est, vbi figura mutatur, alios musculorum redi, ac velut contractos rotundari, alios vero solui ac remitti. Vbi autē tenduntur, tunc premere os ad deligaturam est necesse, tunc ex compressione ipsa dolo. etiam vbi tenduntur, quo loco deligaturæ est laxa, ibi fracturæ

Splenis car
adhibetur
Hippoc.

Tertia deli
gaturæ
splenis
ad custodi
splenis
splenis
splenis

Ceratū
humidi
et adhibe
dicitur.

Si ossis
fractura
carius
quoque
vulnus ac
ceit.

Alia quatuor
ex Cornelio
Celsi deliga
tura.

Corneliū
Celsi quoque
refertur.

Ex his

De appositæ
repositionis
membrum
figura, ex
Ga.
lieno.

Hæc secun
da fasciæ
bis aut ter,
quæ priore
ligatura,
super ipsam
tunc mem
bra posita
sunt ceram
dantur Hip
pocrati.

Prioris deli
gaturæ vis
et fracturam
sua fructu
da deligatur
ra efficit.

Fracturam
legitur &
latitudinis

Super primam
membra adhibe
in fractura.

ram talicimetro defutur. Ceterū aptissima fuerit in
ellium fracturū repositione, sicut ietiam & in
retractione (q̄ *Αντιδωξ* dixim⁹ & Græcis appellati)
& coactione, & deligatione, patris figura, quæ, vt
verbo vno dicatur) maxime à dolore abest, &
in qua æger perflere immotus diu possit. Hęc e-
nim & rectissima est, & maxime naturalis mem-
bro, ac fete confusa. Rectissimam aut̄ hic patris
figuram cum Galeno vocamus, q̄ venas, arterias,
& musculos q̄ rectissime hēt. Itaq; angulosa figu-
ra, q̄ *ἰσχυρὸν* Græce dicitur brachio quidem ma-
xime naturalis est, cruri vero, q̄ paulo minus por-
teat ea est. Hęc namq; & rectissima est, & à dolore
maxime aliena. Ceterū tameti angulatus figura;
quæ Græcis *ἰσχυρὸν* dicitur, proprie ea dicatur, q̄
ακύνειον angulum, quæ rectissimum appellamus,
efficit, per Engonon tamen, id est, angulalem fi-
guram Hippocrates eam intelligit q̄ recto angulo
constituitur, non profus tamen recto, vt quodā
in loco Galenus est interpretatus, sed prope ad rectum
accedere, vt vt paulum in obusum tendat: cuius-
modi in manu, q̄ vulgo brachium appellat⁹,
ea figura est, non quæ profus quidem inter exten-
sionem & inflexionem media est, sed quæ ad ex-
tensionem procedere incipit. Quæperianq; po-
sita eos, qui à dolore afficiuntur, si diligenter inspe-
xeris, munus tenere deprehendes. Puto vt dolor
victetur, curat ad quietem membri reponitur,
non modo naturalis habitus, cuius instrumento
est vtilis, verum eam consuetudo quoque con-
cedere nonnulli videtur. Hinc quoque, vt Guido ait
& inuenta sunt cubacula & suspensoria, & instru-
menta mechanica ad firmus & tutius continen-
da ipsa ossa fracta, vel eorum membra. Ergo vt ap-
te membrum per fractum, & decenter ligatum
reponatur: situs figuræ illi inuenienda est, quæ
& naturalis sit & confusa, & à dolore maxime a-
bens. Sed iam hę indicationes inter se consenti-
unt, & conspirant maxime. N. m. quæquæ; figu-
ra magis quam alia est à dolore libera, ea & maxi-
me naturalis membro, & fete confusa esse solet.
Atque è contra quæ naturalis confusa est, ea do-
lore est alienissima. Atque hæc quidem figura, in
qua custodie membrum per fractum conueniat,
inuenienda ratio est. Vt autem in hac naturali, &
quæ dolorem minimum habeat, figura immotum
profus (quoad expedit) membrum perfluat,
rectiores chirurgi secundum deligaturam, pro-
prians ferulas (quas Guido tū alii *ἡστέλλες* lon-
geterum circumponunt, ipsas quidem cōstrin-
gentes, prout sensus & tumor ex inflammatione
(si quæ ad illi) pulsulat. Veretes autem, vt Hippo-
crates, Celsus & Galenus, à die tamen *spiritum* vel
etiā *moio* & *νυκτι* uno ferulas accommodabant.
Verum non ab eis factum putamus (vt etia Guido
facit) si statim ab initio post deligaturā, ferulas
iniciantur, modo illæ nimis premetendo dolorem
non excitent, aut phlegmonē (q̄ maxime accen-
denda erat) accendant, vel præteritum (si adit) exacer-
bent. Quæ igitur à principio adhibentur ferulæ,
non citè remouent, vt adstringunt, sed vtrāque par-
tem figuræ continent, & ossa in suis sedē reposita vt

quaque falciant. Primis namq; dineb", cum phlegmones dequirant & cõsiliu mvinerent, tutum non erat pfractum mēbrum ita ferulis premere. Cū vero nullas iam amplius inflāmatiōis metus sit, antea q̃ prius fuit dīcūssa, mēbrum aliquantro gracilius, q̃ p naturalī habitū apparuerit, (quod intra septimum diem fieri solet contingere) cum licebit ferulas circumponere, & eas (vt frāctura stabiliat) valide faris adstringere. Ferula. nō enim vbiq; idem est, qui & plagarum morbo pleniorum, ne in pte frāctum os cõtineant, & deligatione stabiliant & firment. Sunt autem ferulæ. *vt libro de medicis officina, recte præcepit Hippocrat.* Iques, id est, leuigatæ & planæ: æquabiles, id est, neque latus neque in lūporeum aut in inferiorem partem distortæ in summis partibus, id est, extremis: nitibus: relinæ, id est, leuiter detasæ, ac retasæ: minores hinc inde q̃ deligatio est: & ea paræ crassiores, id est, latiores & valentiores, qua fractura erupit. Iques autem ferulæ, id est, non peras (laxi enim asperum opponitur) diuidendas esse censet Hippoc. ne sua asperitate & inæqualitate (q̃ enim asperum est, continuo etiā est inæquale) ita his partib. negotium faciant. Vtroq; enim modo cõprimunt. Ceterum quoniā fieri potest, vt ferulæ laues sint, non tamen æquabiles (inæquabiles enim nō p. inas necessariō est asperum, vt patet de via. q̃ ascensus habet & descensus nō asperos) ideo non sũd laues, sed etiā æquabiles, id est, nō distortas, assũmēdas esse ferulas monet. Quæ nō distortæ sũt, similiter vt a. c. etia, addunt: ac illud in dispu. efficiunt, q̃ deligatiōem simul distorquent, qua distorta, pars ē fracta distorqueatur, necesse est. Simus prætea in extremis partib. eas deligi voluit, id est, vt *Galen. interpretatur*, leuiter detasas ac retasas in extremitate parte, ne sua acutie articulum lædās, & equaliter vbiq; parti sũt sũt, p. q̃ quale sũt crassitudine, compunctum: q̃ certe licet nullo modo debet. Vult enim Hippoc. vt in media parte, hoc est, t̃ locū fracturæ, vt *Plinius, id est, ferulæ*, deligatiōem magis asstringat. Hinc ea parte, hoc est, t̃ fracturam ipsam crassiores esse iubet: qua *scilicet locum ut passim nem* (vt supra ostendimus) *propterea ipse nem* indicat. Vult item M. notes eas esse longitudo, id est, aliquot breuiores quam siripia deligatio, ne cute m. vltra deligatiōem attingat: q̃ sepe numero ex eo quod humores t̃ fasciis expulsi suscipit, paulo altius turgescit atque extat. Sed & breuioribus ferulis vtendum præcepit senior ille Hippocrates, ne pars emineat, id est, gibba, & carne nudata, attingatur, vt circa cubitum & malleolos, vbi ossis exuberatiōes sũt. Modus autem ac ratio adhibendi ferulas, talis est: fto: Splenia triplica aut quadruplica oleo delibuta super fasciis similiter atque equaliter, si mēbrum in crassitie fuerit æquale, circumdato: si vero inæquale, partibus magis concavis, per pleniora replitis, mēbrum vndiq; æquale ferulis accommodatis, efficitur. Deinde ferulas lana aut stuppa mediocriter involutas in orbē, non minore vñius digiti spatio inter se distantes fracturæ circumdato, & eaq; leniter ac moderate conftringit.

Repositio-
nis signum
ad duo divi-
di deffe.
Radissima
figura qua
ducatur Ga-
lileo.

Ratio inveni-
enda signi-
ficat quod
autem
monstrum
perfectum
conveniat.
Ex Galeno
et Hippocr.

Fernis quæ
dein fractis
vix circum-
ponenda.
Quæ vita-
re oporteat:
in fernis
adhiberi sit.
Fernis ab
imbris non
ultra ad-
strigenda.
quæ vi effa-
ciantur.

Fernandez
v. *USA*

Frühling und
die ersten
Blüten.

Копия.

എസ്.എസ്.എസ്.

Simc

CP- β -L

Minerals

*Modus ac-
cipiendi ob-
iecti formae.*

et Sed & in hac feniliarum accommodatione sum-
mopere cauto, quatenus fieri potest, ne articu-
lus aliquis (vt paulo ante notauimus) & præcipue
interior flexus pars, ab eis attingatur. Vlcera si qui-
dem in ipsis nonnunquam & ueruorum inflam-
mationes pariuunt: nisi illis, hoc est, iuxta articulos
ipsos deligatione aliquanto (vt diximus) benio-
res, tenuiores, laxiores & magis flexibiles ferulas
esse oportet, quædammodum valentiores qua fractura
excidit atq; inclinat. Ceterū si nullaprunigo, nulla
inflammatio, nulla suspecta viceratio, nulliusue do-
lor adest, & ossa recte cōmissa fuerint, fracturaq;
recte procedat, sic manere ferulas, & ligamēta, ad
decimum vsque diem, vel quintum & decimum,
aut etiam vigesimum, uile est. Si uero in membro
perfectio præter solitum cooperto, vel dolor ex-
citerur, vel pruritui creetur, uel eius, quod iam in-
fixū fractura est perspiratio prohibeatur, propter
quam non modum notus pruritus quibuidam æ-
cidit, sed etiam erosio à saniet acrimonia nonnun-
quam, exulceratio concitatur; non abs te feceris, si
tertio quoq; die, vt uisus Hippocrates, deligationem
solueris, & membrum ipsum aqua intemperata
persuderis ac foueris. Hac enim persusione & a-
crem atque erodentem saniet discuties, & dolo-
rē mitigabis, & pruriginē pulchre medeberis. Porro
cū nec ferulis, nec deligatione, nec figura futu-
ue mēbri appposito, diuisæ ossis partes (tamen si ex-
adit atque admaius cōiūctæ fuerint) citra glu-
tinum aliquod vinculumue (vti supra diximus) coi-
re ac conconferere possint, maxima calli, quem P-
ruri Græci dicunt, gignendi sollicitudo habenda ē.
Ad hunc igitur gignendum cogi conconferereque
aliquid propriū olium alimentū crassū terre nique
oportet, quod in labris fracturæ coalescit. Ipsum
igitur nec eluendum, nec fortas euocandum est,
sed siccandum. Crassū autem hoc retretiaq; sub-
stītia, ex genuino, maximoq; idoneo ossis alimen-
to redundans (q̄ propterea est calli materia) diē cir-
citer dnodecimum, aut decimum quintum ab os-
sis fractura fere gigni, atque accrescere incipit, vt
regerentiores chirurgi testatū reliquerunt. Cete-
rum huius generatio (quæ in aliis citius, in aliis ue-
ro tardius aduenit) in fere notis deprehenditur.
Dolor qui prius aderat, sedatur: nullus amplius
inflammationis, aut tumoris aliculus præter natu-
ram metus adest in membro perfectio bonus ac
natus color efflorescit. Vniuersa autē dictū Ra-
tio poro gignendo accommodationata talis esto: Dum
callus gignitur, victum paulo pleniotem, q̄ ab in-
itio fracturæ, laborantis infituro. Cibi dandi
sunt, qui boni succi sint, & multum nuttiant, nisi
vulnus adit. Sed & q̄ offeruntur alimenta, talia
sunt, ex quibus provenire succus solet non solū
bonus, sed et tenax, ex qualis callum maxime
expedit. Quippe (inquit Gal. lib. 6. methed.) cum ex
serosa humiditate, ac tenui gigni profusus nequeat
ex crassa uero, sed q̄ fragilis sit, ac pinguedinis ex-
pers, gigni quidem poterit non segnetur: ceterum
tempore succedens friabilior, atque ita fractioni
obnoxius redditur. Itaque poro gignendo conue-
niunt Anicēnē, otiza, panis simlaginens, frumē-

tum triticum tamdiu in aqua coctum, donec si-
at (inquit) sicut pulsio Galli vulgo appellantur. Pro-
menter. Aliis nonnulli existimant. Ad hæc, pedes,
ventres & capita animalium, sed præsertim hædi
& uernicis: hæc enim & multum alunt, & crassi
ac tenacis succi sunt. Circa initium fracturæ vsq;
dum callus gignitur (quod fere circiter decimum
diem contingit) agrū tenuissime cibato. Cibi nā-
que subiles (vt consus Hippocrates lib. de fracturis) &
non valide materiz, tunc satis sunt. Venam inter-
dum, cum scilicet exposita sit, secato, & per ventrē
superius eua expellito. Carne & uino vsq; ad decē
die, ex eiusdē Hippocratis præscripto, abstinet. Post
hoc tempus uinum crassum & stypticū audacter
concedito: tamen si Cellus uinum per omne cura-
tionis tempus alienum esse dixerit. Magnitudo
calli minor quam par est, nec maior iusto sit, sed
mediocritatem ad vnguem tetuet: qui enim iusto
minor est, hic ossa parum nota reddit; qui maior
est, dolore in musculis inuehit: ergo calli magni-
tudo, vt breuiter dicam, ea sit, quæ & ossibus in
tuo vinculo sit, nec musculos tamen comprimati
attendendum uero est diligenter, quemadmodum
nos Galenus admonet, vt vel promoueatur, si minor
iusto proueniat, vel inhibeatur, si immodice cres-
cat. Quibus uero hæc efficies, paulo post dicem'.
Atque hæc de poti generatione, qui tertius erat
scopus in curandis fracturis nobis propositus, di-
ctū sufficiat. Superest igitur de quarto & ultimo
scopo agamus, qui dispositionum præter naturā
quæ fracturæ interueniunt, emendationem atq;
ablationem concernit. Ea autem fere sunt, dolor,
inflammatio, pruritus, vulnus, immoderata siccitas aut
humiditas, callo gignendo obfistens, gangrena, durities, po-
ri magnitudo, aut deficiens aut excedens. Itaque si dolor,
aut inflammatio adit, deligationem, si iam facta
est, statim solui, & lanam, oleum, & aceti, con-
gruamque id genus alia auxilia partidolenti, atque
inflammatæ ad moueto. Sed neque priusquā hæc
sedata fuerint, vel deligatur adhibeat, uel feru-
las circumponit, nisi dumtaxat eatenus vt mē-
brum fulciant, & vt inpositum medicamentum
contineant, hoc est, laxè admodum. Cellus con-
sulit liberale fumentum aque calidæ, dum inflama-
tio adest: cum uero ea non adest, modicum: se-
data inflammatione, & dolore sublato, deligatio-
nes & ferulæ (vt supra diximus) adhibendæ sunt.
Si noxius Pruritus accidit, & erosio à saniet acrimo-
nia (vt aliquando cōtingit) cutis exulceratio con-
citur, aque temperatæ tantum superinfundere
oportet, quantum ad euocandam eiusmodi saniet
em est satis. Hoc quidem Hippocrates & Galeni
consilium fuit. Recetiores autem Chirurgi aquā
salinā infundi præcipiunt, aut vng. albo, vel eo, q̄
vulgo Populūm appellantur, membrum illini: &
vt supra dictum est, deligari. Cum ossis fracturæ, cat-
nis quoque vulnus accessit, siue statim ab initio id
factum sit, siue postea à chirurgo inductum, vt of-
sium fragmenta, & ea præsertim quæ pungunt, e-
ximantur: si quidem sanguis profundatur, tunc
prius aptis remediis sistito. Si inflammatio o-
riatur, prædiis in eam efficacibus vitior. Si carnes
conuulsa

Quando sol-
uenda deli-
gatio.

Tertius sca-
pus.

Potius genera-
tio.

Callus qui
bus notis
generatio
deprehendit-
ur.
Videtur poro
gignendo
aptus.

Potius magis
rudo.

Quartus
scopus.

Symptoma
in qua fra-
ctura com-
muniatur.
Dolor, inflama-
tio.

Fumentum
aque calidæ.

Pruritus.

Vulnus.

Contra.

Gangrena.

gangrena sint, partem affectam, vt gangrenæ periculum evitetur, scarificato. Quod si *Gangrena* quoque ipsa aut alia quæpiam seipens potredo, eam occupavit, convenienter occurrir: horum autem omnium curationem in superioribus libris tradidimus. At si nihil horum adfuerit, neque magna ossis pars oundata sit, hamulis furisique vti, his medicamentis, quæ cruentis imponuntur, meditemur, prius tamen fragmentis ossium euulsis. Cæterum deligatura fracturæ eiusmodi cum vulnere fasciæ, hoc modo adhibenda est: Orbiculares fasciæ partibus vulneris utrobique, hæc est, ab utraque vlcis parte, iuncti debent; obliquis vero supra ipsum vulnus in longitudinem collocandæ sunt, sic vt per decussim ad x litteræ similitudinem iuxta hiarum oclusio ex omnibus fiat.

Deligatura fracturæ est vulnere ac comoda.

Hippocras.

Hippocrates tamen à prima statim circumvolutione, fasciæ latiore totum vlcus comprehendit, ita vt nulla eius pars nuda relinquatur. Itaq; si sordidum adhuc vulnus est, expurgantia medicamenta, quando opus erit, impones. Si purum, catenam producentia linteolis illita, aliamq; vñ comprobaram materiam adhibebis. Hippocrates tamen statim ab initio picuram ceratam, q. ceram in rosaceo, aut oleo colliquam, & picis sicæ aliquantulum afflavit, supra vulnus in linteolis adhibet. At *Galeno auctor*, vtilius à tertio die, cum ea quæ in vlcere sunt, concoquat, adhibetur. Cornelius Celsus omnibus his vuloeribus primo imponendum iabes linamentu vno madens, cui rosæ paulum admodum adiectum sit. Si sextium tempus est, inquit Hippocras, si plenæ vino frequenter sunt irriganda: si hyemalæ, lanæ multæ succidæ ex vino & oleo superimponenda sunt. Lanarum namq; superpositione & olei commotione refrigerationis vehementia, quæ in huiusmodi affectibus, convulsiois periculum interdum inuehit, obtunditur. Vino autem madefactæ plagulæ, ob vioum reprimendi vim habent. Cæterum vbi purgata vlcera fuerint, & in eis iam caro concreuit, ferule non incommode iniiciuntur: aliqui vero etiam ab initio ipsas accommodant, vlcere locum vitantes & prout necessitas, ac vñs tulerit, ipsas modo cōstringunt, modo remittunt. Sed hæc curandi ratio ab Hippocrate & Cor. Celso non probatur. Hi enim pluribus tantummodo & latoribus fasciis (ferulas vero, ne comprimendo lædant, similiter & canales, omnino reicientes) deligaturam in eiusmodi fractura, quæ cum vulnere iocidit, fieri iubent, laxius scilicet quam si ea plaga non esset: adeo vt afflicta quidem, non compressa tamen, fasciæ ipse esse videantur. Ita namq; (inquit Celsus) numero fasciarum efficietur, vt laxæ quoq; æque contineant. Ac facius quidem est, sepius circumire, vt ante Celsum scripserat Hippocrates, quam adstringi. Sed & in eas fascias multiplices ingerendū subinde, eodem Celsus auctor, est calidum oleum, & vinum: magisq; vbi sic cum vulnere fractura à principio iocidit, id est, exquisitiore victu vrendum, vulnus calida aqua fovendum, frigusq; omninatione vitandum, & transvendum ad mediamenta, quæ puri mouendo sunt: ac maior vul-

Ferula quæda in vultu vbi vulnus adhibetur.

neris quam ossis cura habenda. Vt autem de hac re, quod ad ferularum appositionem attinet, sic apud auctores etiam eximios cōtrouersa, id quod res est semel statuamus, hoc tibi tāquam axioma id est, pronuntiarum, esto. Cum fractura cum vlcere interdum in longitudinem membri contingit, tunc ex vltæque vlcis parte ferulas etiam ab ipso curationis principio circumdate licitè esto. Cum vero transuersum vlcus euasit, idq; maxime si maius sit ferulas statim ne imponito. At si squamula aliqua ex osse resoluatur (id quidem colligi ex eo potest, quod & copiosius, tanquam humus pressus, & caro circa vlcus laxa & molis affecta intumescent) deligatura laxiore ad curationem vrendum est, ne scilicet posint iudat, sed effluere facile queat: frequentiusque, vt consulis Hippocrates, teligandum, quoad osse cesserit, feruleq; non apponeudæ. Vbi vero vel hamulo, vel quopiam alio eiusmodi instrumētō squamam euuleris, deligatura iterū validiore membrum adstringes. Porro per totum id, quod vlcus curatur, tempus medicamentum aliquod ex his quæ inflammationem arcet, linamentum continens vulnere incumbet, ac simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis curationibus resoluunt, cū aliæ supradictæ remaneant. Inter hæc autem, si quod parvulum fragmentum ossis eminet, si id retinendum est, id suam se dem dandum: si autem ante amissionem eius longius est præcidendum: si breuius, limandū erit, & vtrumque (inquit Celsus lib. 8.) scalpro radendum. Tum ipsam recidendum est: ac si id manus facere non potest, vulsella (quæ fabris vtuntur) iniicienda est, recte se habere capiti ab ea parte, quæ sima est, vt ea parte quæ gibba est emineat os in suam sedem compellat. Si id manus est, & membranis fragmenta cinguntur, sine oportet ea sub medicamentis resoluere, idque os, vbi iam oundatum est, abscindere: quod maturius scilicet faciendum est, potestque ea ratione & os coire, & vulnus sanescere: illud suo tempore, hoc prout se habet. Noouinquam etiam (inquit) in magno vulnere euenit, vt fragmenta quædam velut emoriantur, neque cum carnis coeant. Quod hic quoque ex modo fluxoris humoris colligitur: quo magis necessarium est, sepius vlcus resoluere, æque nutrire. Sequitur vero, vt iam or per se post aliquot dies excidat. Cæterum cum tanta misera antea conditio vulnere sit, tamen id interdum maius, diutiusque facies. Sæpe enim in integra cutis osse abruptum, protinusque prurigo & dolor oriuntur. Quæ solueri (si accit) maturius oportet, & fouere aqua per æstatem frigida, per hyemem gelida. Deinde ceratum myrteum impoere. Interdum fractura quibusdam velut aculeis carnem vexat, quo à prurigo & puoctionibus cognito, aperite id melius, eosq; aculeos præcidere necessesse habes. Reliqua vero curatio in vtroque hoc casu eadem est, quæ est vbi etiam protinus vulnus intulit *Haëtus Cor. Celsus de fractura cum vulnere facta*. Nunc cætera prosequamur. Dum valenter omnis siccatum ossa, callus ægte provenit: Expedi igitur istis ita refectis ossibus tertio vel quarto die modice aquam calidam infundere: hanc

si osse pars aliqua resoluatur.

si fragmentum ex osse eminet.

si fragmentum in vultu emoriantur.

vulnus intus resoluendum.

si fractura quædam velut aculeis carnem vexat.

si cicatrix ad infundendum ossis.

metam

metam finiendæ perfusionis habentes, cum nimium carnes in rubrum tumorem attolluntur. Atque in his quidem, priusquam subsidere incipiant, desistendum est. Contra, ubi digeri quid volumus, non prius est desistendum, quâ quod ex perfusione intumuit, subsidat. Si vero humiditas abundantius calli generationem impediât, ibi hanc siccare conuenienti deligatura & perfusione aquæ, quæ vel minima omnino sit, vel plurima, copabimur. Quippe minima (ut sexto methodi Galenus ait) cum prius desistat, quam aliquid cohsuat, & qui ad maorem, id est, in superficie, sunt humores, per halitum digerit, & qui in alto sunt, modice liquat. Expedit autem ita solui liquarique ea, quæ per deligaturam sunt expellenda. Plurima vero perfusio plus digerit, quam attrahit: atque ita commodat superfluo humiditati. Attendeo dum vero (ut supra monuimus) diligenter est, ut vel augeatur callus, si minor iusto est, vel iohibetur, si nimius superuenit. Vtramque autem vitium corrigitur perfusionis quantitate, & qualitate ciborum etiam, ac medicamentorum, quæ extrinsecus apponuntur, facultate. Ac de perfusionibus quidem & victus ratione iam supra est dictum. Ex medicamentis vero quæcumque emplasticam substantiam habent (cuiusmodi est Emplastum, quod ex pice conficitur) ac modice calfaciunt, ea (Galenus auctor) callos tum promouent, tum vero augent. Alimentum enim copiosius in locum perfractum attrahunt, sicuti & moderate aquæ temperatæ, perfusiones, & idooz frictions. Quæ veto digerendi vim obtinent medicamenta, ea callos maiores iam factos eidem Galeno imminuunt. Cum reces adhuc callus est, medicamentis valde adstringentibus Paulus vteodum esse cœsusit, compressamque admodum deligationem adhibendam, laminâ plumbeâ interdum etiam imposita: hæc enim calli excrecentiam mite reprimat ac immittit. Huic rei efficaciter quoque subuenit Celsus, multa lenisque ex oleo & sale & nitro membri perfrictio, plurimisque ex aqua calida fassa fons. Post hæc malagma, quod digerat, imponendum, adstrictiuique alligandum esse admonuit: imo vero & vomitu vteodum. Siquidem per hæc (ut existimamus) cum carne callus quoque extenuatur. Confect etiam eidem aliquid sinapios, cum fisco, in alterum par membrum imponere, donec id (inquit) paulum erodat, eoque euocet materiam. Atque ubi is rumor extenuatus, & qui nimius supercreuerat callus, ad mediocritatem redactus fuerit, missus ad ordinem vix reuertendum erit. At si solidus lapideusque callus, qui sic immodice iocreuit, iam euasit, aperta ibi cute detadendus est, parique eius eminens scalpris, & terebris etiam, si res exigit, ad motus excidenda est. Cæterum solent aliquando io fracturis diuersa inter se ossa conseruere, & membra distorta calli firmari, difficultate functionis obeundarum hæc exigua subsequente. Quod ubi contingit, & breuius membrum & indecorum sit, & si capita a

cetiora sunt, assidue punctiones sentiantur. Ergo ubi perfusa ossa sic conseruauerunt, & perperam ferruminata sunt, si tener saltem adhuc callus est, & ooo ultra sex menses, ut quidam dicunt, radices egerit, frangere rursus, & digerere ea oportet. Id hoc modo fit: Calida aqua multa, vel decocto aliquo mediente diebus aliquot membrum id sentit, & ex cerato liquido perfricatur: aut emplastro ex albena, vel cataplasmate ex fructibus purgibus aridis aliisque medicamentis callum soluentibus (Porolytica Græci dicunt) coniegitur. Deinde facta sufficienti emollitione, modo quem supra posuimus, à ministris duobus qui in diuersa contendunt interueniunt: & inter hos medicum chirurgum pertractans ossa, ut callo adhuc tenere existente, manibus eâ diuersè compellat quæ id quod eminet in suum sedem: & si parum valuit ab ea parte, in qua os fractum est, inuolutam laminam obducit, atque ita deligenda (inquit Celsus) affuerit iterum vetula sedi cogit. Nostræ ætatis chirurgi male ferruminatum os, in fractura non admodum antiqua, diebus plus minus quindecim, ut supra diximus, primum emollit: deinde id in diuersa extendi iubent, & genu vehementer impulsu, iterum frangunt: (quod iam vetustiores medici non probauerunt) & ita ita ossis fines ad amissum iter se coarctant, ac ut supra exposuimus curant. Si ab ossis perperam ferruminato, vetustis iam occupauerit, ac callus vehementer obduruerit, satius est manum illi (ut consuleret Albucasis) non admoliri. Quicunque id rursus frangere aggressi sunt, post vehementes cruciatus in extrema discriminalaborantes adduxerunt. adeo ut valde pauci eorum, qui hoc tormenti genus perpessi sunt, mortem euaserint. Atqui melius est eum, qui sic affectus est claudicare, aut membri alicuius deformitate affectum ad annos adhuc multos superstitem remanere, quam post talem, totumque cruciatum, miserrime sic inter manus crudelis chirurgi occumbere. Adde quod fœpenumero alio loco, quam ubi fractura iam coierat, os ipsius quod lapidosus callus firmauerat, frangitur. ut præter quotidianam experimentum, nobis auctor extitit Auicenna. Quæ id si laborant, & qui illi assident amici importunis precibus, atque ad idoo rogata re compellant, ut ossis eiusmodi male ferruminati, & cuius callus iam obduruit ac ioueretur: curatione suscipias, in angusto spem esse, corâ illis præfator: deinde opus aggredior. Summam igitur cutem, & carnem calli superiacentis cultro rasorio aut scalpello dextre ac prudenter secato: magna cura habita, ne os cui musculi ledantur: deinde ossum, quæ ootere coaluerant, agglutinationem seu continuationem (quæ aiant) excelsioris scalpris dissoluit: mox vero eorum sic diductorum fines secû ad amissum coaptato, ita ut pristinam vniocem, quoad licebit, imitentur. Demum cetera fiat, quæ supra scripsimus. Ceterum si ex attritu, membri corruptelæ metus impendat, protinus scissificandum erit: reliquæ faciendæ, quæ supra in gangrænæ & spâcelli curatione diximus: si vero

membrum & membrum distorsum callus firmauerit.

Off. qui iterum frangenda.

Quid agat chi. v. r. e. m. i. n. i. s. s. e. f. e. r. r. u. m. a. t. a.

Si ab ossis male agglutinatione, non sufficiens coarctatione, Aluicasis.

Aluicasis.

Ex ratione.

Si membrum ex attritu corruptum.

Humiditas calli generationem impediens.

Quæ ratio ne porus vel augeri vel minui possit.

Si nimis callus superuenit. Laminâ plumbeâ.

Si callus in lapideum durit & ingens nimis magnitudo anna, p. r. e. t.

Si ossa diuersa vterque coarctetur.

trophacea aliqua durities post ossis perfecti agglutinationem remaneret, ea modo, qui in antidotario apud Guidonem de Casibus & s. lib. Targantii exprimitur, discutienda & tollenda erit. Fracturae quaedam supra definitum naturae tempus, sine callo interdum permanent: quod ob varias causas solet accidere, nempe vel ob assiduas solutiones, vel ob immodicas superfusiones, quas & fomentationes vocant, vel ob intemperatum motum, vel ex fasciarum multitudine: nonnumquam etiam quia totum corpus non sufficienter alitur: quo in casu membrum quoque ipsum (vt Paulus annotat lib. 6.) gracilius euadit. Oportet igitur tum aliis, tum praecipue maciei corporis occurrere: quod commode fiet, si vel calidis admotis materiam ad membrum perficiendum euocemus, vel alimentum copiosius subministremus, & balnea reliquisque animi voluptates adhibeamus. Porro eorum quae iam callosificantur, indicio esse, cum aliatum illud praecipue potest, si fasciolae cruentae conspiciuntur, nullo etiam in parte oborto vulnere. Quod ideo fortis accidit, quoniam calli substantia, dum coit, in ossium caernofos meatus perumpens, sanguinis guttas aliquot inde extendit exprimitque. Ac de transuersis quidem fracturis haec dicta sufficiant. De Longis vero, quae non tam crebro contingunt, reliqua omnia ad eundem se habent modum. Ceterum comprimende haec magis (Galeni auctor lib. 6. method.) in ipso fracturae loco sunt; tum quod recessit, retrahendum introversus est. Ac de fractis quidem ossibus in vniuersum, si plura desideres, vide Paulum lib. 6. capit. 19. de differentiis curandem, & capit. 107. de fracturis quae cum vulnere incidunt, & capit. 108. si praeter modum fractura callus obducatur. Sed & capit. 109. si distortum membrum callus firmant: & 110. si fractura callus non firmetur: & apud Neotericos Guidonem, de refectione fracturarum vniuersalis capit. 1. Deinde & lib. 6. Guidonis capit. 1. de vniuersali curatione, in qua & emplastra & multa remedia ponuntur; atque etiam historia, quo modo in Curia Romana plurimos curauit, adducto exemplo de milite nobili, scutilla tibiae sinistrae fracta habente. Vide quoque chirurgiam magnam Brunii lib. 1. capit. 18. de vniuersali fracturae usum. Deinde 2. lib. Theodorus capit. 20. de fractura ossium sine vulnere carni & curatione ipsorum: & 21. de fractura cum vulnere carni & cura ipsius ferius vniuersali: etiam capit. 22. de differentiis fracturarum usum, deinde capit. 23. de membro per fractum male restituito, & capit. 24. de nodatione qua acicula post fracturam: & capit. 25. de membro extenuato post fracturam os, vel restitutum. capit. 26. de sicu membri restituito, & capit. 27. de frustis ossium & corticibus eorum remanentibus in vulnere. Sed quia omnia ferè in hisce Scholiis comprehendimus, quibus si locum etiam citata etiam adiungere velis, habebis de fractis quidem ossibus quae haecenus in vniuersum dici poterant, quae & nunc tempestiuum est nonnullas etiam particulares curationes addere: quibus addi etiam possent formulae quae-

dam & figuræ instrumentorum ad gignendum callum aptorum in fracturis, tum aliis, quorum pluribus in locis meminit Galenus.

OBSERVATIO III.

De inferiore maxilla confracta.

Cum mandibula seu maxilla inferior fracta erat, ea ipsa chirurgi prius manu restituta est: & fracta est in oscho cum oleo omphacino, vel melius, cum illud non aderat, myrteo: & pannus subcillis intinctus & appositus, & debite alligatus. Interim ne fieret inflammatio, phlebotomia ex cephalica adhibuimus, ac etiam purgationem. Postea ad maiorem separationem etiam apposimus emplastrum ex farina volatili, & puluere rubeo, cum albumine ouorum extenso in panno: quod desuper apponebatur & ligabatur, vt in primo apparatu diximus. Postea etiam pannis infusus in vino salito decoct. rosar. & abunthii & myrtill. appositus, tandem curatus fuit. Ceterum primo hoc medicamentum in principio fracturae & dislocationis & torsionis, iuxta Iohannem de Vigo lib. 6. capit. 2. de medicinae reseruantibus fracturam & dislocationem usum, apponi potest: *℞ albumina tria ouorum, ol. reser. omphacini ol. reser. completi ana 3. x. ol. myrtill. 3. ss. farina volatilis, farina bordeacea ana 3. vi. bol. arm. subtilissima triti, sang. drac. ana 3. iij. misce. fiat emplastrum.* est mirabile inprimis de his. Transacta autem nona aut decima die, nullo contradicente symptomate, vt est dolor, apostema, pruritus, tunc supra fracturam & dislocationem vtilissimum est hoc infra scriptum apponere: *℞ allumina quatuor ouorum, ol. myrr. ol. reser. ana 5. in terribus, clar. 5. i. S. myrrha, alba ana 3. iij. sang. drac. boli arm. ana 3. ss. farina volatilis & m. misce. & vtere, in fractura & dislocatione est singulare remedium.* Sed & hoc ceterum sicut ad torsiones etuorum & ligamentorum & iuncturarum: *℞ sigilli Saluennii & m. r. d. alibea 3. vi. s. iij. plan. 3. m. i. i. n. m. i. b. b. u. l. u. s. deinde post illud & cribratum ad ignem cum cera alba sufficiens fiat ceratum molle, addendo olei reser. myrr. ana 5. u. terribus, clara 5. i. ss. Agrippa, distillata ana 5. i. boli arm. 3. vi. sang. drac. 3. iij. thuris 3. i. sental. enuim 3. ii. Valer autem post septimum diem. Vide alia cerata apud eundem Vigonem in suo Antidotario.*

SCHOLIA.

Ad particulares fracturas deueniēdo, de etiam fractura & de naso, superius diximus, cum de vulneribus tractarem. At narium pars ima, quomodo sit canaliculosa (teste Paulo lib. 6. capit. pr. de naribus fractis & c.) frangi non solet, sed contundi, summa fieri, & perueniri: superior, quae ossa est, nonnumquam frangitur. In his autem deliquitum damnat: Hippocrates, vt quae magis & citius efficiat & distorqueat.

præter-

Si fractura sine callo sit per definitum tempus remanens.

Nota ossis perfecti callos firmos vniuersos.

Fractura longa quomodo curanda.

De naris
fractura
signis.

præterquam in his quæ appulsu quodam per me-
chas naris emineant: lu senim conuenientem
habenam cum medicamine imposito assumit, vt
compressæ nates naturalè figuram recipiant.
Fractis igitur naribus, in ima quidem parte, indi-
ce aut paruo digito de musso in extremitate dirigen-
tur: in interiore, etiam scalpelli mucrone id faci-
endum est, primo statim die, aut non multo post.
Cum vero decimo die naris ossa continentur,
extrinsecus indice magnoque digito hanc effor-
mate congruit. Vt autem figura quam fingis non
concidat, duo obstramina tortilia ex pannicu-
lo inuolura, naso impones, vnum singulis nasi
foraminibus, et si altera donec naris pars sit
peruersa, & eaque finire, donec os aut cartilago
contineatur. Nonnulli fistulas ex asserum pennæ
paniculos replentes, naribus insinuant, quo
figura custoditur, & respiratio non impediatur
quod non necessarium puto, quom spiritus per
ostrahatur. At si inflammationem nares senti-
ant, medicamentum aliquod quod tam arceat
indemus, exempli gratia ex succis inscrip-
tum, aut quod oxaleo constat, aut eiusmodi ali-
quod. Vel ex tinctura limula & iuris fuligine seu
gummi vna incodis cataplasma iniciemus, tum
propter inflammationes, tum vt nares contine-
antur. Quod si in alteram partem nares decli-
nantur, Hippocrates postquam comit de eas
figuraueris, ubi longam habebulam dig. tali lar-
titudine iubet circumdare, alterum ipsius extremit-
tino glutine, aut gummi alitum summe nari-
um parti agglutinari, ex latere quo inclinat.
Vbi illa exaruerint, habenam transire per aue-
rem oppositam versus occiput & frontem o-
porter. deinde ipsi sub altero habenæ princi-
pio assimabuntur, vt nares in latera retractæ ad
medium dirigantur figuram, quod recentiori-
bus non admodum placuit. Porro immixtum con-
fractis narium ossibus, diuidere ipsas, aut supe-
riorem ipsarum partem conuenit, æt fragmenta
ossiculorum, vbi illa auferemus, futuris didu-
ctas partes committentes, accommodantesque
ipsas remedium quod crueritis aptum est, & con-
glutinat. Sin autem extra nares vlcus fuerit: exci-
tatum, linamentis in longitudinem impositis cu-
rabimus. Sunt qui plumbeis canalibus, quas *Sole-
nas* Græci dicunt, vsque dum cicatrix fuerit ob-
ducta, vsi sunt, ne caro ex vlcerebus supercresecat.
De fractura ossis nasi plura vide, & etiam reme-
dia apud Iohannem de Vigo lib. 6. cap. 3. de fractu-
ra ossis nasi, & Theodoricum lib. 2. cap. 29. de fractu-
ra nasi, & Lanfrancum de lib. 3. tract. 11. cap. 2. de fra-
ctura ossium faciei, nasi, tum mandibularum. Cete-
rum inferiorem maxilla seu mandibula (eodem *Pa-
ro* teste lib. 6. cap. 92. d. inferiori maxilla confracta,
& ante can. 116) multas ob causas frangitur. Si i-
gitur extinctus solum offensio, non per trans-
uersum sicut inuolatus euata fuerit, promptum
est cognoscere. Opus autem est altera manu, si
quidem dextra maxilla fuerit, dextra, si altera,
sinistra. Indee igitur & medio digito in affecti
os demissis, interiorem fracturæ extantiam, pro-

be foras compellere conuenit: altera manu for-
tis eam excipiente. Rescudinem vero maxil-
læ ex eiusdem dentium æqualitate desephen-
demus. Quod si fractura per transuersum fa-
cta fuerit, primum tensione, deinde retractione,
quam *Antistax* vocant, partis in contrarium,
vltus ministro eam continente, vt dictum est,
dirigere aggredieris. Porro de naris parte con-
fracta diductis, inter se, vt *Hippocrates* præcepit,
auro deligare, nempe lino ab auro chrysolino
dicto, aut chrysonemate: quoniam vero humus
ficular non omnibus conceditur, lino valido
aut bysso, aut pilo equino, aut id genus ali. quo.
Verum si quidem eum vlcere fractura euenit,
specillo remandandum nam quandoque etiam re-
fractio ossis facta sit, atque flexura remansisse
facta, os vltum refectum aut pura remanserint,
sioneo instrumento auferentes, suturas oras vl-
terius committentes, & edicamento cruentis ap-
to vii, deligabimus: sin autem citra vlcus conti-
gent, ceratum simplex maxillæ impositum con-
uenienter deuincemus. Fasciæ enim edium per oc-
ciput dispoſabitur, habebunt vtrique per au-
res ad summam maxillam, inde rursus ad occi-
put, mox ad mentum, inde per genas ad sinu-
put, inde rursus sub mentum occiput citra vlcus conti-
gentur, & vbi fasciam deinde oportet. Super hæc
rursus vinculum a ludo fronti circumdatur, quod
Epilema Græci dicunt, post caput coniunge-
tur, omnes prædictæ fasciæ in eam adstrin-
gent. Alii vero reuertuntur in scutum, quemadmodum
aliu valculum profundius paris longitudinis im-
positum maxilla deligant, vt commemoratum
est: reliqui deliguntur, quam Græci dicunt *Phor-
bam*, vt vult. At si vtrique maxilla in summo
mento ouellatur, qua etiam parte euenit am-
bas manibus parum introitus distantibus ruf-
cis adaptato, & de nens adiutos, quomodo dixi-
mus, deligato: ac congrua vius ligatione, ten-
tioni ac foris alimento agrotantem nutiri iu-
beto. Nam mandere ipsi inimicum est. Si ali-
quid emolui a figura conuenientis paraueris ter-
tio die soluens, iterum illigato: quod tam diu fa-
cias, quam callus fracturam firmat: firmatur
autem maxilla intra tres potissimum septima-
nas, quoniam laxa & medulla plena est. Quod si
inflammatio aliqua superuenierit, vt aduersus
hanc quidem, tum fomenta, tum cataplasma-
ta negligere oportet. Quod in omnibus ex
quo obstruatum abs te experieris. In fractura
mandibulæ (inquit *Guido de Caulibus*) conueniunt
omnes, *Haly abbas*, *Albucasis* & *Avicenna*, quod
si fracta fuerit, cum digitis tuis, politis iunctis os
parientis reducatur ad ichema suum: quod cu-
gnesceat quando dentes partis sanæ coniun-
gantur cum dentibus alterius directè: & tunc
ligatis dentibus infirmis aliis sanis cum filo be-
ne cerato, aut de argento vel auro apponantur:
& desuper auxilia dicta in communem seimo-
ne: & desuper loco stupparum plagellæ de per-
no multiplicatæ: & post hæc illam, id est, scru-
lam ex solea eozii: & ligetur ligatura incipiente

Quanto
tempore
fractura
in maxilla
cuius.

Guido tra-
bat. 3. de lib.
1. de fractu
rationis fra-
cturæ
cap. 2. de
reductio-
ne
fracturæ
crani, ossis
nasi, mandibulæ,
ossis
capiti
faciei.

ponne collum, & veniente supra mandibulum, reuertendo sub naribus retro caput, reducendo ligetur in fronte. Et si sint necellariæ plures reuolutiones, sunt per eundem modum, donec ligatura bene fuerit firma. Cibaria eius sint forbilis, ne ipsum grauent in malitico. Tempus autem firmationis eius est fere 28. dierum, secundum Auicennam & Albucasin. His adde quæ Brunus lib. 1. capit. 12. de fractura osium mandibularum scripserit rubrica 1. & Theodoricus lib. 2. capit. 28. de fractura mandibule. Vide & Guilhelmum de Saliceto lib. 3. cap. 1. de fractura osium nasi cum vulnere & sine vulnere, & cap. 2. de fractura mandibule.

OBSERVATIO IIII.

De vertebra seu spondylii colli attritu & confractu sine vulnere, vel potius confuso.

Cum sacculus farina plenus ex mola valde altus corietur in molitoris in nucham cecidisset, valde doluit, ut spasmus merueretur. Huius sanguinem ex cephalica demissi, alio quoque soluta per glandem. Deinde accito chirurgus cõpõsita fractura, quæ sine vulnere erat, primis diebus emplastrum ex farina volatili, descriptum cap. 1. de vniuersali curatione osium fracturorum apud Iohannem de Vigo, apposuit: interim rota spina doli inuncta cum oleo lumbrieorum & rosaceo, ne fieret spasmus, postea bene habere cepit. In fine, ad restitutionem oxycroceum appositum est. Mihi autem non videtur hæc esse fractura, sed potius confusio.

SCHOLIA.

Lih. 6. c. 98.
de vertebra
sua spina
doli. &
sacro ossi.

Vertebatarum complexus interdum sane cõtusionem (vt inquit Paulus) raro vero & haud tam experitur, propter quæ confusio spinalis medullæ membranæ, vel ipsa etiam medulla, nerui in doloris consortium adducuntur, & mors præcepit subsequitur: magisque, si ceteris vertebra affectus infestatur: vnde præfatus periculum, si quidem fieri potest, audebis etiam sectione officulum quod premit eximere: tñ minus, ratione, qua inflammatio propulsatur, ipsas lenies. At si processus vertebatarum aliquis, vnde spina constat, fuerit fractus, digitis tenerrantibus prompte sublabetur, dum refectio mouetur, rursusque in locum transponitur. Conuenit autem id quod refectum est, auferre, eunte extrinsecus incisa: saturisque commissa, remedio cruentis idoneo vti. Cæterum osse sacro confecto, index iunxit manus digitus in anum demittendus est; dextra manu quod confractum est, quatenus licet in naturalem figuram reducere oportet. Si autem aliquid refectum sentiamus, hoc quoque diuiso, deligaturam & curationem commodam adhibemus. Quod autem ad Prognostica pertinet, de fractura & attritione spondylium, cum ægro iacenti supra spondyles egestio & vrina egrediuntur (vt illi diebus cernit sicro lignario, quæ alij summa demo-

Os sacrum
si fuerit
confractum.

Prognostica.

pra spondyles traxerit) tunc ista mortem futuram prælagiunt. Guido de Cauliaco idem affirmat. Dicit & Paulus, & idem Auicenna, ac Haly abbas confirmant, quod osium spondylium raro accidit fractura, sed plurimum attritu: licet contrarium dicat Albucasis. Verum Paulus & Haly abbas intellexerunt in rotunditatibus ipsorum; Albucasis vero in alijs partibus eorumdem. Quicquid sit, si notumtatum perueniat ad nucham & neruos procedentes ab ea, inserunt paralytin, vt dicit Albucasis, manuum, si superiorum; pedum, si inferiorum: & aliquando sequitur mors, vt dicit Avicenna. Ergo hæc prætidenda. Et si accidit egestionis inuoluntaria egestio, aut non potest mihi gere quando desiderat, tunc sciendum, quod est mortale, Albucasi quoque attestante. Non igitur laboremus in curatione eius. Si vero nihil quipiam tale appareat, curatio eius erit, ut sedemus dolorem: & ea conueniunt quæ ad inflammationes tum apoplemata inscripta sunt. Ideo procedemus cum oleo rosar. & vitellum ouorum assatu: & doloribus sedatis, apponemus emplastrum aliquod roborans & desiccans, & de ligatione optima & stricta iniecta, præcipimus infirmo quiescere & situm supra partem, in qua minus dolet. Si vero frangitur postremum ossis caudæ, iutromitte pollicem manus sinistra in anum, & aqua os fractum cum manu altera, secundum quod fuerit possibile: deinde adhibe emplastra & ferulas, & stringe cum ligamento. Reliqua vide apud Theodoricum lib. 2. 3. de fractura & attritione spondylium colli: & Lantianum doct. 1. tract. 4. de fractura spondylium & costarum, & Guilhelmum de Saliceto lib. 3. ca. 6. quæ etiam inter reliquos hanc rem optime pertractauit, propterea etiam adiectis quibusdam remediis.

De restau-
ratione fra-
cturarum
cap. 3. de
fractura
colli &
spondylium
doli.

OBSERVATIO V.

De fractura fureculæ pectoris.

RVsticus qui ex scala ceciderat, cum scenum reponeret, fureculam pectoris fregit. Ad hunc accitus, iussu, ut fieret phlebotomia, ne fieret inflammatio, & vt exhiberetur quoque lenitiuum medicamentum. At chirurgus cum restaurasset os fureculæ, cum fractura esset sine vulnere, imposuit puluillos rotundos in spuma albuminis infusus cum farina volatili, & cetera vt docet Theodoricus cap. 30. de fractura fureculæ pectoris lib. 2. cum pul. constrictiuis deinde in vitello oui & albuminis, vt etiam docet Guilhelmus de Saliceto lib. 3. cap. 3. de fractura fureculæ: deinde adhibita debira ligatura, tandem eo modo vt in iisdem locis citatis scribitur, curatus fuit, iis inquam decanter appõsit per chirurgum.

SCHOLIA.

Ivgulum, quod etiam clavicula dicitur, cum naturaliter figuratum est (inquit Paulus) interiore ipsius extremo, cum pectore committitur; exteriori, cum summi humeri compage,

scilicet

Lib. 8. c. 91.
de regula
confracta
fuit claud
cula.

seu articula mento adiunxit: eoque si humerum aut ipsum sustinens brachium, fracturam quancunque tandem parte expectatur, quia humerus suum spectat, plerumque infra iunctus extremus fertur, vnde cum brachio detractum. Praestiterit autem per transversum potius quam assulatum, aut arduum molle claviculam frangi, quod vulgo receptum est. Nam transversum contracta, extensione compressioque digitorum prompse in naturalem figuram teneritque cetera eminentias habet, quae recte possunt coaptari. Stigitur per totam ipsius crassitudine in quocunque modo iugulum fractum fuerit, duo ministri, unus ad humerum eiusdem lateris fractae claviculae manibus circumiectis, brachium ad exteriora simul & sursum trahens, alter appositum humerum, aut certe cervicem attrahens, retractionem à se, quam Graeci vocant Anitafin, molientur: medicus suis digitis fracturam dirigat, prominentiora pellendo, ima attrahendo. Quod si maiorem retractionem à se desideret, orbiculum bonae magnitudinis ex paniculo, aut lanis, aut eiusmodi aliquid corpus à se subiciat, tubi gibberum lateri indidem adiget, ac reliqua sicuti dictum est, exequetur: si autem id nequeat, extremum claviculae iuxta humerum in alro situm ad superiora, agrotante resupinato, eductet, cervicali quodam mediocri, dorso subiecto, ministro humeros duos ad ima deprimente, ut os claviculae quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturam conformabit. Porro si partem aliquam iuguli refractam, in stabilem, aut etiam pingentem percipiamus, scalpello in resectum diuitem eandem auferemus, ac reliqua scalpri excisoria, lamina quae integra tuerint, aut alio scalp pro propter firmiorem claviculae subiecto, ex quibusvis, si quidem inflammatione careat, futuris: sin aliter est, linamentis utemur, & splenis diuersis preparatis, ad osse eminentis inclinationem, maior ex eis & crassiora superaccommo dabimus, si inflammatio infestat, oleo imbuta: sin minus, arida, ac mediocri ex lana orbepropter alam subiecto convenientem inducemus deligaturam, per axillas, affectam claviculam, scapulasque, prout res exigit, fasciantes. Et si quidem ad ima tendente pars claviculae humero proxima, latioris habenulae dimidium, eiusdem cubiti gibbero subicientes, totum brachium ex collo suspendemus: altero autem vinculi dimidio, manum, quemadmodum in his fir quibus ex cubito sanguis detractus est. At si verius superius extremum inelinauerit, quod ratum est, brachium suspendi non debet, verum resupinus aget decumbet, & tenui nitietur victu. Si vero opus est etiam fomentis adiuuabitur: sed pro ratione, vique dum callus iam consolidet. Firmatur autem plurima ex parte clavicula diebus viginti. Sic etiam Guido de Cauliaco: Fracturae scapulae per thoris aliquando est ad exteriora. Aliquando ad interiora: & quae ad exteriora, est facilius reductio: quae vero ad interiora, est difficilis. In illis quae ad exteriora non oportet, nisi mo-

dicum trahere humerum, & fracturam praestitendo ioris ducere; & auxilia dicta ponere: & suppas aut pannos plicatos & feruiam de solea duorum digitorum in latitudine, & octo in longitudine: & ligare ligatura longa, transverso sub costilicis, in quibus sit pila de lana aut stuppis: & roties voluatur quouique locus bene fuerit firmatus: & suspendatur brachium ad collum, & quiescat; & continuo animaduertatur, ne ligatura relaxetur, & semper retinetur, ut dicit Albucasis. Si autem fractura sit ad interiora, applicato genu in medio spatulatum, ut faciebat praecceptor meus Bononiensis, itahantur fortiter humeri ad posteriora, & tunc cum manu reducatur fractura, vel extendatur patiens ad terram, ut Auicenna iubet, & pone scapulas potius puluinae rotundum aut gibbosum, & premantur ad tertiam fortiter humeri: & tunc cum manu reducatur fractura. Et si non reducitur, vni ge manum, aut eorum cum aliquo visco, vt sit in costis: & violenter eleuando manum, aut eorum reducatur. Sed si faciat momentum anhelui, & aliter non possit fieri, vel reduci, caute capiat, ne disrumpatur siphac eum vincio: & trahatur extra, vt sit in extrahendo visum frustula: & emplastreur & ligetur, vt dictum est supra. Tempus formationis est 24. dies, vt dicit Albucasis, eadem fere habes apud Iohannem de Vigo lib. vi. cap. 5. de fractura furculae, addit, quod difficilis sit eius reformatio: ideo indiget chirurgo ingenioso & experto. Vnde quoque primo tenuis, postea plenior ad callum generandum praefribendus phlebotomia quacunque & purgatio ex casta. Maior, & crassior, 120. denotat, solum & fructu. vnde adhibenda & facta ossis furculae reformatio: ne per chirurgum, locus complastandus cum stuppi infulus in aqua & vino expressis, & emplastro de albuminibus aurum, f. r. ma. rolaula & oleo resor. & myr. vique ad septimum, per duos dies imbutando. P. f. ita ea praefribenda, quae ad callum procreandum faciunt. Scapulae quae laze sunt (inquit Paulus) & intenz Lib. 8. c. 92. figuram te praeservant, non franguntur: iuxta spiritum de scapula. nam vero tractum sustinent, nunc compressae, nunc rupturam simpliciter expertae, alias etiam refractae. Compressionem itaque tactu cognoscimus, si causa occurrat, suporem proximi brachii, & dolore puluilem inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & loci dolore deprehenditur: ambo autem ratione qua inflammatione accremus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur. Porro quia ideo res scapulae fascia convenienti adaptatur, si autem pleniora sint, & pungant, postea quoniam feriemus, & furur: (vt primum dictum est) utemur. Fasciae autem & his similiter vt in clavicula, inciduntur: in cubitis oppositi lateris conueniet. Ita & Iohannes de Vigo: Raro contingit os spatulae frangi: sapissime tamen accidit fractura eius marginibus atque ipsius lateribus, ingenio indiget vt testatur: comprimatur autem medicus manum super locum emicentem, & altera manu caput humeri capiendo secundum

De regula
variana 20.
4. de fractu
ra furculae
& ossis fra
cturae res o
mpliata.

Lib. 8. c. 92.
de fractura
scapulae.

duos longitudinem inferius fortiter trahat. Per hunc modum pars elevari vel depressa ad suum proprium reducat locum: & si opus fuerit, ponatur in actu resurrectionis pila magna stuppa madefacta vino sub axilla: & eubius inferius versus costas fortiter trahatur. Et si fuerit necesse, habeat testator alterum ministrum adiuvantem eum; & maxime si per se restorationem facere non possit. Facta ossis restoratione emplastretur locus cum stuppis madefactis vino & aqua: deinde emplastretur emplastro de fatina volatili: de super ponatur ferula lenes ligni tractabilis; vel loco earum plagiæ ex corio: & ligentur permanente aliquot diebus pila sub axilla: & virgæ necesse mutentur remedia de sexto in sextum, & alii primo apparatu procedunt cum albumine oui, olei rosar. & myrt. deinde his transactis diebus redeunt ad medicamenta dicta. Ultimo adhibentur fetor. & cerata sigillatim & roborantia: & huius ossis restoratione communitur sit in 14. diebus. Eadem fere ponit Guilielmus de Saliceto lib. 3. capit. 27. de fractura ossis humeri.

OBSERVATIO V I.

De fractura costarum, & plicatione eorundem.

Viro illi, qui inter cursum & parietem circa pectus compressus erat, costa plicata erat. Ad hunc accitus, cum animaduertirem ex his accidentibus pleuritidem subinde consequi (ut & Guilielmus Placentinus lib. 3. capit. 5. de fractura ossium costarum, & post eum Iohannes de Vigo lib. 6. cap. 12. de fractura costarum dixere) tussis quoque, spiritum sanguinis, & a valida f.bris: Ideo primo ipso die ut phlegmoma fieret in brachio & directo opposito, iussi. Tertio autem die leniorem exhibui cum decoctione pectorali. Interim consului, ut chirurgus costam plicatam & depressam reuocaret ac restitueret, eamque glutine manni illinita tentaret adducere: & albumen vni oui, serum volatili & b. tragac. post, chlori ana 3. i. misce optime: 3. v. l. mucilag. confecta cum aqu. rosar. & pice glutine 3. b. misce, & itare more iam dicto, vel necesse sola manu prædicto modo anone illinita. Vel pone de prædicto medicamine peciam triplicatam super parte depressa, & in medio relinquatur frustum pecie ad modum manice, ut tempore aquæ oui ossis excitata medela super fracturam posita os depressum manni dextra sursum elevari, & sinistra elevatum deprimeret, tubendo ac faciendo ut eodem tempore inferius magno conamine tussit. Cæterum peracta hac restoratione fracturæ & plicatione costæ, locus primis diebus vsque ad septimum de duobus diebus medicamentum permittando emplastrum sequens appositum est: & albumina tritum eorum, olei rosar. emphracini, myrtini ana & in farina volatili & b. mucilag. alibæ & i. b. fa ana fabarum, farina borderi ana 3. v. sang. dracon. citra sigill. boli arm. ana 3. b. chlori 3. i. misce: &

fiat emplastrum. Transacto septimo die ut hoc certatum apponeretur, mandavimus: & rad. albedi lib. i. pedum viridis numer. ii. omnia in aqua & vino odorifere de ossa pisentur: & cribrentur radices cantuari: cui cribrata addantur olei myrtini, olei resacri umbacini ana & ni. olei massic. & i. b. stercus b. clariss. 3. x. croci subtilissime triti 3. b. sang. dracon. terra sigill. ana & b. thuri 3. in sereno faber. recent. & i. b. misce. & cum cera alba q. s. ad ignem fiat ceratum molle, eius operatio est mirabilis in sedando dolores ventrosos, à quibus plerumque ægri in isto casu vexantur: & resoluit languinem & humores, particulamque læsam roborat. Post septimum iam eternum ex eiusdem Iohannis de Vigo auctoritate dedimus: & si non exoneraret ventrem, euema iniuciebamus, & deinde recte sanatus est.

SCHOLIA.

VT igitur pectoris tum costarum fracturas explicemus, scire oportet quod medium pectus dimititur (inquit Paulus) inprimisque summum, ac immum restringitur. Ruptum itaque per medium factam dolor loci & inæqualitas sequitur, & strepitus digitis innixus eliditur: impressionem vero dolor vehemens, spirandi difficultas, tussis, membrana quæ costas cingit disuncta, nonnumquam etiam sanguinis eruptio, patris confectæ cauitas, & in ceden-do facilitas. Curationem eam adhibere oportet, quam in scapulis prodidimus. In impressione autem ad prætorio. Hippocratis adhibetur, quæ ille in clavicula quæ foras processit, usurpat. per incubitum supinum cervicali domo subiecto, sic pulvisque contrahitur, ita ut costa vtriusque manibus simul contrahatur. Iam vero costis lana obiectis circulariter adhibebis ligentram, locis prius in teetum subditis: postea duorum initia truxerit excipiuntur. quæ orbiculares fascias decedere prohibeant. His adijunge ea quæ egregie si ipsi Guilielmus de Saliceto lib. 3. cap. 4. de fractura ossium pectoris & thoracis habet enim in eo loco plurima remedia apta: tam topica, quam etiã ea quæ per interiora exhibentur. At ex costis & sphaeris dictis, ossæ quidem (inquit idem Paulus) omnia in parte rupturam sustinere: spiritus autem, in ea tantum quæ pinxadiacer: nam hic solum ossam habeant naturam: in exteriori parte in cartilagine degenerantes, contunduntur, sed nullam fracturam percipiunt. Note ipsarum non sunt difficiles: etenim inæqualitas digitis explorantibus occurrat, strepitusque, & ad confectum peruenio. Quod si intro spectauerint, dolor vehemens pectoris sequitur, eo qui in costis provenit grauior, quod aculei modo membranam costas integrentem coouulneret: item ægra respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde committatur: & reliquæ vtriusque mutationes dignis licet conformare: eam quæ in ossa spectat, nequam, quod tendi nequeat. Vnde alii cibum

Lib. 6. c. 95. de pectore.

Lib. 6. c. 95. de pectore.

flatusentum vberemque assumi iubent, quæ fractura ex inflatione & tensione foras propellatur, quod necessarium non esse puto, nihil enim comminead hoc inter se habent, tum thorax tum viscera nutritoria. præter quod inflammatio eorum ex repletione augeatur. Alii cucurbitulam agglutinant: quod à ratione & via curandi alienum non esset, nisi corpora ex contractione congregata, fracturam amplius ad interiora propellerent. Quapropter Soranus hunc in modum scribit: *Lani oleo calido madentibus parvis contegentur, & linamentis simplicibus intercostalis replebitur, vt deligatura equalis iuxta orbicularum circumductam velut in pituita fiat.* Omnia vero vt in pleuritici fieri debeant, ad magnitudinis proportionem. Porro si magis necessitas quædam compellat, quod membrana costas cingens vehementer compungatur, cutem dividere conuenit, & fractam costæ partem detegere. Deinde lamina, ne tunica costas tegeas conuolueretur, prius subiecta, osticula quæ pungunt ingeniole excindere ac eiecere oportet. Postquam hoc feceris, ea sane quæ inflammatione carent continges, & cruentorum modo curabis: quæ autem illa affliguntur, linamento oleo madidis operies, victum curationemque adhibens inflammationi dicatam. Decumbent ægri ea figura quam facilius tulerint. Vide fere eadem & egrægia apud Celsum lib. 8. cap. 9. de costarum fractura & curatione: totus enim ille liber ad chirurgiam spectat, agens de fracturis omnibus & luxato ossibus. Ceteri neoterici ita de fractura costarum & partium eius agunt: *Intelligentum est quod fractura scapula & costarum* (inquit Guido) *& ossum thoracis in multis conueniunt differentiis, & causis signis, & indicis, & in modo curandi.* Nam, quemadmodum dictum est de ingulo seu scapula, modo franguntur ad interiora, modo ad exteriora; aliquando & costæ plicantur, & non franguntur. Signa autem sunt communia cum vlcibus, si haugatur: & plicantur ad interiora, accidunt symptoma: a quæ in pleuritide euenire solent, vt *ambitum diffusum spiritum eructantem, insus;* & ideo periculosa est hæc fractura. Quod ad curationem attinet, Haly, Auicenna, Albucasis, tum alii multi diuersimode & sine distinctione tractant de fractura costarum. Nam Albucasis, Auicenna, & Haly abbas id lana, oleo, puluillis ac linamento perhibent. Rogerius æquat, & reducit maius illius v. sco in balneo, aut iuxta ignem firmando cum apostolico, in alio cum applicatione. Iametus idem facit, nisi quod primis quatuor diebus emplastrum ex melle, cymino, bacca lauri, pileggo, ciste indicat. Huic & assentitur Theodoricus, & sequetur Hugonem præceptorem suum. Brunus autem cum distinctione illam quæ exterior sit æquat manibus, emplastris adhibet, & fetulas, vt decet. At illam quæ interiora declinat, loca omnia cum lana vitur in parua: in magna aperit & trahit. Guilhelmus de Saliceto (v. etiam in obs. diximus præcedente) manibus æquat, & albumine

ouorum, farina aliisque glutinatibus obducit. Lanfrancus procedit vt Rogerius; nisi quod præcipit vt patiens iussiendo iacet extrahere costam ad exteriora. Ego autem (inquit Guido) in tali fractura, supposito bono regimine vniuersali de phlebotomia, ventris lenitione, diæta & potione catrinante ex cicero iure, distinguo cum Bruno, vel quod ipsa declinat ad extra, & tunc comprimendo manibus æquo, & cum emplastris de albo ouorum, farina & aliis glutinantibus, & spissis ac ferulis ex solea procedo, tum longis falcis firmo: & in fine cum dialthæa & oxycroceo, vel, vt alius textus habet, oxycrato. Vel ad interiora declinat: & tunc, vt Rogerius, Lanfrancus, Iametus faciunt, in balneo, vel iuxta ignem manibus leniter terebinthina aut aliquo visco, & applicatis super partem depresso trahendo cum adiutorio tussis & retentione anhelitus patientis, eam ingenose eleuo: & si necessarium est, ventosam appono: aut aperio, vt Auicenna ait, cum maxime res urget. Et super partem primis tribus quatuorue diebus, ad sedandum d. alo rem, & inhibendo inflammationem f. u. spoletina, oleum ros. & albumina operies cum fuso: post appono, & leui ligatura solum ad retinenda medicamenta ligo. post vero cum emplastro de farina fabarum & melle procedo. In fine cum dialthæa: & oxycrato dulcoro: & singulis quinque diebus immuto, firmatur autem in viginis diebus.

OBSERVATIO VII.

De fractura coxæ.

Coxarum aut illarum ossa (vt scribit Paulus Ægiæ Coet. lib. 6. cap. 97.) raro quidem franguntur, sed easdem cum scapula differentiis sustineant. Franguntur enim in extremis, complenturque in longitudinem, & per medium finduntur. Comites vtraque ipsarum sunt, dolores partem ipsam affligens, puncturam passivæ sensus, cruris scissuræ ac repentinum sit per propter fissuram, ad operationem scapulae sensum possulant, auctantur autem solum ex chirurgia eius quod fractum est, exemptionem per exteriora corpora, vt qua, si opus sit, digitis conformentur. Desinunt etiam aliam curationem moliri oportet, somento viendo, & conuolam illam linamentum adimplendo, quo deligatura cum fasciis circularibus superimectis, equalis efficiatur. Eadem etiam dicenda sunt de pedinis ossibus: nobis etiam peculiariter de ipsa dicere habemus. Hactenus Paulus. Si vir quidam valde obesus cum cecidisset supra coxam, ad eum accitus chirurgus, eo modo quo ad longum docet Guilhelmus de Saliceto lib. 3. cap. 12. de fractura ossis coxæ, fracturam testatur & peciam linearem quodam subterdem longam & latam ad crassitiem coxæ, intusam oleo rosæ aut communi, cum paulo albuminis oui mixto imposuit, & super ipsam emplastrum sequens in forma fabarum, farina ciceri, bordis farina velutis molendo, ana 3 ss. massam traxit, gummi arab. mummia,

Soranus.

De fractura
costarum &
partium eius.

bol. arm. myrtib. pulvis satorum ana ℥iij. album. v. ouorum conuassata in vino nigro styptico & gophoro, succi plantag. aut buisimodi styptici q. s. ad incorporandum. fiat emplastrum. hoc constringit, repercutit, rotit, roborat, & firmat. Eo etiam vtitur Guilielmus de Saliceto cap. 11. de fractura anchæ, in ipsius ossis anchæ fissura. Possunt autem & loco huius emplastri in fractura coxæ poni faldelle stuppee decedentes, laterales, longitudinales & transversales, ad quantitatem coxæ, inuolutæ in albumine ouorum & pul. confectis. Lape superius dictis, infuse in aqua & vino styptico & expressis: deinde super omni his hic chirurgus apponebat ferulas ex salice aut ligno molliori & tractabili vi, aut circa, secundum crassiem ipsius membri, stipula quoque inuolutas, aut re molliori, ut idem Guilielmus de Saliceto docet, quæ erant longe ad longitudinem coxæ; ita tamen ut non offenderent nervos in genu & in quinge. etantque superiores & exteriores crassiores, ut ibidem cap. 12. ad longum dicitur. Deinde super iniecta est fascia decentet, ut idem quoque docet, & sicus eodem modo insituebatur. Nos vero statim post primam visitationem (ut auit) in brachio sanguinem demitti curauimus ex loco è dicto. & si venter non solueretur, eum glabre aut chlytere tixibamus: interim he subiequeretur inflammatio, cucurbitulas eumificatione habibus apponi tandem impetravimus. At primam ligaturam chirurgus non solvebat nisi post iij. aut quintum diem. Interim quotidie animaduertebat nū in debito situ permaneret. alioqui si accessisset dolor, spectandum fuisset numquid aliqua eminencia esset in osse, quæ auferenda esset antequam callus succoides generaretur. Dixit etiam commodam & nos præscripsimus, prius tenuiorem, postea pleniorē: & ita deinde ut in aliis tenuerit fracturis, chirurgus procedente, hic cutatus est. quamvis tardus. Neque hoc mirum, cum & ipse Iohannes de Vigo lib. 6. de fractura, cap. 13. de fractura ossis coxæ ita scribat: *Ita fractura in quinquaginta diebus firmatur: citius tamen interdum, aut tardius, iuxta aetatem & corporis temperiem. Nam & in his fracturis consuescentibus, teste Auicenna, prærobantur.*

SCHOLIA.

De fractura ossis anchæ & coxæ.

DE fractura ossis anchæ & coxæ, Guido, eum agit de reparatione fracturarum cap. vii. ita inquit: *Os ambæ raro frangitur: sed quandoque frangitur, & terminatur cum extremitatibus: & quandoque, impellitur ad ventrem: & accidit propter hoc dolor & stupor in coxæ, & ex hoc sequitur diminutio in coxæ: & est res satis difficilis ad reduendum. Et ut reduci de oportet extendere coxam, & pellere ancham; atque ita quantum fieri poterit, reduci: & postea emplastrare & ligare.* reliqua vide de fractura ossis anchæ lib. 3. cap. 11. apud Guilielmum de Saliceto. Cum coxæ frangitur, necessaria est extensio fortis, ut dicit Auicenna: propter quam fracturam, & omnium aliorum membrorum, quod ad causas attinet, & totius regiminis in genere est e currendum ad sermones (inquit Guido) vniuersales superius dictos,

Fractura anchæ.

Fractura coxæ.

nisi quantitas ad fracturam coxæ, parum denudatur à claudicatione, ut refert Avicenna. Speciatim tamen sciendum est, in quo se et omnes concordant, quod eodem modo est procedendum in tegimine ipsius, & in adiutori fracturæ, de qua postea etiam quardam adiciemus. Interim si libet, videas Theod. lib. 7. cap. 35. de fractura adiutorij, & lib. 1. Bruni in chirurgica eius magna. rub. 4. de fractura adiutorij. & Lanfrancum de claud. tract. 4. cap. 3. de fractura adiutorij. & lib. 3. Guilhelmi de Saliceto, cap. 2. de fractura ossis adiutorij, qui hunc sermonem præ cæteris producit. Et ideo, inquit Guido, quod ad fracturam coxæ attinet, rationem similem habet cum fractura adiutorij, propter quod oportet ut fortius extendatur. Præcipiant itaque eam extendere per duos ministros cum ligamentis ligatis super & sub fracturam, quarum exterioribus volebat Guilielmus esse longiores & fortiores, licet secundum Albucasin tres sufficient: quia crus loco ferularum præcipiebatur ligari cum coxæ, ut calcaneus perveniret ad nates; quod mihi, inquit Guido, non placet, & ideo in modo firmandi sunt diversi. Nam aliqui, ut Rogerius, Albucasis & Guilielmus, situant eam in lecti plano, & appodant (sic enim loquitur barbarum) ipsum hinc inde cum panibus & stuppis; quod non laudo. Alii, ut magister Petrus, cum sustentaculis factis ex paleis longis secundum longitudinem pedis, inuolutis cum lintamine, & sutura, de super ligant cum tribus quatuorve fasciis vel vittis. Alii vero, ut Auenenna & Bruni, & Rogerius, cum duabus ferulis longis vsq; ad pedes ligatis, vittis quoque, iniectis & alligatis. Nonnulli, ut Lanfrancus, & alii multi neoterici, in capsula seu caua vsque ad pedes ponunt: omnes tamen, quicquid agant, ad hoc intenti sunt, ut coxæ fracta æqualiter strueretur, & sine molestia quiescat, & non moveatur, neque declinet ad aliquam partem. & ad maiorem cautionem Rogerius agrum ponebat in lecto stricto perforato, ut sine elevatione in situ permanens etiam alui deponere posset: & ligabat coxam & tibiam in tribus quatuorve locis ad lecti spondam, & pedem ad columnam, ut arget non posset eum ad se trahere, quod & Theodoticus similiter faciebat. Ego autem, inquit Guido, eam ligatam esse hastellis, id est, ferulis longis vsque ad pedes firmo aliquoties cum iisdem sustentaculis ex paleis confectis; aliquoties, cum capsâ: & ad pedem ligo pondus plumbi, quod per chordulam transiundo rotulam parvam (quam ipse idiome suo polegeum vocat, nostri *En polij*, ita ut tibia per eandem in sua longitudine detineatur. Et si esset aliquis defectus in æquatione, trahendo paulatim rectificabit. Immutat autem remedia circa nonum diem, & vitra. Firmatur (ut idem inquit) quinquaginta diebus. Reliqua de fractura ossis coxæ, si libet, hic adicias, nempe ea quæ scripta sunt apud Iohannem de Vigo lib. 6. cap. 13. & ex Bruno lib. 1. rub. 6. & Theodotico lib. 2. cap. 31. & Lanfranco, de claud. tract. 4. cap. 6. de fractura ossis coxæ vel pedis. Ceterum de femore (inquit Pantus lib. 6.

cap. 122. de femore) eadem dicenda sunt, quæ de brachio prodidimus: de quo & nos mox dicemus. Peculiariter autem magis femur fractum, in anteriorem partem & exteriorem promouetur: etenim in his naturaliter dilatatum est, inflatur autem manibus, funiculis & antennis æquialentibus, una supra fracturam posita; altera, subter. Quod si in parte fractura enenerit, idque iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circumdata, ne corpora incidat, iuxta inguina disponemus; & initia ad caput reducta; funulo vñ partem contineat, trademus: infra autem fracturam suæ circumpositio initia ad intentionem in alteri ministro exhibebimus. Quod si ad genu fractura habeatur, suum sane supra fracturam in initium, initia eius ad elevationem dispensamus, genu etiam ipsum impliciro quodam fune continemus, hanc autem partem restituiamus ægro decumbente, & curre exporreo, quæ pungunt ossa (ut *subinde dictum est*) eleuata superius tollemus. reliquam curationem in capite de brachio exponemus, cæterum callo firmatur femur quinquaginta fere, vt scripsi diximus, diebus. At quomodo topoi debeat, cum etiam de curre dicemus, id explicabimus. Cæterum ad hanc rem maxime spectant quæ & ipse Cornelius Celsus *lib. 8. cap. 12. de humerorum, brachiorum, femorum, digitorum fracturam vel cuiusvis communibus curationibus* inscripsit, deinde magis propriis: quem locum diligens lector petere poterit. Cæterum vir ille qui ex altissimi domo cadens femur fregit, septimodie spasmodum incurrerat; & tandem mortuus est. At puerpera quæ extra portam qua ad Mosam itur Delphis habitabat, cum curtus tota femur fregisset, sine vulnere curata fuit. Nunc ad alia exempla progrediamur.

OBSERVATIO VIII.

De humero, ac deinde etiam brachio fractis.

OS adiutorii seu humerus cum fractura in quodam sito afficeretur, eo restituito per chiturgū, emplastrum descriptum obseruatione præcedente appositum est. Guilhelmus de Saliceto *cap. 8. lib. 3. de fractura ossis aducloris* hoc apponit: *℞. far. fabar. cæterum aut prob. aut volatilis, quæ circa molendinum reperitur, lib. ʒ. massicæ trag. gummi arab. mummia, aloes, surri ana ʒ. ʒ. bol. arm. terr. sig. sang. drac. lycii ana ʒ. 2. album. oior. iiii. confice cum vino hyppico, extendi super pannum lineum, & appone. interrim & stuppas laticas, longas, balneatas aqua prius: & expressas, toti brachio circumuolebat: fasciæ latitudine quatuor digitorum, aut quandoque duabus præparatis, alligentur dicta, adiectis ferulis quatuor aut sex, etiam faldellis stuppeis in fufis in aqua & aceto. Interim facta restituratione etiam pannus lineus infusus in oleo rosæ prius apponatur: deinde reliqua iam dicta per ordinem, vt emp. deinde stuppe, postea ferule, vt ad longum explicatur ab eodem Guilhelmo de Saliceto, iniectionis fasciis, vt motis est: & non soluebatur ad quinque dies. Interim brachium inungebat, nec non spatulam & loca vicina, aliquo defensiuo in-*

terim nos sanguinem detrahi iussimus ex brachio opposito, ne fieret inflammatio ex vena cephalica: deinde ubi quoque; vntus videbatur, lenitum dedimus: vidit vntus primo tenuiori, vt *borderato, amygdalato*, ad securitatem apostemari. Postea & dolore sedato, cum turti effemus ab apostemate, cubui pleniorē præscripsimus, & *vinum rubrum* concessimus; etiam *assa, & vitellorumum* & similia, & *animalium extrema*, quæque callum promoueret: atque ita ipso chirurgo procedente vt in reliquis fracturis, tandem hic homo curatus est, quemadmodum & nobilis illa femina, *Weldam* dicta, in Haga Comitum, cum brachium fregisset, per Hugonem medicum & Bartholdum chirurgum curata est. Adquam & ego accitus fui, ac sanguinis spurum, cum prætori angustia: à quibus tamen, licet vetula esset, aptis adhibitis remediis per me cum Hugonem curata fuit.

SCHOLIA.

Humerus fractus, inquit Celsus. non sic vt membrum aliud intenditur. Sed homo colloctur in alto sedili: medicus autem in humiliori, aduersus. *Fusa* fractura brachium amplexa ex ceruice ipsius qui læsus est, id sustineat. *Altera* ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum. *Tertia* iuncto imo humeri o deorsum demittitur: ibi quoque capiubus eius inter se iungitur. *Deinde* ab occipito ipsius, minister sub ea fasciæ quam secundo loco posui, correpto, si dexter humerus duendus est, dextros; si sinister, sinistros brachio, demissum inret femina eius qui curatur baculum: medicus super eam fasciæ de qua restio loco dixi, planam iniicit dextram, si sinister, sinistram: si dexter humerus fumatur: quo sit vt leniter humerus extendatur. *Fiscus* vero, si medium aut immum os fractum est, breuioribus opus est: si humum, longioribus, vt ab eo sub altera quoque ala per pectus & scapulas portigantur. proninus vero brachium cum deligatur, sic inclinandum est id quod afficit, vt ante fasciæ quoque sic figurandum sit, ne postea suspensum ariet, aliter cū deligabatur, humerus inclinet. Brachioque suspensio, ipse quoque; humerus ac iocus leniter deligandus est, per quæ sit vt minime moueatur: ideoque, ossa sic se habent, vt aliquis composui. Cum ad ferulas ventum est, extimifcus effeceram longissimæ debent, à lacerto breuiotes, sed sub ala breuissimæ. Sapiusque ex tenuiende sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiant. Quoniam solutæ sunt, fractura manu continenda; cubitus aqua calida fovendus, & molli cerato perficandus: feruleque vel omnino non imponende contra eminentia cubiti, vel aliquanto breuiotes sint. At si brachium fractum est, ioptimis considerandum est, alterum os, an vtrumque comminatum sit: non quod alia in eiusmodi casu curatio admoenda, sed primum vt valentius extendatur, si vtrumque os fractum est, quia necessesse est iniussu cruius contrahi altero osse integro, eosque inuoluerente: deinde vt curiosius omnia in con-

Corn. Celsus de humeri fractis curationibus.

Corn. Celsus.

Mistura quatuor ferularum fractis.

De brachio fractis curatione, eadem.

in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam ubi alterum integrum est, plus opis in eo quam in fasciis, ferulisque est. Deligari autem brachium debet paulum pollice ad pedem inclinatum. Si quidem in maxime brachii naturalis habitus sit, idque inuolutum mitella commodissime excipitur, quae latitudine ipsi brachio per angustis capitibus collo iniicitur; atque ita commodè brachium ex ceruice suspensum est. Itaque paulum supra cubi alterius regionem pendere oportet. Quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id vinciendo alienum est. Fit enim brachium immobile: ac si nihil aliud quam dolori occurrat, idem qui fuit eius usus est.

In brachio contra Cho Hippocrates quidem intentionem in hoc pacto molitur est (teste Paulo) ligamentum, inquit, oblongum colummula modo per summa sunt deligatum, obliquum ex trabi quadam suspendere oportet: collocato autem domine in sublimi erectum, vel iuxta figuram quae a recta sessione vertebatibus ducitur, manum ipsam supra commemoratum ligamentum trahere, ut medium ligni ale tra transuersem adapteretur. manum autem inflexo iuxta rectum angulum cubito minusser procumbens continetur: deinde graue aliquid, exempli gratia lapidem aut pondus plumbeum, vel eiusmodi aliquid ex cubito suspendens, sinemque pendere sublimi, ita fracturam conformat, vel loca ponderum famulo ad ima brachium detrahit. Nonnulli vero loco columellae gradu scalae vbi sunt. Soranus hunc in modum tradit: agro in sedili collocato, vel, quod satius est, resupinato, quo minus molestia sentiat, manum sine ligata iuxta compagem quae ipsa cum brachio coniungitur, & ex ceruice suspensa, vi angulosa ipsam figuram seruetur, minusser duobus subeodem, hinc supra si aliam, illi infra, digitis circumponant; atque sic tensionem perficiant. Quod si valentior opus sit tractatione, duos funes aequales brachio circumdamus: vnum supra fracturam; alterum, infra, atque vni famulo super aegrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capiti funium trahentes, iubebimus in diuersum brachium distendere. At si summus humerus fracturam senserit, dimidio vinculi, quod circa dicitur, ale subiecto, reliquam partem iuxta caput teneti iubentes, alio quod oppositum est retrahente, antitalem, hoc est, à se retractionem, vti dictum est, moliemur, quemadmodum sane si cubitus contrafractus fuerit, illi vel iunctura manus cum brachio fanis iniicietur. Ossibus iam fracturam probe coaptatis, dissensio quidem remittetur, sed iuxta Hippocraticam consuetudinem deligabitur. Porro si fractura inflammatione vacet, recensque sit, lineis vtendum fasciis oblongis abunde, circa tres quatuorve digitos latis, aqua madentibus, aut etiam posae: si inflammatio adest, lanis tenuibus mollibusque oleo imbutis, & si quidem in medio brachii fuerit fractura, initium fasciae super fracturam iniicietur: vbi bis tunc ille ligaueris, sursum fasciam ducere conuenit, vt (quemadmodum inquit) sanguinis infusiones excipiantur, atque illic finiat. Iam vero & secunda fascia vti oportet, initium eius similiter supra fracturam iniiciendo, atque alia eodem modo

quo in priori: rursus autem super ne deorsum, atque iterum sursum reuocare, illic etiam sic terminabitur. Porro contrafractio mediocris est, iuxta nostri sensus, tum ipsius aegrotantis iudicio. At si iuxta summam humeri compagem contigerit, priore fascia illam & scapulas & pectus comprehendens, vt deligatur fiat quam Graeci geranida appellant, perque secundum vsque ad cubitum dispensabis, ac inde ad supra posita recutres, cum summo humero scapulas pectusque comprehendens, primae fasciolae similiter. Quod si gibbero fractura obuenerit, etiam cubitum colligare expedit, ita vt anguli figura conseruetur. Similiter in aliis quoque artibus, nimirum cubito, femore, tibia, cum fractura in parte, aut etiam iuxta articulum, & non in medio membri existit, post articulum fasciam iniicere expedit. Recentiores itaque secundum deligaturam protinus ferulas etiam iniiciunt, vt adaptationis figura continetur, contrafringentes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione postulat: vetetes autem à die septimo ferulas accommodant: nam intra hunc inflammatione declinante membrum redditur tenuius. At Hippocrates tertio die ligamenta solui iubet, ne tendio quae priam, aut motus praeter solitum eorum articuli obuenerit, aut eius quod iam infixam fractura est, petipianus prohibeantur, propter quos non solum noxius pruritus quibusdam accedit, sed etiam erosio à sanie & acrimonia nonnumquam cute, exulceratio concitatur. itaque aequae temperatae tantum superfundere ratio est, quantum sanem discutere sufficit. Post septimum diem, ex maiore interuallo soluere conuenit, cum partes non amplius sanem excernere desiderent; imo etiam calli obfirmatio hoc modo felicius prouenit. Ceterum ferulae iuxta sequentem rationem iniiciuntur. Splenia triplicia oleo imbuta super fascias circumdantur. Si igitur membrum crassitudine fuerit aquabile, similiter si in: quale, paribus magis concauis per splenia repletis, aequae crassitudinis membrum ferulis accommodandis efficacius: deinde lana aut itappa ferulas mediocriter innolutas, in ubi fracturae circumdamus, non minore quam digiti spacio inuicem distantes: easque moderate contringemus: ita tamen, vt quatenus fieri licet, articulum precipue accedente ferulas prohibeamus, praesertim iuxta interiore flexus partem. Vltima siquidem in ipsos nonnumquam & retroorum inflammationes patiunt. Verum illae laxiores ipsas esse oportet quemadmodum valentiores, vbi fractura curuatur. Praefiterit autem thoraci etiam brachium mediocriter colligare, ne ipsum locomotum, figuram perterat. At si quando inflammatio fuerit (cum vero agnosces ambiente tumore, ac calore, & quod membrum nunc, multo magis quam prius stringatur) vel si contrafractum membrum distortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, vel contrario strictiora, quam par est, inueniantur, solutis ipsis deligatur instauranda est. Resupinari igitur aegrotus debet, ita vt super stomachum

2. lib. 8. cap. 90. de brachio.

chum manū contineat: brachio subleietur mole aliquid, pellem super se habens, vt superfati-
onum influxus excipiat. Superfundetur autem
quotidie oleo eribdo, præsertim cum viget in-
flammatiō. quando etiam ei⁹ tenuis exhiberi
debet. Postea medicus ad calli generationem
quis indicitur, vsq; dum fracta occiduerint. Oc-
calleſcunt autem brachia & tibia diebus circiter
quadraginta, post quos vbi solueris fistas, & lau-
uacro vsus fueris, emplastris ad fracturas factis
perſanare conuenit. Hæc tractandi ratio omni-
bus aliis propemodum confractis artubus con-
uenit. Cubitus radiusque interim vterque iuxta
eundem locū frangitur, interim alter duntaxat,
vel in medio vel in parte qua gibberum spectat,
aut brachiale. Omniū itaque deterrimum est
quum ambo eadem parte franguntur, deinde et-
iam cubitus solus. At radius fractus, alius facilius
curatur, si quidem maior cubito non est, sed il-
lud ipsum subiectum habet, vt veluti insidet.
Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit in
illomaxime infensione in validam moliemur: si
vterque similiter interdum, manu anguli mo-
do figurata, vt pollex omnium digitorum alrissi-
mus, exiguis digitus homillimus habeatur. sic-
nim cubitum radio subiciat contingit. At si valen-
tior opus sit intensiōne, ambobus potissimum
confractis, non solum manibus, sed etiam funi-
bus interdode aggre diemur: vt in capite de bra-
chio comprehensum est. Ceterum omnis deli-
gatura & reliqua præſidia vna cum ſecularum
inſectiōne, hic adhibenda sunt, dum callus eos
firmari. Firmatur autem cubitus diebus pluri-
mum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei,
quam brachium fractum vendicat, præter ea
quæ ipū subiciuntur. Vnde autem & aduerſe
eius partis, & in digitis articulorum ossa, quum
laxa fistulosaque rura sint, contunduntur quid-
dem plerumque, raro aurem franguntur. Egro
igitur in alto sedili collocoato, medicus in altero
quodam æquali aduersus sedebit, priusquam ma-
num disponat: ac tensis per ministrum iis quæ
fracta sunt, duobus digitis ipsæ conformabit, polle-
ce & indice digito prius compressa, deligatura
vritur, quo tempore viget inflammatio. Nam pro-
pter laxitatem facile in ipsis callus amplior con-
creſcit. At si acies digitorum, aut digitus simplici-
ter confractus est, si quidem magnus & pollex
appellatus fuerit, post communem deligationē
ad inferiorem partem, ipsum vtrique cum manu luga-
bis, ne dimoueretur: si ex albis quispium, vel index
vel parvus digitus, proximo colligabitur: sin ali-
quis ex medius, iis qui vtrique habentur, veler-
iam omnes deinceps ligari vna debent, melius e-
nim conſueſcunt: quemadmodum si etiam ſeru-
lis fracti colligentur. *Hæc sunt Paulus;* quæ ipse
enam magna ex parte ab ipſo Hippocrate mutu-
auit. Vide Hippocratis de fracturis l. bellum, cum
commentariis Galeni, quibus Vidus Vidus et-
iam figuras commodas adhibuit. At iuxta Neoteri-
cos ipſe Guido & hanc rem perſeſcit, breuiter
de reſtauratione fracturarum. cap. 3. de ſtatura ossis

adterioris & brachii & totius manus sic ſcribit: Os adu-
to i. cum frangitur, magna ex parte declinat ad exte-
ra, vt dicit Auenenna: circa quam fracturam est in-
telegendum, præter vniuerſalis, quod licet Al-
bucasis ponat duos modos reductionis & æqua-
tionis, quorum primus mihi est diſſiſſilis, ſ. cin-
dis facilis, quia & incors est cum omnibus, nili in
hoc quod loco ſerua: ſi ſeu ſtaſtellamini præcipit
vt brachium ligetur cum adiutorio, taliter quod
vola manus inuigetur cum humero: nihilominus
melius est, vt poſt reductionem factam ſuaſuiter
indoloreſcit trahendo, adiutorium cum brachio
& cubito per miniſtrum aliquem, alreio ſumante
tenente partem ſuperiorem & humerum: fra-
ctura enim manibus æquetur, & ligetur, & quin-
que aut ſex ſerulis iniectis, & ad collum cum
mantili ſuſtinetur, ita vt brachium plane ſupra
ventrem iaceat: & cum preſſatis & ſpannis ſtaſ-
ſtinetur, vt non torqueatur, rematur autem
de quatto ad ſeptimum, & firmatur quadraginta
diebus. Eadem ſete ponit & Theodoricus lib. 2.
cap. 35. & poſt æquationem applicat emplastrum
conſolidarium, ſi non timeatur calidum apoſ-
tēma, & ſoluit de tertio in tertium diem. Si me-
tus ſit apoſtēma, abſtinet ab emplastro & ſeru-
lis vsque ad ſeptimum diem: & tunc adhibet la-
nam ſuccidam aceto & oleo roſaceo madidam,
mitigantem calidum apoſtēma: deinde ſtrin-
git. interim ſingulis diebus ac nocte ſua amia-
duertinum ligamentum diſſoluatur, aut figura
membri mutetur. quod ſi ita fit, cottigit & ite-
rum ſtingit. & iubet infernum ſaper doſum de-
cumbere, & vt manum ſupra ſtomachum conti-
neat, etiam puluinat molle ſub adiutorio ſubi-
ciens. & ſi in 40. diebus non ſit reſtauratio, ite-
rum ligat, & adh. bet ſerulas, & demittit vsque ad
ſo. dies, vel ad duos meſes. eadem ſete ponit &
Lanfrancus deſt. l. tract. 4. cap. 5. de fractis adu-
torii: & dicit diſſiliorem eſſe ſi ſit prope iuncturam.
Brunus autem lib. 1. rub. 4. de fractura adiutorii, di-
cit ſanguis Albugaſis, adiutorium eſt id quod
eſt inter cubitum vsque ad caput ſpatule: deinde
eadem ſete quæ tunc diximus, & eandem rem,
ſed multo dilucidius, & longiori ſeremone, Gui-
helmus de Saliceto proſequitur lib. 3. cap. 8. At de
brachio & ſocilibus eius loquitur Guido, accidit
quandoque in brachio vtrifragantur ſocila duo
ſimul: quandoque vero alterum ſolum: & fra-
ctura ſocilis inferioris maioris eſt vehementior
& turpiſſa, quam ſuperioris & minoris, iſſe A-
uenenna & Albugaſis. Circa hanc fracturam con-
cordant omnes, ſoc vnum oſſis ſit fractum, ſive
ambo extendatur per duos miniſtros: & vnus
trahat verius cubitum, alter verſus manum: &
miſcus ſuis manibus ſuaſuiter æquet & reſtauret
& liget, & alia hanc quæ dicta ſunt circa vniuer-
ſalis. Brachium, quando alterum os frangitur,
paucis ſerulis & minoribus eger: ſi ambo fran-
gantur, quinque vel ſex requiruntur. Si ſuarur
iuxta ventrem. ſupenditur ad collum: ſi ſino-
atur in 37. diebus. eadem ſete ponuntur à Bruno
lib. 1. rub. 5. de brachii fractura & Theod. lib. 2. cap. 36.

De fractura
na iſſe ad-
uenera.

De brachio
& ſocila
hanc om.

Scd

Paulus lib.
d. cap. 100.
de cubito
& radio.

Cap. 101. de
fractura
manu &
ipsius digi-
ti.

Sed Lanfrancus *tract. 4. cap. 1. addit* si tantum vnum si agatur fecle, non opus est ferulus, quoniam os unum ligatura sustinet. Guilhelmus vero de Saliceto hæc ossa quoque plicata vult absque fractura, *li. 3. c. 9. de fractura focium brachii*. Et distinctio plicationis à fractura trahitur ex auditu, tactu, & quandoque visu: vt quando per tactum cum manibus tuis palpando non audis sonitum inesse ad modum rei fractæ, nec sentis asperitatem, vt sic dicam, pungitiuum in aliqua parte ossis; licet in aliqua parte eminentia appareat, & membrum indebitum ac infuetum huiusmodi habeat, tunc est signum plicationis & non fracturæ. Quomodo vero his opposita apparent, si gnium est fracturæ, & non plicationis solius. Deinde longiore sermone persequitur eius testationem, etiam in fine adiungendo, si cum vulnere fiat, quomodo sit curanda. Ossibus autem rascetæ parum accidit (*inquit Gwido*) fractura, quoniam ipsa sunt dura valde, sed separatio: quare consiliū Albulicis vt extendatur manus supra tabulam, & comprimens & plasmendo teducatur, & emplastreitur, & ligentur, & ferulæ adhibeantur conuenienter: & vola manus cum stuppis aut pannis impleatur, & digiti vnus cum alio ligentur: remittitur de quarto in quartum. Firmatur in 10. diebus. Eadem fere Theodotici; vt Paulus antea quoque docuit *lib. 2. cap. 37. de fractura - sicut digitorum*. addicit tamen Lanfrancus loco paulo ante citato, cum digiti parui sint, quod magno ingenio & cautione tam in restaurando quam curando indigeant. Verum longiore sermone ipse Guilhelmus de Saliceto *lib. 3. capit. 10. de fractura pelvis & digitorum* maius persequitur, huc fuerit fractura harum partium cum vulnere, siue sine vulnere: interim propter membri paruitatem loco faldellarum stippeatur, vt maior cumulus fiat in loco, solis petus lineis subinde vititur: interim non omitendo: nam phlebotomiam, purgationem & victus rationem, prout necessaria videbuntur, neque defensionis scilicet ab initio; vt loco iam citato ad longum legere poteris.

OBSERVATIO IX.

De tibia fracta.

Iohannes chirurgus Delphenus, cum ad ægrum accitus esset, ac equo veheretur, prolapsus in terram, tibia m fregit. Alii chirurgi conuocati, cum crasse ita assent, vtrum vitiole, an inuidiæ, ignoro, moniti uosum tamen membrum cum crus post consolidationem permanisset. Vnde recte dicebat Theodotici *lib. 2. cap. 23.* os quandoque non restitatur secundum quod oportet: imo membrum remanet monstruosum: cuius rei causa est aut ignorantia medici, aut defectus ferularum absolute, aut scilicet ablationis earum ante confirmationem fracturæ: aut est superfluitas motus in hora quietis. Cæterum quæ fuerit causa in hoc nostro chirurgo, cum eandem aliter in alterum reiceret, ignoro. Interim hæc de causa misellus iste chirurgus ob ita defor-

tum, contortum, & male curatum crus, à vulgaribus deinde idiomate nostro Germanico *Crummen* dictum est.

S C H O L I A.

Tibia (*inquit Paulus lib. 6. ca. 104. de tibia*) cubito respondens eandem curationem obinet: etenim illa duobus ossibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine Perone Græcis, quasi *Fibula*, Latinis *Sura* dictum, eadem fracturarum differentias recipit. in omnem enim partem protolabitur, quum aumbo ossa confRACTA fuerint: in tres autem quum alterum intra & extra, tibia quidem, tetro; sura anterior, quia propter etiam ipsa similiter restituitur manibus aut funiculis superioribus, qui fracturæ funes sunt, interim ipsi tibia circumdatis, interem femori. Nam quum genu sit validius, articulum integrum per tensionem seruabimus. Similiter & in inferiore fracturæ funiculo, vt in cubito dictum est. reliqua vt in capite de brachio tradidimus. Vt autem & hic reliquis fracturas quæ in crure fiunt, absoluamus, ideo & quæ Cellas de crurum femorumque fracturam curatione scribit, hic referemus. In crure æque ad rem pertinet, alietum saltem os integrum manere. Commune vero ei femorique est, quod ubi deligatum est, in canalem coniungendum est. Is canalus & inferiori parte furamina habet, per quæ liquor humor excellere, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustinet eam, & delabi non patitur: & à lateribus crura, per quæ locis datis mora quidem eius feruntur vt collocatum est detineat. Esse etiam is debet à planta, si crus fractum est, circa poplitei femur, vsque ad coxam: si iuxta superius caput femoris, si vt ipsa quoque ei coxa sit. Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum reuertitur; summisque digitis postea cruris eius insili. sed multa tamen femori debilitas est, ubi fortunæ negligentia quoque accessit. At patella (*teste eodem Paulo lib. 2. cap. 103. de patella*) os laxum est ac molle, valide e corporibus superiore, & ima parte comprehensum. frequenter sine contunditur, raro autem frangi solet. sustinet antem rupturam per crassitudinem, & in tenuia fragmenta finditur, cum vulnere, vel sine vulnere. Nota vero conspicua (*metum enim sublabitur*) continuariis, est cauitas & sonitus. Instauratur autem pars cruris extensa: nam tam diu bifariam fissa digitis committitur, donec fracturæ labra supra se se contingant, & inuicem iungantur: quæ in tenuia fragmenta fissa est, manu conformatur, etenim calli non generato, eo quod pars vtrique super musculos neruosque cognatos à femore & tibia non tetrahatur, tamen multa disensio contrahet, & functionis difficultatem affectio inducet: neque enim laborantibus ipsis largius genu sustinet, & c. bambulando impediuntur, præsertim ascensui, si quid in æquali motu actionis difficultas occurrat: in pausatione autem, eo quod non inflectatur genu, in cruris initio, & si-

Plicatio
fortium.De rascetæ
ex digito
manu.Celsus lib.
8. cap. 10. de
crurum fe-
morumque
fracturam
curatione.

Lib. 8. cap.
105. de pede
sumus.

Item deprehenditur : atque hic officulum pun-
gens eleuatum vbi exemeris, curatiōe sequen-
tem admovebis. Talis vero nequaquam frangi
solet, eo quod vndequeque tibia, fura, & osse
quod ob tesseræ similitudinē vocatur cyboides,
custodiatur miniaturque. At os quod à scaphæ
figura dicitur scaphoides, & supernæ pedis regio-
nis, item pedis digitorum ossa ipsūq; cubitum,
similiter iis quæ in vola & opposita eius parte ma-
nusque digitis sunt, franguntur, quare etiam quæ
de illis diximus ne eadem repetantur, illinchiue
transferte consilium est. Quomodo crus depō-
ni debeat, ex eodem nunc adiciamus. Femore
fractū aut tibia, non minori cura repositiōnem
ipsius, quam reliquam urationem obibis. Nam
paritum conficiendum æqualitas, hæc possit. ū
probe administrata, conseruatur. Nonnulli igitur
canali, quam *solum* Græci dicunt, ounc lignea
nunc hūcti membrum fractum, aut etiam
erūs ipsū reposituri: alii vero sola ea quæ cū
vulnere fracta sunt, eo quod hæc ferulus neque-
ant frangi, in totum vero sulcatum vltimū
posteriore dam natum; multis sane de causis, sed
præcipue quod ipsarum duritia partib. negotium
facilestet. Neque ramen alienum est, ætus cum
vulnere fractos (ut supra dictum quoque est) ferulis
excipere, ut ostendimus. Ager igitur resupina-
bitur; ac indumentum aliquod crassum cui re-
quale, in longitudinem vtriusque contractum
& inuolutum, ut canali per mediam concavita-
tem oblongam propotione r. spondeat, subii-
ciunt: pellis super ipsam molliscula explicabi-
tur, quæ superfatationes excipiat, deinde in lōgum
erūs concavitati hunc canalē referent, inlinuabi-
tus: à laterib. alia vestimenta lanae e apponitur,
ne membrum in latera declinet: pedis autem ima
pars asserculum tectum panniculo circumdari,
propter mollitiem assumeret, ac maioris securitatis
gratia, media fasciæ duarum triumve, vesti-
mento canalis modo præparato subicientes frac-
tum membrum ipsū leuiter deligebimus. At si
ager non tolerans conetur pedem totum cōtra-
hete, conuenit id facere, quod in superiore pedis
parte dictum est, deinde blande cum asserculo
deligare, ne inuati aut non scientes inter dormi-
endum, ut venisimile est sæpe contingere, pedem
contrahant. Aliqui vero stragula lecti per medi-
um petiunt. Ut ipsi sint immobiles, & per for-
ram vtriusque & stercore reddatur, vsque dum cal-
lus coalescat. Cæterum Neoterici de fractū ge-
nu & tibiae vsque pedis (ut Guido à Causano)
hæc pauca, & eisdem fere que Paulus dixit, ad-
diciunt. Rotula genu tato frangitur, sed pluri-
mum conuertitur: & oportet in refectione e-
ius, ut dicit Haly abbas, fragmenta cum digitis ad-
nuare, & iuxta propriam figuram adquare, &
emplastrare, & ponere ferulam torundam de so-
lo (forte intelligi solet) deinde ligare ut conuenit.
Eadem fere & ipse Vigo lib. 6. cap. 15. de fra-
ctura rotule genu ait, nisi quod cum stuppis em-
plastrum de farina volatili apponere iubet, de-
super plagella ligata ex corio ad rotunditatem

rotule, de quinto in quintum diem petuntan-
do. Tibia (inquit Guido) frangitur secundum duo
focilia, quandoque vnum. Si in maiori: tunc
declinat ad posteriora; in minori vero ad ante-
riora. Et fractura focili maioris est deterior mi-
nore, quando maior sustinere potest tibiam:
quando autem frangitur ambu, pessimum ha-
betur. Albucaſis & Haly abbas iubent ut fractu-
ra tibie regatur, quemadmodum brachii fractu-
ra, nisi quod præcipiunt situm eius inter duas
tabulas secundum lōgitudinem totius tibie, aut
ineuabulo: quod & ego (inquit Guido) facio: &
quando est necesse, eadem ingenia dicta de co-
xa adhibeo, eadem fere & Theodoricus: Guil-
helmus de Saliceto lib. 3. cap. 14. de fractura fosi-
lium cruris hunc sermonem paulo amplius pro-
ducit: quem & ipse perlegere poteris. os calcanei
nō frangitur, ut dictum est, quia durum est, &
propterea à ligamento: eius tamen curationem
(quod alii chirurgi Neoterici non faciunt) po-
nit Guilielmus de Saliceto lib. 3. cap. 15. Iohan-
nes de Vigo lib. 6. cap. 16. de fractura pedis & os
calcanei, & digitorum eius, os calcanei frangi vult:
sed vbi frangatur, quod valde difficultes resan-
tetur. Rascera quoque pedis raro frangitur (in-
quit Guido) & quando frangitur difficilis est cu-
rationis: quod & Auicenna antea quoque di-
xerat, cum mala producat symptomata. Albu-
caſis hanc fracturam, ponendo pedem supra
tetram, restituit: & calcando cum pede tuo em-
plastrat, & ligatur cum hastella seu ferula la-
ta secundum ventrem & pedis solem, & com-
pleantur concavitates, ut de manu dictum fuit.
At Theodoricus lib. 2. cap. 41. de fractura tali &
digitorum pedis. Talus (inquit) frangitur & eius
fractura est praua, & cura difficilis: & forsitan
accidit cum eo artitio ulis, & curas sangui-
nis, & coagulatio eis, & quandoque perdoi-
cit ad febrem, & mentis alienationem, tremo-
rem, & spasmus pedis. Sic quidem ego no-
ui zythepſam quandam, qui cum in digito pe-
dis laboraret, vxor eius è lectu descendens, di-
gitum eius contriuit. Sed cum perpetam remedi-
is muliercularum viceretur, tandē gangrena sub-
secuta & sphacelo, totum pedem amittit. Cum er-
go accidit (inquit Theodoricus) in eo apostema con-
gelatum, quod non apparet & non egreditur, &
apparet iam tenebrositas, quæ non fuit antea, ma-
lum est signum, ad viam putrefactionis petuenisse.
Si autem aderit apostematis signum impelle-
tis manum, minus malum erit; eritque eius tu-
prio fortasse facilius. & quando talis restaura-
tur, deambulatū est dolorosa super ipsum: &
quando non restituitur vii oportet, destruitur
eius vsus. Guilielmus quoque de Saliceto lib. 3.
cap. 15. Si contingat os calcanei frangi, & cognos-
citur ex tactu rationabili medici solertis, quia i-
bi inueniuntur partes ossis sub tactu secundum
longum & latum & in modum percussoris &
enſus dolor, angustia loci aff. cū, & tumor id in-
dicant, ipse post reſtorationem decentem ap-
ponit emplastrum cōſtrictum tale: ut scilicet,

De fractura
tibiae

De calcanei
os.

De fractura
pedis.

De reſta-
ratione ca-
le. de fractura
tibiae &
tibiae
tibiae
tibiae
pedis.

De fractura
rotule
genu.

ut scilicet,

ciat. ole. bordei volatilis ana & b. tragac. gummi arab. mastic. mummia. sang. drac. aloes. rburu. ꝑ ꝑ. b. bol. arm. ter. sigill. ana ꝑ. iii. cum album. ouorum incorporentur pro emplastro molliori: & super loco restituito immediate ponatur & non pecia infusa cum oleo reser. propter causam dictam de rotula. de qua scilicet agitur eodem libr. cap. 13. super emplastr. stuppe infuse in vino oigro styptico, & expressæ imponatur, deinde fastiola ad modum calcanei; super qua & alia fastella in vino infusa, decoctæ iniecta fastialata ad quinque digitos, & firmetur locus deligatura, & fiat inunctio cum decoctio ex bolo arm. circa pedem totum usque ad medium cutis. interim reliqua vniuersalia iam sepius dicta obseruentur de sanguinis missione, ventosis, purgatione, victus ratione. io ossibus autem fractis & digitis pedum facta quoque restitutione, & in æquatione ossium istorum (vt idem dicit cap. 16. de fractura pedis & digitorum eius) siue sint cum vulnere, siue sine, requiritur ferula lignea ad figuram soleæ subtelata extendens fastiæ pedem, adiecta fastella cū filtro vel bombace, vel linamenti aut stuppe: deinde empl. const. dictum de calcaneo in ponatur, & stuppa infusa in alb. em. cum pul. consr. & de super alse infusa in vino nigro styptico, & expressæ: deinde inperimecta fastia lata per tres digitos & longa tunc circumuolutione, vt decet. Si ad sint vulnera, fiat sutura vel ligatio album. cum pul. consr. appoiito, & emplastro dicto de rasceta manus: & soluiatur omni die ratione vulneris aut ratione fracturæ. iniecta illa lignea fastella cum fiti fastella, aut bombacis, & emplastrum tale à principio vsque ad finem super locum ponatur: & tragac. mast. ches. gummi arab. mummia, aloes, sang. dracaburu. ꝑ ꝑ. ana ꝑ. b. mel. reser. sol. q. s. ad incorporationem, fastia firmatione loci, ac vulneris mundificatione, consolidetur cum pul. consr. chuo, scilicet consolidante & exiccante tali: & nnc. cyressi. galbar. mummia, sturru. cort. granat. ana ꝑ. b. nat. pul. cithiauis. Deinde pecia vel stuppa infusa in vino nigro calido vel albo expressa apponatur, nam hoc carnem solidat & humat. interim à principio vniuersalia sepius iam dicta nō omitantur. Digitorum autem pedis fractura æquatur sicut & digitorum manus, vt Haly abbas quique testatur, idem & Theodoricus lib. 4. cap. 41. de fractura tali & digitorum pedis sub sicem. Digni pedis (inquit) in fractura & dislocatione curantur sicuti digiti manus. Sed & Lanthracus de lib. 1. natat. 4. cap. 5. de fractura ad iurru, sub finem capitis de digitorum ossibus fractis in manu, dixit usque maxime cautione: ita & dig. in pedum, cum parui sint. Ceterum vt tunc humectatur de contrahis ossibus compleamur, etiam iuxta eundem cap. 7. sciendum plicatur in ossium in pueris sepe contingere, accidit enim à casu vel percussu ne quod quedam et ista tenera & subtilia, vt mand. boia ossa in aliquibus pueris, & etiam brachiorum & ceterum sine fractura ossa plicantur: ac que red. scēda si maxilla fuerit, manum seu digitos in osponas, ptemens ad

exeritior: sicut diximus in fractura ossium faciei, manum aliam teiebinchina vel piee linam suauiter ab exteriori parte preme, & citius eleua, hoc idem in ossa p: rigo. In osse veto cruris & brachi vtrius ligatura decenti ponendo ferulam fortē ex parte plicata recta: ita vt cuon stricta fuerit, valeat redificando membrum ad sua crassitie attrahere, membro ptius fomentato cum aquis decocti. ne chamomilla, malua, hyssopina, fenugrati, sem. lin. & vni. oleo aliorum aut ping. auferri, vel galina. Quin & illud præstantissimum remedium habetur & sepius expertum, vt ex parte plicata lamioam ex ebore seu osse elephantis, aut peccen, vel aliqd tale ponas: nam vt referunt, virtute illius ebore os versetur attahitur: & sic tractum recipit primam & naturalem suam formam. Et sic ad finem perduximus librum octauum Observationum & Curationum nostrarum Chirurgiarum de fracturis, anno 1570. die 18. Octobris. Iam igitur ad nonum & vltimum librum Chirurgie veniamus, de ossibus luxatis.

OBSERVATIONVM ET CURATIONVM

CHIRVRGICARVM

Liber nonus,

DE OSSIBVS LXXATIS.

OBSERVATIO I.

De coxa luxata.



OMINE Guilhelmino Sonneruel dig cognate nostre satis vetule cū coxa excidisset, variis accitis Empiricis inuocum recte reduci potuit, vnde & ipsa cū dolore & febrem incurrit, & toto cōntabuit. Eo tempore, cum fore p. vxorem I. heodotici Teylingi Delphis euoratus accesserat Alemarium, etiam eandem subinde inuisi Sed postea iterum ad Empiricos conuersa, licet diuissima cister, oesio quo tamen animi vitio sumptibus parcens (vt hic sepe fieri solent) pessime ab iis tractata, misere tandem dolorib. plurimis ac cruciatibus consumpta obiit, cum à prudentibus ac rationalib. medicis & chirurgis coactari nollet.

SCHOLIA.

Quum luxationes fracturis proximæ sint, cōlequens est vt de iis geoeratiim (quem admodum & de aliis libris superioribus, commemoratio affertur) nonne sermonem faciamus. Luxatio, vel, vt alii appellant, dislocatio, teste Auicenna (vt etiam comprobatur Guido de restitutione dislocationum cap. 4. de dislocatione in pueris) est egressio ossis ex loco suo naturali, in quo est coniunctum. nam secundum eundem, coniunctio ossium ad inoicem quadruplex est: vna ferratiua (ita enim vocant qui barbaram sectantur medicinam) vt in commissuris cranij: alii infixiua, vt in finioe dentium:

Luxatio quod, vel dislocatio, secundum Auicennam.

De fractura pedis & digitorum non.

Quid de articulis digitorum possit.

De plicatura ossium puerorum.

tum; alia cum quadam aggregatione (quam ipsi barbari *apodactum* vocant) ut in tabula seu ossibus pectoris: quarta per viam ligationis, unde & ligatione dicitur, ut pydis & vertebrae. Ac circa coniunctionem proprie accedit dislocatio: circa vero alia non, sed motio siue appetio, quae non proprie sed large dicitur dislocatio, ut etiam Theodotus refert. Et hinc dislocatio quaedam est completa, in qua ex toto exit os à sua coniunctura, quae vera dicitur *dislocatio*: quaedam est incompleta, in qua non exit totaliter, quae dicitur ab Auienna *declinatio* & *contortio*. Quaedam non exit à iunctura, sed elongatur ligamentum, quae dicitur Galeno *elongatio* huiusmodi. Iam quoque modi dislocationum quatuor existunt, nempe *anterior*, *posterior*, *interius*, & *exterior*. Alia quoque simplex, alia composita, cum fractura, vulnere, dolore, apostemate, duntaxat, à quibus differentiis volunt & sumi indicationes curandi. Ceterum insequendo vestigia Graecorum, tum aliorum, qui paulo Latinius hanc rem tractarunt, luxatio, ut formula quadam definitur, est articuli è nativo positu, seu proprio (quod dicitur) acerbulo, in alienam quae insolita sedem prolapsus, quo motus arbitrarius impeditur. Graeci *exarthra* dicunt. Huius autem (ut Paulus inquit) nullae aliae differentiae habentur, praeter eam quae maioris minorisque ratione sumitur. Quam enim articulus suis sedes in totum excussus deciderit, communi generis vocabulo Graeci *exarthra*, Latini *luxatio* dicitur. Si autem è compagibus suis paululum duntaxat amotus est, aut vique ad sinus seu cauitatis supercilium (*synnodi marginem* vocant) prolapsus, nobis luxatio Graeco verbo consuetudine *pararthra* nominatur. Sic etiam Feenlius: *Luxatio* dicitur, quod vel prolapsus, vel quocum modo à sede sua mouetur. Id si perfecerit, & articulus per vias excidit, assidue caput è sinu suo promouetur, prout hoc Graeci *Ekstrophos* vocant: si vero ab ipse paulum recedat, eaque inter se detrahantur, atque ducuntur, *trastrophos* appellant. Ceterum sub pararthra & luxationem, seu ut vulgares chirurgi, Auiennae interpretem sequuti, loquuntur, elongatione ligamentum comprehendimus; sicuti & distoriones ac peruersiones cum pluribus ossibus, tum vero maxime spinæ & vertebrae familiares. Ossis duobus modis potissimum suis sedibus Celso mouentur. Nam modo quae innecta sunt inter se duntaxat (inter his 3. cap. n.) dehiscunt (ut quum lauum scapulae tum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito & in crure tibia à fura, atque eorum interdum à saltu, calcis os à talo, quod raro tamen fit) modo vero suis acerbulis & toto prolapsunt, hoc est, suis omnino sedibus excidunt. Vertebrae namque & articuli propemodum omnes, ramet si valde nervis & ligamentis comprehendantur, saepius tamen suis sedibus elapsi decidunt, aut vi scilicet expulsi, aut aliquo casu neuici legemētis vel ruptis, vel infirmatis, faciliusque in pueris & adulescentibus, quam in robustioribus. Itaque modus hic *arthra*; prior vero, quo tantum

ossa dehiscunt, & suis ex toto sinibus haudquaquam prolapsunt, *pararthra* non immerito appellabitur. Atque haec sunt luxationum discrimina seu differentiae. P. atque has tamē aliquot adhuc (ut paulo ante diximus) alias posteriores etatis chirurgi statuantur, quae reuera differentiae non sunt, sed potius quaedam veluti praeter naturam dispositiones, cum luxatione complicatae: ut cum ipsi luxationi accide infirmatio, aut fractura, aut vulnus, aut dolor aliquis ingens, aut tophacca quaedam diuturne. Haec enim dolor inquam, fractura, diuturne, vulnus, inflammatio, cum fecerit & per se subsistere possint, nullius inquam alicuius (si saltem Galeno credamus) differentiam confluunt. Si quis tamen proterve contendat, differentias esse, cum eo certamen inire recusamus: quandoquidem haec cutandae luxationis rationem & peruerit, & non parum aliquando interturbant. Ac de his quidem in sequentibus suo loco dicemus. Ceterum modis quatuor potissimum, quod ad sinus differentias attinet, contingit ossa luxari aut peruerit, seu aliquatenus detorqueri: in partem namque priorē seu anteriore, posteriorem, interiorem & exteriorem. Alii superiorem & inferiorem adlunet: quaedam autem in omnes quatuor partes quaedam in certas promouentur. Sed de singulis, in propriis locis dicemus. Causa autem luxationum de sinus & à sua sede motorum, quaedam sunt extrinsecus ingruentes, ut casus, percussio & violenta atque incongrua membri alicuius extensio, aut distortio, aut peruersio. Quaedam vero intrinsecus eneniunt: atque ideo internae dicuntur, sicuti & superiores externae: ut cum mucosus aliquis humor & pituitosus, in articulis seu iuncturis accernatur, qui articulationis ipsius ligamenta primum mallefacit, deinde laxa reddit, & tandem ob eius multitudinem, sua sede os ipsum protrudit. Luxati autem omnis articuli hoc indicium est, quod quaparte os profilit, articulus extenderat, aduersa à qua recessit sinus habet tunc membris figura peruertitur, neque recta manet, membrum aegre in eam partem flectitur in quam os excessit, in aduersum perficiale. Et haec quidem luxatis omnibus sunt communia: sunt & alia propria, de quibus postea. At de communibus hic tantum agimus. Haec autem factionis Atabie principii Auiennae, à tribus potissimum designantur. Nempe vel à subito malitiae (ut loquuntur) inhaerentibus, hoc est, ab iis quae secundum essentiam rationem insunt: ut à maiori partis ipsius laborantis constitutione, seu compositione, in qua & humor praeternaturalis ea parte quae os protrudit, & sinus seu cauitas inolita ea à qua recessit, manifeste apparent. Vel ab iis, quae ex necessitate consequuntur (*causae & accidentia* vocant) ut à dolore qui ex luxatione contrahitur. Vel actione laesa, seu operationibus etiam ea necessitate consequentibus, ut à motus afflictis partibus difficultate, aut priuatione. Haec itaque uox in luxatis omnibus deprehenduntur; aliae vero in singulis. Consequens est, ut communia quaedam

Affectus in luxatione complicati.

Modi luxationum.

Causa externa.

Causa interna.

Signa.

Signa luxationum extrinsecorum.

iam quoque de luxationibus iudicia, seu crifes, quæ & prognostica vocant, hoc loco subiciamus. Primum prognosticum, ex Auicenna & aliorum quorundam scripta entum, ad hunc modum se habet. *Quibus luxationibus inflammatio, aut*

saltem, aut dolor ingens & acutus accedit, hæc præterquam quod curati admodum difficiles sunt, periculo quoque non vacant. Adde ut aliquoties in iis casibus tutum non sit luxata particula reductionem aggredi, sed si ea remanere (ut pro lesione meri sequatur) melius esse censet. Vtrobique omnes luxationes, & quæ spatio temporis iam valde obdurate sunt, vel diffinitione vel nunquam conualescunt.

Proinde statim si fieri potest, propius luxata debent. Luxatio in qua inquit Guido franguntur margines ossium, hoc est, sinu seu conuexitate super cula, pessima indicatur. Repulsi enim in sinum positi articuli, rursus dum persistere non possunt, sed lenissima quædam occasione iterum reuoluntur. Articuli qui inuicem ac ligamentorum visio prolapsi sunt, & postea in sinu sedes complerentur excidunt. In diuini cuiusvis ossis in suam naturalem sedem reduci est, cum veluti strepitum aliquis audiret, dum in naturam suam acetabulum ingrederetur. & meris nuper luxati figura & conformatio sine ipsius aut alterius partis figura, quam simulata tum visum tum tactu deprehenditur. Cæterum si reperto ossis nervi dispendium rursus id protinus (ut consuevit Celus) expellendum est. Ut excidere ossi articuli non possunt: sic non omnes reponuntur. Caput os uisum, si in partem posterioiorem aliquando prolapsus, nunquam in suam sinu compellitur, sed mortem statim adfert inuitabilem. Sic neq. in sinu vertebra cum toto loco mutata sunt: neq. etiam maxilla, quæ utraq. parte prolapsa est, & antequam reposita sit, inflammationem excitat, ut Celus memoria prodidit. Ossa quæ sinu sedes, mouentur, alia alia facilius, alia difficilius & excidunt & reponuntur: nempe pro ratione & natura inuolue & vnde propelluntur. Itaq. genui vt facile prolapsus, sic non magno impendio in suam rursus sedem compellitur. Dignotum luxatio nullum etiâ facillit negotiis.

Cubitus vero vt tardius quidæ & difficilis excidit, ita prolapsus negotii plurimum exhibet, ægetti me. n. propter tuberculum seu eminentiarum sinuumq. frequentiam reponitur. Humerus asit vt neq. difficultat admodum, præsertim in macilentis, elabatur, sic nec difficillime in sedem suam reponitur. Et ita de aliis. Multum quoq. eo confert (vt Celus inquit) & corporis & ætatis, hoc est, tendinum, habitus. Nam si corpus tenue ac macilentum, si humidum est, si nerui & ligamenta infirma, expeditius ostereponitur, sed & primo facilius excidit, & postea minus fideliter cõtinetur. Quæ cõtrariis his finit, melius continetur sed id q. expulsus est, difficulter admittunt. *Quibus in pueris articuli exciderunt, neq. repositi sunt, minus quam ceteri crescent. Quæ loca suo non sunt, carnea inuoluit, magis q. in proximo membro, quam in vltiore, vt puta si humerus loco suo non est, maior in eo ipso sit, quam in brachio, & in hoc (brachii inquam) maiore quoq. q. in manus acie. Tam pro sedib. & pro cubito, qui inciderunt, aut maior aut minor visus eius*

ipsum applicetur: deinde sustipue limes ac panni multiplices, ouorum cãdido persulfæ superacõmodentur: & postremo, si facilius posca madentib.

Interpreta

De natione

Scopus pro-

Secundus

Ex Hippo-

Celso.

Interpreta

De natione

Scopus pro-

Secundus

Ex Hippo-

Celso.

tes Hippocratis aphorismi: *Quibusvis, & contumaciter dolores molestat, excidit coxa, & rursus incidit, iis*

interpreta

De natione

Scopus pro-

Secundus

Ex Hippo-

Celso.

Interpreta

De natione

Scopus pro-

Secundus

Ex Hippo-

Celso.

Interpreta

De natione

Scopus pro-

Secundus

Ex Hippo-

Celso.

Interpreta

ribus, pro ratione particula longis laticque, subligetur. Quin etiam seculæ ex eorio aut densa papyro facta, si necessitas vocet, circumdanda sunt. Cauenda autem semper est vehemens not perfrictio, ne inflammationem moueat. Lixita rite apparetis membrum in figura ei maxime naturali, atque à dolore alienissima, ad quietem reponendum est. Nec vero ante diem septimum, aut etiam decimum, si nullum symptoma pratum accesserit, ipsum resoluere oportet, aut alius adhibitis medicamentis curare, sed d. finire. Porro nihil noxæ attuleris, si dum legitimo tempore resoluatur, & secundo curatur, aqua modice calida foueris. Hic enim foris gemina tunc ratione p. odest. Nam & dolorem (si qui sit) demulcet, & quod in laborante particula uoxum conceptum est, digerit. At hæc tamen in primo apparatu, si fuerit recens, ne quamquam cōuenit, quia merus esset de apostemate, ut & Auicenna de pannis calidis dicit. Vbi autem sic (ut res exigit) luxatum membrum foueris, mox huic emplastrum adhibebis quod consistit polline, id est, farina volatili, puluere rubro communiter appellato, & albo uui, in vnum corpus redactis. Post hæc vero membrum strictius obligandum erit, ut Rhazes medicus Arabi percelebris consilii. Ad eundem quoque modum, vetus omnis luxatio, & que ipso temporis callo iam obdurauit, non modo totum eiusmodi aquæ simplicis calidæ (qui in hac re plurimum effert) antequam reducat, desiderat: sed etiam cum qui fixæ decocto malæ, albiæ, ferugis, atque id genus aliorum pulsulari: & inungatur cum diathese, Scumponatur emplastrum diachylon magist, si ibi sit durities quo minus restitui possit, aut cum lana succida infusa in mucilaginisbus aut corticibus bisinalæ coctis aut pistis & axungia impinguatis, & ita loco molliore reddito, reponatur & sanetur, quippe hæc molliunt, laxant, discutunt, & membrum aptius extensiuum efficiunt. Recentes vero adhuc luxationes, & quæ nuper inciderunt, eius naturæ foci tamquam sibi non parum incommoantes, tum teli quæ emollientissimæ dictæ, aueriantur & respuant. Hæc enim calcificando ac humectando relaxant & dissolunt: unde pars ipsa afflicta imbecillior redditur, & ad recipiendam fluxionem propior. Proinde & inflammationi opportuna efficitur, & luxati sinus superflua humiditate oppletur. Inde consequitur, ut articulus in nativo suo acetabulo diu persistere non possit, sed lubricus ac subterfugiens delabatur, & ideo quoque Auicennas (ut iam paulo ante diximus) vetat pannos impenso calidos membro teocenter luxato admoveat, ne fluxionem etiam euocent, & inflammationem eo loci excitent. Quin potius cerata refrigeratoria, aut pannos vino aliquo imbutos adhibere conuenit. Cæterum luxato, ita ut dictum est, in suam sedem deducto, firmari quoque, & ad quietem conuenienti schemate seu figura reposito, ipsam à dolore & inflammatione vindicandum est, qui tertius est scopus in curandis luxationibus medendi propositus. Hunc igitur si consequi

studueris, humorum in partem affectam influxum modis omnibus prohibeto. Si enim fluxione teneatur, & dolor ei statim per sentiscet, scilicet inflammationem experietur. Quæ duo in eummoda in luxatis & fractis maxime vitanda sunt. Hæc autem euitabis si quæ toborent & repellunt, parit luxatæ, ut paulo ante diximus, adposueris: id præterea teneam ab initio probanque victus rationem ægro imperaueris, illique venam, si nihil prohibeat, iuxta periti alicuius n. edici præscriptum secueris, & ventrem si prius est, purgante medicamento subdlexeris. Vtrique enim auxilii genere (purgatione, inquam, & sanguine misione) fluxionem (si commode adhibetur) a laborante particula auertimus. Sed & in fine iubet Guido ut membrum toboretur embrocha aquæ detest. reser. absinthii & visci querc. & similem ponendo & fluradrapum, ut vucant, excipiemus, ita reducendo membrum suauiter ad pristinas suas actiones. Verum enimvero si ante quam ad curationem voceris, luxata pars iam dolore infestetur, aut inflammatione occupetur, non prius eam in locum suum à quo excidit repouere tentabis, quam dolor finitus fuerit, & inflammatione conquieuerit. Si enim membrum sic dolore aut inflammatione affectum distendendo lacessueris, periculum est, ne consualio, vel neruorum distensio, aut aliud præturum id genus symptoma suscitetur. Hoc præceptum in luxatis omnibus diligenter, curioseque obseruandū: à Cornelio Celso ex Hippocratis sententia non minus doctæ quam eleganter in verbis traditū est: Quicquid lace suo (inquit) motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illam occupauit, domi conquiescat, haudquaquam lacessendum est. Vbi finita est, iterandum est in ibi membrum quæ id patitur. Oportet autem inflammationem ipsam atque dolorem leuare succida lana ex hydreleo, id est, aqua & oleo moderate calida, ac terque momento superimposita. Si vero etiam febris accesserit, & ossa quæ suo loco mota sunt, validis plentis, musculis & tendinibus contineantur, cunctius omnia facienda sunt: sed maxime quæ ad victus rationem, venæ sectionem & purgationem attinent. Cæterum sedato dolore, & finita omnino inflammatione, plenior victu (sicut de fracturis dictum est) laborans restitui poterit: cibi que vi bonis, & vino modice. Ac sub finem curationis, si de sententia res cesserit, perussione illa Guidonis superscripta tum oxycroco appposito utemur. Sed iam ad usus quoque suos, id membrum sensum, ac suauiter promouere oportet. Motus enim, ut in dolore atque inflammatione noxius, ac (ut ita dicam) pestifer, sic alius, luxato præsertim iam obfirmato, saluberrimus corpori est. Si luxatis ossibus vulnus quoque accesserit, multa diligentia ac etiam prudentia esse opus. Dumenim hæc reponuntur, ingens periculum, nonnunquam & mortem etiam maturam inferunt. Nam cum ex distensione adiacentes nerui & musculi inflammantur, dolores validi, consualio, & si fibres acque obortitur, atque hoc præsertim in cubiti gibero,

Quartus
scopus, qui
est acciden-
tium curra-
tio.

Lib. II. c. vi.

Latus hic
corruptus
est apud
Celsum,
quem ita
respon-
det Lagardus

Luxatio
cum vul-
nere.

Tertius
scopus.

beto, gena, superioribusque articulis etiam magis. Quanto enim principalibus membris, luxati cum vulnere articuli, viciniore sunt, tanto maior timor est. Sed eo quoque grauius periculum concurrit, quo maius membrum est. quove validioribus nervis, aut musculis continetur. Ideoque humeris femoribusque metus mortis est. Ac si teposita ossa sunt, spes (siquis Celsus) nulla est. Non tepositis tamen, nonnullum periculum est. Eoque maior in viroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Eam ob rem Hippocrates horum tepositionem, valentiorumque deligaturam omnino aufferat, solisque inflammationem abigentibus & mingantibus praesidiis, per initia vituget. Sic enim (inquit) ipsis superetelle licebit. Itaque nihil tuto reponi posse praeter digitos, & plantas & manus dixit: atque in his quoque diligenter esse agendum, ne praecipitent. Verum ne digitus quidem, in quo minimum vt malum sit etiam periculum est, reponi debet, nisi ante inflammationem, aut postea, cum iam vetis res est. Ceterum quod ipse in foliis digitis faciendum consulit, id nos in reliquis quoque articulis facere aggrediemur: ac statim quidem inter initia dum pars adhuc inflammatione vaeat, prolapsam cum vulnere articulum medio cuncti intentione (validum enim citra periculum perferre non potest) reponete tentabimus: Ita & Albugenis (vt & Guido annotauit) inquit, si fuerit eum vulnere, primo teducatur dislocatio, post curetur vulnus, & snatur, si est necessitas: & quando faciet sanum, relinquatur ei fortamen ad expurgandum. Quod si tamen iuxta animi institutum euenerit, in sola ratione, quae inflammationem arceat persistemus. Si vero inflammatio aliqua aut conuulsiō, aut quidpiam ex supradictis, teposito osse acciderit, rursus id (si modo sine vlla vi potest) suoloco protinus expellendum est. At si hoc quoque discamen, seu periculum metuamus (non enim inflammatus articulus sine vi fortasse cedit, & sua sede iterum propellatur) satis fuerit per initia in maioribus quidem membris, vt femoribus, humeris, super sedere, & tepositionem differre. Vbi vero inflammatio conqueuerit (id autem si communiter post septimum nonnumquam diem) praefati etiam periculum apud necessarios aegrotantis, quod ex tepositione futurum sit, tum quod si non teponatur, debilem ea parte hominem & claudum mancumve potius fore, conabimur tuto, & sine vlla violentia, os in suam sedem compellere. Porro vltoris curatione eandem quae proposita est in fracturis cum vulnere, administrabimus. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco mortuum, neque tepositum est, sic (si Celsus & Hippocrates credimus) iacere conuenit, vt maxime cubante in iuuat: tantum ne moueatur, nec dependeat. Si luxatio cum fractura, sine vlcere tamen, euenerit, communi ratione membrum extendendum est: ac manibus conformandum, vt in sumphibis fracturis, superiore libro diximus. Si veto etiam vlus accedit, rursus ab us quae de fracturis cum vlcere seu vulnere, & luxationibus etiam cum

exulceratione incidentibus primum à nobis dicta sunt, congrua tepetenda curatio est. Ceterum, vt verbo vno dicamus, si cum fractura luxatio ineat, haec primum, si fieri possit, illa veto secundo curanda erit. At si ante fracturam administratio luxationis commodè reduci non possit, fracturam ipsam primum curabimus, deinde cum fractura callo iam obfirmata fuerit, luxationis curationem aggrediemur. Quod si luxatio inuenerit (vt etiam paulo ante diximus) & ob temporis spatium callosa inibi durities contraxa fuerit, ea decocto malua & althaeae (quam officinae bisulnam appellant) perfundenda est, deinde vnguento dialthaeae vulgo nuncupato, colluenda: post haec emplastrum quod dialthaeae magnū nominatur, superapponendum erit: vel eius loco, lana succida viscidagine quapiam emolliente delibata. Ad hoc etiam efficax habetur (vt diximus) cortex radicis maluanis, hoc est, althaeae, in aqua decoctus, & cum axungia vel anserina pinguedine subactus, vt quasi malagmatis lentor contrahatur. Itaque hoc loco sub his sufficienter emollito, luxatum in suam sedem dandum est. Quod si post curationem motus difficilis aut nullus remanserit, tunc curanda, vt de arthritide tum de iuncturarum affectibus alias diximus. Reliqua & apud Guidonem sexto de arthritide Sciuncturarum affectibus, & in eius Anecdotoario reperire poteris.

Si manifeste ea quae ob callosam indurata luxationem non possunt, quid agendum.

OBSERVATIO II.

De maxilla inferiore seu mandibula luxata.

Eu Teylingia, cognata nostra, cum oscitando os suum aperiret, postea id elaudere non potuit. Luditum quidem primo hoc alius videtur spectaculum; ipsi tamen cognatae nostrae valde molestum. At chirurgus accitus, eum metum manu velociter percuteret, eam ab hoc accidente libetauit. Quemadmodum & Sotorcula quendam ad D. Agatham ab eodem curata fuit.

Puella quae ad pilas agebat (de qua scribit Amatus Cenensis. 6. Caput. 70.) & male habebat, post multum vomitum, & crebram corporis tum animiturbationem, cum oscitare, repente inferior mandibula luxata est: nimia autem humiditate luxata particula ex cancello mandibulae exiuit, unde os apertum inuita permansit, non sine ingenti panis illius dolore, & animi deliquio. Ad quam accedens, post elapsum tertium diem, diligens chiturgus, puellae ad pedes suos incurtata mandibulam foras, pollice dextro intra os misso, altera manum mentum fortiter apprehendente, itahebatur, ac sic facile mandibulam ipsam ad locum suum teducit, non sine medioctri artis gloria. Praecessit autem iam fomentum ligamenta laxans, veluti post mandibulam iam teductam, ligans & constringens medicamentum, vt agendum docet Paulus Aegineta lib. 6. & Auenenna Fem. 3. lib. 4. cap. 7.

SCHOLIA.

Superior quidem mandibula seu maxilla tum immobilis, & fixa, vt poce pars cranii, sit (teste

Paulo

Lib. de luxationibus
fracturibus
ne ossium
conspiciatur.

Si luxatio
cum fractura
non mouetur

Paulo lib. 6. cap. 112.) luxatione non periculatur. Inferior autem, quæ proprie *mandibula* vocari solet, toto loco non mouetur aut luxatur, quippe cum capita ipsius superiori maxillæ firmiter ac tuto inniusta sint; modicum veto peruerſione, quam *pararthrem* vocauimus, subinde experitur, quod ob mufculos, qui ipsam continent, ex continuo mandendi luquendique exercitio in mollitiem elanguescens, qualibet de causâ facile luxatur (*quod apud Hippocratem etiam sepius legitur*) in quibus sine aliqua difficultate articulus sponte in proprium locum reuertitur. Sola autem mandibula superior (*ut dicit Lanfrancus dist. 2. cap. 2. de dislocatione mandibulae*) in crocodilo solo mouetur. Ceterum mandibula (*ut etiam Guido de restoratione dislocatarum dicitur*) quandoque mollicatur, modo spasmat, modo dislocatur. Ceterum, teste *Paulo ex verbis Hippocratis*, excidit quidem maxilla raro, luxatur aut subinde oris lauta, quæ modo etiam alij plures mufculorum mutationes neruorumque, id efficiunt. Et ut *Celsus* affirmat, in priorem partem propellitur, sed modo altera parte, modo utraque. Si altera, in contrariam partem ipsa mentumque inclinatur, dentes paribus non respondent, sed sub his qui secant canini sunt. At si utraque, totum mentum in exterioriorem partem promouetur, inferioresque dentes longius quam superiores excedunt, intendente supermufculos apparent. Si itaque ad anteriora os remanet appertum, ut in hac puella contingebat, occludi non potest, sicut in paralyſi aut mollicitone. Si vero ad posteriora, tunc etiam, teste *Auicenna*, dentes inferiores subintrant superiores, & ut dicit *Lanfrancus*, os aperiri non potest, ut euenit in spafmo. ideo neque cibum mandere potest aut deglutire: hinc & sermo, ut *Brunus* addidit, amittitur, & in parte externa videtur aliqua emacientia præter solitum. Cum autem contingat fieri hanc luxationem, quam maxima oris apertio fit. Ut cum vel maximam rei alicuius molem ore excipere quispiam conatur, vel cum offuscitando quam maxime potest, os diducit, & in alteram partem os traducit: quorum primum raro contingit, secundum (*inquat Galenus*) euenit dementibus tantum potest. Sed, ut *Neotericis* addunt, præter signa scholio precedente posita vniuersalia, quando nunquam dentes superiores cum inferioribus possunt adæquari, indicatur per *Auicennam* & *Haly abbatem*, quod nisi cito reducat, indurabitur, & inferet febres, dolores & fluxum biliosum, & accidentia praua, donec in 10. die interficiat ægrum. nam & ipsam plerique etiam in tertio obotiente mortui sunt, ut & *Iulianus de Vigo* adiecit. Primo quoque tempore (*inquat Celsus*) homo in sedili collocandus est, sic ut minister ad posteriore parte caput eius contineat: vel sic, ut iuxta parietem si sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorte puluino duro, eoque caput per ministrum virgetur, quo sit immobilis. Tum medici digiti pollices lintheolis vel fasciis, ne dilabantur, inuoluti in os eius coniiciendi: ceteri extrinsecus ad mouen-

di sunt. Vbi vehementer maxilla apprehensa est, si vna parte procidit, concutendum mentum, & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic, ut omnia penè vno momento fiant. Si in utraque parte prolapsa est, eadem omnia facienda, sed æqualiter terro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum & ceruicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mitigandus est. Cum omnibus veto quorum ossa mota sunt, primo liquidioribus cibis conueniat, tum his præcipue; adeo ut sermo quoque frequenti motu oris per neruos lædatur. At *Paulus* fere eodem modo ex Hippocrate facit: sed ubi ingressum repugnet, ex hydrelæo calido per spongiam super luxatam genam fouet, ne symptomata supra enumerata accidant. ita & *Neoterici*, ut *Guido*: Si ad posteriorem, caput minister teneat, deinde intrinsecus resaurator pollicem suum in os. & alios digitos sub mandibula, vel cuneum ex ligno, si non potest imponere digitos: & tunc trahendo foris mandibulam, inuoluit sub auribus os in locum suum. Si ad anteriorem, *Guilhelmus* & *Lanfrancus* ponunt habere nam seu fasciam sortem sub mento, quæ ipsum rotum comprehendat; & tunc minister, quando tu posueris cu neum infra os magis retro in quantum potueris, trahat foris caput habentem seu fasciam per partem posteriorem, tenendo genua super ægri humeros, ægro supine decumbente, ut docet *La merius*: & ita Dei auxilio restitabitur. Post restorationem ponantur emplastra constructa iam sæpius dicta de fracturis, & panni consueti, & ligetur ligatura conuenienti dicta in fractura, & remouetur de quarto in quantum. *Guilhelmus* dicit si fas si per vnum diem ita maneat, quia ea die liberabitur, si debita fas si resaurato; vel usque ad secundum vel tertium diem interim iis obsequiatur quæ de phlebotomia, ventosis, purgatione & victus ratione diximus. aut loco emplastri ponatur faldelle stupæe decenter coccinnata, infusa prius in aqua vel vino nigro styptico, & expresse, deinde inuolutæ in albamine oui conuassato, & mixto cum pul. constructus: dein locus diligenter ligetur & bene regatur. Nam, ut etiam *Guido* admonet, ad 13. diem firmari solet. Si autem diu steterit dislocata, & dura euaserit, balneetur & emollatur cum aqua calida, & oleo, & albis conuenientibus (*ut dictum est*) & reducat. Et si symptomata praua occurrant, succutendum eis secundum quod dolores insistent, radèdu caput, & inungendo ipsum pone aures & per collum & loca sub axillis oleo rosæo calido. ideo dicebat & *Lanfrancus* *trakt. 4. cap. 2. de mandibule dislocatione* sub finem capitis: Si vero non fuisse accitum à principio, & locum iam est inflammatum, & iam febris superuenierit, tum dolor capitis; caput rade, & robora inungende cum oleo rosæo calido, & pauco aceto; & locum inunge oleo antiquo emolliente, aut adipe anari vel galina; & quantum possibile tili sedâ apostema, & febrem curato; & caput raso habetur, ne superueniat phrenitis tu remotis demum accidentibus, deinde, ut supra dictum est;

Signa.

Purgasti-

Reductio.

Curatio.

L. lib. 8. cap.
17. de capite
lunato.

Item est, ad curationem accedito. Cæterum vt ad re-
liquam curationem particularem osium luxa-
torum veniamus: caput (*vt ait Celsus*) duobus
processibus in duos sinus summæ vertebræ de-
missis, super ceruicem contineri in prima parte
proposui. Hi processus interdum in posteriorem
partem excidunt; quo fit vt necius sub occipito
extendatur, necium pectori agglutinetur, ne-
que bibere is, neque loqui possit, interdum sine
voluntate semen emittit. Quibus celestime
mors superuenit. Ponendum autem hoc esse cre-
didi; non quo curatio eius rei villa sit, sed vt hæc
res iudicii cognosceretur, & non putarent sibi
medicum defuisse, si qui licet aliquem perdidis-
sent. Idem casus manet eos, quorum in spina
vertebræ exciderunt, quod sequenti exemplo
manifestius enadet.

OBSERVATIO III.

*De vertebra spina luxata & fracta, unde mori
substantia subsequuta est.*

VERTEBRÆ in spina (*inquat Celsus lib. 2. cap. 12. de
spina luxata*) & in posteriorem partem & in
priorem, tam supra sepeum transtulerunt, quam
infra subinde pervertuntur, ac nonnumquam ex
toto prolabantur. Sed cum toto loco mutæ
sunt, nulla restitutionis spes relinquitur; præci-
pitæque etiam mortem inferunt. Nam intra
triduum (*vt & idem Celsus ait*) homo moritur:
quemadmodum euenit illi qui ex altissima do-
mo Delphi cecidit. Si autem in utramque par-
tem exciderit, à posteriore parte vel tumor, vel si-
nus oritur. Si super septum id incidit, manus re-
soluuntur, vomitus aut distensio netuorum inse-
quitur, spiritus difficulter mouetur, dolor vrget,
& aures obtusæ sunt. Si sub septo, femora resolu-
untur, vrina supprimitur, interdum etiam sine
voluntate prorumpit; vt illi qui ex domo Iohan-
nis Petri Lombardi prope templum antiquum
Delphi ceciderat. Ex eiusmodi casibus vt tardius
quam ex capitis, sic tamen intra triduum ho-
mo moritur. Nam quod Hippocrates dixit, *verte-
bræ in exteriorum partem prolapsa, primum hominem
collocandum esse, & extendendum, tum calce aliquem
super ipsum debere consistere, atque eam sic intro impel-
lere*, id de his accipiendum est quæ paulum ex-
cesserunt, non de his quæ toto loco mutæ
sunt. Nonnumquam enim netuorum imbecillitas
efficit vt quamuis non exciderit vertebra,
paulum tamen in priorem partem promineat.
Id non iugulare potest; ab exteriori si propulsum
est, plerumque iterum tedit; nisi (*quod admodum
rarium est*) vis netui restituta sit.

S C H O L I A.

L. lib. 8. cap.
17. de ver-
tebris sp.
ne luxatis.

VERTEBRÆ spinæ si ex toto prolabantur exci-
duntque (*vt etiam annotauit Paulus*) præcipi-
tem mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius
spinæ vel quamlibet compressionem non susti-
net, quom & solus est ipsa netuorum processus si
contundatur, hominem in periculum perducere

sufficiat. Peructionibus autem subinde afflige-
tur, nunc in priorem partem distorta, quod vitium
lordosin Graeci appellant; nunc in postero-
tem, & *cyphosin* à loco gibbato vocant; interim
vero in latera, quod *scoliofin* nuncupant. Quom
igitur multæ simul vertebræ in acutissimum per-
uersæ fuerint, plurimum simul peruersio apparet,
iuxta circulare fluxus rotunditatem facta; ac
putant nonnulli decepti, ab vna vertebra ampli-
ter peruersa id fieri. Nam magna distortio non
angulo similis hunc spinæ flexum molitur, quan-
do etiam magis periculum subsequitur. Si igitur
interosum spina est peruersa, restitutionis spes
nulla est, eo quod per ventrem interius positio
fieri nequeat. qui enim in scala sic affectos inten-
dunt, aut cucurbitas admovent, aut sternura-
menta aut tussim aut status excitant, quid tan-
dem promouere putati sint, Hippocrates abun-
de coarguit. Quoniam vero subinde cuiusdam
osculi spinæ tractatio, cauum locum ostendit,
quemadmodum in capite de fracturis compre-
hensum est, aliqui vitium *lordosin* esse creden-
dum, deinde hoc celeriter perueniunt (*promptem
calce format*) *lordosin* cura tu facilem pronunti-
antur, etsi nullam curationem admittat, aut cer-
te difficulter. Hic etenim vrina supprimitur, al-
uius non responderet, corpus in horret, postea et-
iam sine voluntate excrementa prorumpunt.
Hæc autem eueniunt netuis & musculis confor-
ti lege laesissimas celestie agri moriuntur; præ-
sertim si superiores & ceruicis vertebræ affectum
fuerint expertæ. Cui vero iam inde à paruo
potissimum vertebræ gibbatæ prouerberant, vitium
longum esse, neque celeriter mortem sed
morbum accertire, & insanabile, Hippocrates
prodit. At quibus recens hic gibber ex causa
prouenerit, machinæ quidem per scalam & re-
ctam agri suspensionem ac vreri inflationem ad-
hibere, ridicula, sunt: sola autem Hippocratis
adaptatio sufficit. Conuenit enim, *inquit*, li-
gnum magnum, quod tantam longitudinem ac
largitudinem habeat, vt hominem excipiat, aut
scamnum huic æquale, prope parietem depone-
re, ac iuxta hunc ita extendere, vt in longitudine
pede non amplius absit, & vestimenta quædam
super ipsum explicare, ne hominis corpus infringatur
(*vt autem hu locum antiquam super lignum
scamnum infideat*) deinde loco pectus ipsius his
circumdatum, per alas iuxta dorsum vincire,
iuncta lori ligno oblongo pistillo simili deligare,
atque hoc super paulmentum, iuxta ligni aut
scamni subiecti extremum constitutere, &
ministro post agri caput statui ex superiore
parte continendum tradere, vt imo quidem
extremo contrahit, altiore supra caput tracto, o-
portuna fiat intentio: altero autem lori pedes
simul & superiores malleolorum partes deligant-
& rursum alio, ea quæ inter coxas & lumbos
habentur, commissa huius inibi facta, iterum
fasciarum extrema coniungamus: alii autem li-
gneo pistillo respondente similiter prædicto illi-
gantes, statuemus in ligni aut scamni extremo
pedes

*Lordosin
Cyphosin
Scoliofin.*

*Restaura-
tio ex Hippo-
crate.*

pedes spectanti pistrillum iuxta prioris similitudinem; deinde famulus iubebitur ut per ligna retractationem in duersa moliantur. Quodam vero a fellis dictis hanc efficiunt. sunt autem hi axes, qui contra rectum lignum vertuntur: utroque huius magni ligni, aut scammii latere iuxta extrema ad pedes caputque sua lora defiguntur. Quum autem sic intentio ipsa administratur, manus palma gibberum constringemus: si anrem vsus postulat, etiam super ipsum insiddebimus, nullum veniti periculum. At si ne sic quidem spina inflatur, & aget pressione ferat, vile est patientem adiacentem in longum canalis modo exsculpere è regione gibberi, ut sculptura cubiti longirudinem habeat, neque alioris sit ægotantis spina, neque multo humilior: imò sculpturam esse oportet. Huius enim causa etiam lignum ab initio prope parietem poni malimus: deinde assersis medicis alterum finem ad ima conprimemus, donec sensibilibus spina dirigatur. Verum *ut inquit Hippocrates*, sola intentio citra assertum, rursusque per assertum sola curatio, id quod requiritur post efficere. Quod si hoc verum est, non alienum etiam in lordosis & scoliosis per initia intentionem prædictam, sine constrictione videlicet, moliri, post adaptationem, lamina lignea, quæ latitudine tres digitos æquet, longitudine gibbero respondeat, & aliquam ex sanis vertebis comprehendat, lato lineo aut stuppa propter duritiem inuoluta, vertebis ipsis imponi & convenienter deligari debet. Victus adhibebitur tenuis. At si post hæc quedam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus mollientibusque remediis cum lamina appressu, per diu vitandum est. aliqui verò plumbæam laminam vsurpant. Ceterum iuxta chirurgos neotericos bulus temporis, spondyli colli & dorsi quandoque dislocantur complete, & quandoque incomplete; modo extra, modo inierius; modo ad latera: modo in spondylibus superioribus, & colli quodam, tunc sequitur angina præfocans, ita ut tunc subito sepe moriatur æger, ut *Galenus de loc. aff. notat*. Si in pectoris (ut & *Haly abbatum Iohannes de Pige lib. 6. cap. 3.* etiam censuit) spondylibus, musculi pectoris læduntur, & pulmo destituitur motu proprio, & anhelitus frequens parvus, deinde mors sequitur: & si in mediis fiant, facit gibbositatem: vel sunt in inferioribus. Ex his quoque & signa facile innotescent, cum ad oculum & tactum appareant, etiam prognostica: nam omnis spondylium dislocatio est periculosa & suspecta, etiam in ipsa reductione, ob tracham & veruos; maxime si in interiora fiat, quia non potest commode tractari: præterea si fiat in spondylibus superioribus, nocet transglutitionis: si in mediis, respirationi: si in inferioribus, egestionis, tum vitæ. ideo si vitæ in totum retineatur, aut egestio, vel præter modum hæc erumpant (*ipse Haly abbat*) pessimum signum est. Unde & interdum sequitur ossis caudæ dislocatio, & dignoscitur per Avicennam ex difficultate plicationis genu, & difficultate conductionis & at-

tractionis calcei versus caudæ dislocatione, nec non per tristissimam loci sensationem & distortionem eius. Ceterum modus reducendi & rethificandi ad longum declaratur apud Albucasin, Haly abbatem & Avicennam. Summatim tamen in dislocatione spondylium colli trahatur caput caute cum manibus aut vinculo vel habena, vel fascia, ut dicitur *Iamurium*, cuneo interposito inter dentes, per mentum aurares ad partem humeri, & cum pedibus impellatur inferius, & eminentia comprimatur, & in aliis corpus extendatur. Et cum omni ingenio ab utraque parte trahatur, vel cum fasciis, vel columma, & cauilis, & consimilibus, & eminentia cum manibus aut pedibus, aut cum tabula supposito comprimatur. modus autem firmandi & confortandi & remolliendi, ut in aliis exerceatur, nisi quod fetulae adhibeantur, & deluper iacet, ut compri-matur, & remutetur de quinto in quintum diem, quia in diebus viginti firmatur. Hinc spectant & quæ de gibbo diximus. & ideo ea quæ chirurgi iuniores de gibbo scripserunt, huc transferenda erunt. Quod ad ossis caudæ restorationem attinet, ponatur æger in lecto, & restitutor imponatur in dextram in anum, prius *eleusof* illinitum: deinde forti elevatione conuectur os sursum ad suum locum ducere, altera manu exterioriorem partem ossis componendo, & facta restoratione particularum iam supradictarum, statim locus per quatuor dies emplastris de *sarum velis*, alb. *aur.* o. *les ros.* & *myrrino confectis*, vel alio emplastro confectis, adhibitis fasciis decennibus. reliquæ de dislocatione spinæ & spondylium vide apud Guilhel-mum de Saliceto *lib. 3. cap. 19.* qui ex professo hæc præ cæteris etiam emplastris tum aliis remediis descriptis tractat. Ceterum clavicula (quam *sciti homini inter omnia animalia clavicula esse Paulus exissimant*) numquam in rotam excidit: quippe quæ pectori ita committitur, & inhereat, ut ne moveri quidem in isto possit. Simile igitur M. Petrus dicit Watuensis in rustico illo Limmenfi, cum ex alta scala cecidisset in pectus, claviculam luxatam esse dicebat. Interdum tamen ex violenta quadam percussione (ut idem Paulus testatur) extrinsecus facta, paululum auellitur: & tunc quemadmodum fractura ipsius, in restaurari debet. Pars autem quæ humero inseritur, non admodum excidit, a bicipiti musculo summoque humeri tuberculo prohibita: imò neque violenta quadam motu clavicula priuatum agitur, nisi propter sulam thoracis factam separationem. Unde homo solus inter animalia claviculam obtinet: quam si in palatram, ut venisimile est, perverti contingat, conformatione per manus dirigetur, & splenis multiplicibus accommodatis vna cum deligatur decenti eadem curatione etiam summus humerus peruersus in propriam sedem reuertitur. Est autem ossiculum carilagineum quod claviculam scapulis colligat, in relicta mortuorum cadauibus occultatum, quod loco motum, imaginem imperius exhibet, braehii caput excidisse. etenim in hoc exterior hu-

Restauratio
spondylii
caudæ.

Restauratio
ossis
caudæ.

Quæ de
restauratio-
ne disloca-
tionum
cap. 3. de
dislocatio-
ne colli &
spondylium
dors.

Signa.

Prognosti-
ca.

Difficultas
dislocatio-
nis.

Lib. 7. cap.
112. de cla-
vicula & s.
summo
humero.

meri pars

meti pars acutior apparet: concavum autem, id unde excidit, notas quibus discernitur, de humero luxato dicemus. reliqua vide apud Guilhel- mum de Saliceto lib. 9. cap. 20. de separatione fursula & ossis humeri, & Theodoricum lib. 2. cap. 46.

OBSERVATIO IV.

De humero luxato.

R Vltio admodum robusto, qui in pago (cui *Sylva nomen est*) prope Delphos habitabat, cum humerus excidisset, chirurgi nullis ingeniis, etiam ad scalam eum ponentes, reducere luxatum humerum in locum suū potuerunt, sed im- manes illi dolores intulerunt. Tandem Hugo Nicenensis medicus machinamento introduxit in sedem suam.

SCHOLIA.

Lib. 8. cap.
210. de hu-
mero luxa-
to.

B Rachii caput scapularum sinu insertum ex- cidit quidem frequenter, ut etiam Paulus an- notavit: verum neque in anteriorem partem, ut quod scapularū pectus similis impedi- at: neq; in posteriorem, propter ipsas scapulas, neque tamen in anteriorem, ob musculi bicipi- tis tendinem, ipsūq; humeri tuberculum. Sed raro quidem in anteriorem exteriorēque pro- labitur, continue vero, praesertim macilentiori- bus, ad imamque his sane facile & excidit, & rus- sus inferior multa autem carne aut pinguedine praedita contra, raro quidem elabitur, sed egre in suam sedem compellitur. Quibusdam itaque etiam non luxatis, ex ista frequenter elapsi loco membri suspicio oritur, eo quod valida inflam- matio subsequatur. Porro quibus in imam partem luxatus humerus est, hoc in modo agnosce: af- fectus humerus si cum sano conf. stat, multum differt, quum exterior eius pars unde excidit, co- caua appareat, ut in tuberculo humeri luxato di- ximus, quod acutius, quam naturaliter esse debet apparet, & brachii caput elapsū in alam mani- festius abidet, ac manus huius cubiti gibber à co- stis magis recessit; quibus quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admoverit, neque egri manū ex eis cubito ad aurem possunt reducere, neq; alium mo- um multiplicem per eā moliri. In pue- ris itaque, vel in quibus recens nec ampla facta est luxatio, etiam inodo nedi digiti flexi eminente medici manus, vel affecti sanā, si non puer sit, fre- quenter restituta est, ut sequit Hippocrat. Valentius autem hoc in modo luxata inserunt. Homo locus & suspensio humeri luxandi virtute praeditis vsus, resupinari humi debet. & pila medioctis & coria- cea, vel alia quępiam non admodum mollis, alæ accommodabitur: ac sedens medicus adversus egri, iuxta latus affectum, si quidem dexter hu- merus luxatus sit, dextri pedis calcem super ponit pilę alę suppositę, si sinister, sinistri; ac affecta ma- num prehensam ad pedes trahet, simulque cal- caneo alam in diversum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum humerum resistat; ne cor- pus circum diuellatur. Est & alia ratio immittendi, quæ humero subnato perficitur, quod Græci

ἐπιμύειν dicunt: Adolescens, aut lōgiot egrotan- te, & altius cōstēns iuxta affectum latus, egri in- didē collocati alę suum ipsius humerum subieci- et, & maius elevari ad ventrē suum attrahet, ut reliquum egri corpus posterius imo maius subli- me pendeat. At si æger levior fuerit, alius quispiā puer levis ex ipso suspenditur. Nam manū ac te- liquo corpore in contraria detractis ad ima, subie- ctus alæ humerus facile elapsū articulum repo- nit, atq; hoc etiam spatula quam Græci ὑπερον di- cunt, efficiunt. Est autem lignum oblongum, re- ctum, quod in pavimento super aliud quoddam solidū ponitur. Huius igitur summi extremū ro- tundum, q non admodum crassum, neque tamē tenue est, alæ egri aut stantis, aut sedentis, subieci- tur, iuxta totam ipsius longitudinem, ac manu per spatulam portata & detracta, reliquo autē corpore contra inferius virgente, vel sua spēre, vel alio quodam trahente, restitui fieri: quæ hoc ē in scalę gradu fieri debet, quemadmodum in cō- fracto brachio per tensionem fieri dicebam. hac autem rotundum, quoddam corpus super gradū deligatur, q egrotantis alę possit adaptari, & bra- chii caput propelleat. Porro si ubi versitatem affe- ctus, aut corporis dunt em, repositio nobis faceat negotiū, utriusq; ē ratione quæ per ambo ap- pellatam sit. Est autem ambo lignum q longitu- dinem duorum cubitorū habet, latitudinē quatuor digitorum, crassitudinem in istar digiti, alter ex- tremum rotundum, q etiam prompte alæ sinum ingreditur, spatulæ lignę extremo cōsimiliter, hoc itaque extremū paniculo circumdatur, quo lenius existat, caputū brachii iuxta alam accom- modabimus; totam vero manū ad lignū inten- sam cum eo deligabimus, iuxta brachium, cubi- tum & eius extremum. Deinde liguo obliquo in- ter duas eolumnulas rectas adaptato, vel rursus supra scalę gradum manu trahet cum ligno, ut ala p transuersum gradui accommodetur, manū in ista trahentes, siue mus in alteram partem reli- quum corpus in sublimi pendere, tunc enim arti- culus ingreditur. Vbi si sit repositus, medioctis ex lana pila, si quidem inflammationem pars non sentiat, licet; si sentiat, oleo madens alę in ista, deligabit p hanc autē & humeri & alterius alæ iuxta hiatum praesertim fasciæ deligaturus apparen- tibus, ut hiatu affectum humerum excedat, bra- chium eū costis deligare conuenit, ipsumq; cubi- ti gibberum & summam manū ex ceruice de- uincire, ne rursus de integro articulus excidat. Post septimū diem vel tardius, ubi fasciæ dissol- ueris, mediocti vii frictione praestat, eo q corpore solidiore facto, articulus ita firmetur, ut non facile prolabatur. Quod si a uicem crebro prolabor, aut he midiatu vicio, aut ob aliam quāpiam iā diu factam elabendi viā, ad vitionem veniendum est, sicut supra comprehendimus. Quum autem vel infantibus in vtero aut editis in lucē adhuc incre- scientib; particula fuerit luxata, nec dē reposita, in humero quidem carne nihil à naturali figura de- sciunt; neque enim manus quocumq; opus pet- ficere impeditur: os autē brachii breuī pmanet,

Galieno
non.

non aufcens: actales nominantur *galienones*. In femore etiam os incrementum non sentit, & totum cras contabescit: quum enim pondus corporis ferre nequeat, non exerceatur, ac in aliis membris luxatis manentibus, quæ subiciantur, omniū iniuriæ expofita fuit. Eadem fere & Celfus. Humerus (inquis) modo in alam excidit, modo in partem priorem. Si in alam delapsus est & victus cubitus recedit ab latere, rursus iuxta eiusdem partis autem cum humero potrigi non potest. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam naturaliter: difficultusque in priorem partem quam in posteriorem cubitus potrigitur. Igitur si in alam humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus, vel molle, certe & imbecillibus nervis in eum est, satis est collocare id in sedali, & ex duobus ministris alteri impare & caput latius scapularum ossis leniter reducat, alteri ut brachium exteudat: ipsum posteriorem parte residentem humerum sub ala eius cogere, simulque & latus os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. Ad vasis prodest spatula lignea iam etiam explicata tum alio modo apud Hippocratem. Ad sin priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est, fasciaque aut habena medialis circumdanda est, capitaeque eius post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri: præcipue dumque vitile habeam, hic brachium extendat. Deinde medicus capiti quidem hominis sinistra debet repelere, dextra vero cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere: faciliusque id in hoc casu, quam in priore reueritur. Repolito humero lana alae subicienda est. Si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur: si in priore parte, ut tamen commodius deligeretur. Tum fascia primum sub ala obuoluta caput eius debet comprehendere, & deinde profectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque ad eiusdem humeri caput tendere: sepiusque ad eandem rationem circumagere donec bene id teneat. Vincit hac ratione humerus, commodius continetur. Si adductus ad latus sit, ad id quoque fascia deligatur. Ne ortici hæc addunt. Auicenna trahit in inferiorem domestica vestustitillium ut plurimum, ad partem exteriorem si uellet rarius. Albuicasis vero omnes modos ponit, quod aliquando, sed raro ad peccoris partem luxatur, ad superiorem nequaquam, propter additamentum. Præter signa communia, ut est eminentia, profunditas, & canas in solis, & motus diffusus, & aliquando impositus, si cum suo pari probetur & hæc propina adiunt, ut concutiat magna in humero, & rotunditas eminenti ad modum ossi sub axilla, & manus ad caput non potest eleuari. In inferiori collocatur, & eminentia est anterior, & concavitas retro, & manus distensa retro manet in anteriori & eminentia posterior, & manus non potest a latere separari in posteriori. Sepe hic decipitur homo, propter inflationem apertamentum, aut conuersionem, ut Rhases recitat. Et id Guido euenisse narrat in filia Regis Francie suo tempore. Ex autem quæ est in eum reducitur quinque modis. Et

primus competit in lenibus, & extenditur brachium, & imponitur pugnus aut digitus, aut summas humeri tum sub axilla: deinde trahendo inclinatur, & trahatur brachium ad inferiora, ut reducatur. Secundum in robustioribus. ponatur glomus, vel glomerus filii aut funiculorum sub axilla, & trahatur superius fortiter cum mantili aut pede fortiter impingatur, inferius brachium trahendo, & reducetur. Tertius modus, posito glomero sub axilla lignum transseponatur, & eleuetur per duos ministros, & trahatur fortiter brachium ad inferiora: & reducetur. Quartus posito eleuatoque agro super sellam, glomero in amisso sub axilla, ad gradum scalæ pendeat, & remota sella sub pedibus tenendo & trahendo fortiter brachium per ministrum reducitur. Quintus sit per manubrium. Hos autem omnes modus Haly abbas, Auicenna, Brunus, & Theodoricus ponunt. Iohannes de Vigo etiam addit modum qui sit per balistam ligneam lib. 2. cap. 4. de dislocatione humeri siue capiti aduersum. Rogerius autem non ponit modum illum de pugno, de pede emipila, nisi eum qui sit cum scala: lametus autem de pila & pede. De pila vero & mantili posuerunt Gulielmus & Lanfrancus. Si autem hic non potest reduci modus, quia inueterata vel indurata sit, fiat fortis cum emollientibus, adque diutius: & tandem reducatur. Reductione facta, suppositis vniuersalibus superius dictis præter Guidonem Rogerio ut in primis diebus ob dolorem præparetur cum panno subili & stuppa infusa in albumine oui & poltea cum emplastro de farina & puluere rubro, & ligetur supposita pila ex stuppis aut panno sub axilla firmiter cum fascia lata quinque digitotum & longa duorum brachiorum, à duobus capitibus inuoluta per medium, incipiendo à pila sub axilla: deinde ambo capita voluendo, & instar crucis super humerum ad aliam axillam: & denuo crucis semper instar, super humerum idemque super pilam, totiesque voluendo quousque recte firmetur: & deinde suatur, & ubi indigebit maiori firmitudine, resiliatur. Sustineatur vero aut mantili ad collum, & remutetur de nouem in nouem diebus: aut quando inflatio quæ proveniret restrictio fuerit de pressa. Firmatur autem vixinei diebus. Postea locus leniendus cum dialthæa, aut aliquo sicut ad ago, aut emplastro. At separatim futucæ, ut ante dictum est, cum confectis dictis curatur.

OBSERVATIO. V.

Decubuit luxato.

Cum cuidam ad partem anteriorem cubitus excidisset (nam hoc luxatio, ut Rogerius testatur, frequenter est) huic chirurgus humerum cum volamano percariebat, & cum altera impellebat ad locum debitum: deinde (ut Gulielmus de Saliceto lib. 3. cap. 22. de dislocatione cubiti) perfecta restauratione immediate loco læso imposuit peciam infusam in oleo rosæ pido expressam: deinde emplastrum confectum: postea stuppas infusas in vino nigro & aqua. Facta ligatione suspdebatur ad collum versus pectus: & non soluebat

Lib. 2. cap.
22. de humi
re luxato.Guido de re
f. 12. 4. de
dislocatione
humeri &
partium ei
us. Signa.

Prognosis

Reductio
curatio.

turante quantum diem postea tertio die, ne locus tum medicamenta nimis indurarentur. Et ita pcedebat ad perfectam loci firmationem. Sed hic sciendum ex Celso, lib. 8. cap. 16. etiam cubito ossa coire, humeri, radii & cubiti. Sed cubitus quo innexus humero est, ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes fere quatuor partes excidere cubitus potest: sed si in priorem prolapsus est, extantum brachium est, neque recuratur. Si in posteriorem, brachium curvum est, neque extenditur, brevisque altero est. Interdum febrem vomitumque bilis movet. Si in anteriorem interioremne brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua oscefficit, recuratur, quicquid incidit, reponendi ratio una est. Neque in cubito tantum est, sed in omnibus quoque membris longis, quæ per articulum longa testa iunguntur. Vtrumque membrum in duæ fasces partes extendere oportet, donec spaciū inter ossa liberum sit: tum id os quod excidit, ab ea parte in quam prolapsum est, in contrarium impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout netui valent, aut ossa buccillucue federunt. ac inodo manibus solis vrendū erit, modo quædam alia adhienda. Ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis iniectis, factus est. *Deinde* rotundum aliquid à lacerti parte ponendum r si, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione brachium excedere, quæ fracto cubito superposita est, & tum ossa reponere. Reliqua curatio eadem est quæ in omnibus. Celerius tantum & sapius id resoluendum est, multoque magis aqua calida suendum, diutius ex oleo & nitro, & sale perfricandum. In cubito enim celerius, quam in vilo alio articulo, siue extra remanet, siue intus reuertitur, callus circumdatur: ilque si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

SCHOLIA.

Lib. 8. cap.
16. de cubito
& gibbero.

Quanto cubiti gibberi articulus (inquit Paulus) humero magis varius creatus est, tanto plus negotii prolapsus exhibet: & tardius quidem excidit, sed difficilior reponitur, propter tuberculorum sinuumque frequentiam. Nonnunquam igitur solum aliquatenus detorquetur, quem casum pararthema dixi, sæpe vero etiam ex toto in omnem partem prolapsus, præcipue in priorem & posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod excidit oculis & radii obiecto, ex quoque prolapsus sit, & sinu unde excidit appareat. Hæc vero potissimum sani gibberi in inspectio coarguit. Conuenit autem protinus membrum reponere proutquam in inflammatione occipitur: si quidem eam expertum, difficulter curatur. Quædam etiam nullam prorsus curationem recipiunt, maxime si in posteriorem prolapsa sint. Hæc enim luxatio omnium quæ in cubiti gibbero fiunt maxime dolorifica est, & periculosa: Quod si modice articulus innetus sit, moderata etiam intensio re-

stituitur. sic ut ministri inanem ex portetam iuxta brachium cubitumque, contineant, & in adnervia retrahant, medicus autem suæ manus palma quod excidit in suam sedem compellat. Hippocrates autem in priora luxationem subito manus inflexu instaurat: ut palma ipsius humerum iuxta rectum pulsset: In posteriora vero, subdita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, violenta potissimum extensione efficitur, quæ in posteriorem, flexu similiter vehementi. Quod si luxatio perseveret, etiam validam magis intensiorem usurpabimus: eiusmodi vero est potissimum quam Hippocrates in brachio confracto expositi, ubi columnulam adhibebat. Porro recentiorum aliqui hanc in modum adaptant: ministris duobus manum, ut dictum est, intendimus, ita ut alter sursum ad axillam contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus ægrotanti consistens, duabus palmis iuxta articulum, brachium circumdat, ac ubi iussit vel stumentum contractum in oblongam vel laram fasciam manibus ipsius simul & ægrotantis brachio circumdat, & in exteriora imaque propter summam manum retrahere ipse deinceps cum tensione constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedat. Cæterum manus prius oleo illini debet, ut lubrica fiat, & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapsus, si per trahentes manum vi prematur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modum figurata manu ex splenis & convenienti deligatura curationem petemus. Neutrici vero chirurgi hæc addunt: nam & cubiti dislocatio, teste Auenenna, modum parum, modo magna, & secundum Albucasin in omnes partes fit. & signa vltra communia dicta de eminentia & concavitate, sunt arcuatio lateralis, difficultas in motu, & applicatio impossibilis ad humerum. *Prognosis*: difficulter luxantur & reducantur, ob infiltrationem ligamentorum (ita enim se iungunt) & ossium varietatem: & superius facile raro, quia non habet diversitatem magnam; inferius ut plurimum, ob additionem recepti non transierantem. Quod ad curationem attinet, vltra duos modos, quos ponit Auenenna, in anteriori dislocatione peti utere humerum cum vola manus & cum altera impellere & eminentiam ad locum debitu: in posteriori trahere fortiter brachium, & peti utere posterius cubitum, inunctis manibus cum oleo, vehementer abstergendo, donec ingrediatur. Ponit Rogerius modum per fasciam complicaram instar pedis pastoralis: sed eam quoque Lansianus ad interiorem deducit, posteriorem vero ipse curat extensione & suspensione, aut ponendis alicuius deportatione. Guido reducit anteriorem cum genu, posteriorem, ut Auenenna docet, quo & Romanus & Boemus restauratores insignes & fortunati utebantur. quæ autem cum fascia sit instar pedis pastoralis, aut calcanei, aut genu, prodest anteriori & intendunt quando brachium trahitur, impellere rotundum adiutori ad concavitatem fossilis, à quo exiit. & subito plicari brachium versus humerum. & sunt ita.

Fascia

Guido de ro
Romanus
dislocatio
nū cap. 5. de
cubiti dislo
catione.

Fasciata instar pedis pastoralis sub eminentiâ inficitur: & dum extenditur brachium, ipsa cum pede ligata aut per aliquem ministrum ad posterius trahit, subito per magistrum ad humerum brachium plicatur. *At modum cum pede est talis:* Brachium per planum extenditur: & dum trahitur emioentia, cum calcaneo premitur, & brachium ad humerum plicatur. *Modus cum genu:* Brachium extenditur: & dum trahitur, eminentia cum genu impellitur, & brachium ad humerum plicatur. In his omnibus confect brachium duplicare, & extendere, & aliquid ponderosum subleuare, & subleuatum deportare, *vt dicit Lamerius.* De firmamento procedatur vt in aduto illo seu humeroluxato, nisi quod brachium suspensum ad collum paulatim costringatur quousque manus adhæret humero, & de quo in quatuor temutetur in iuncturam, qualibet vice eleuando & deprimendo, firmatur autem in 15. diebus. Sed & manus in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit (*istè*

Lib. 9. cap. 27. de manu luxata.

Culso) porrigi digiti non possunt: si in priorem, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem aut ad minimum digitum conuertitur. Reponi non difficillime potest. Nam super durius locum & tenentem ex altera parte intecodi manus, ex altera partem deber, *q*ue vt prona sit, si in posteriorem partem os excidit: supina, si in priorem; si in interiore & exteriori meque, in latus. Vbi satis nerui didici sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. At his quæ in priorem posterioremue partem prolapsi sunt, superimponendum durum aliquid: idque supra prominens os manu vigendum est, per quod vis adiecta facilius in suam sedem compellit. In palma quoque ossa interdum suis sedibus promouentur, mudo in priorem partem, modo in posteriorem. In latus enim moueri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est quod omnium commune est: tumor ab ea, in quam os venit; si os ab ea, à qua recessit. Sed sine intensione, digito tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur. At in digitis toridem fere casus, eademque signa sunt, quæ in manibus. Sed in his extendendis non æque vi opus est: cum & articuli breuiiores, & osculi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem vel in posteriorem partem exciderunt: tum iam palma compelli, atque id quod in latus elapsum est, digitis restitui. Neot. nec eadem fore ponunt, *vt Gualdo.* Ita ossa iactata (*inquit*) & digitorum facilius reduciuntur, si recentier fracta sunt & luxata, dislocantur ad vnã quamque partem, præcipue tamen ad anteriorem & posteriorem, quod dignificetur per communia signa, & sciendum quod tota intentio restituti verferit in bene extendendo & plicando & etigendo hinc inde iuncturam, & comprimendo eminentiam: & si hoc modo non restituantur, Albuliculus etiam comprimere emioentiam manu su-

per tabulam. In firmando quoque non est aliud faciendum quam in aliis, nisi quod adhibeantur ferule aut ferula ex liguo vel solea, & remaneat de quatuor in quatuor. Firmatur, *secundum Lamerium.* in duobus & viginti diebus: & postea, vt dictum est, adhibeatur ad leniendum *disticha*, & reliqua emplastrata vel cerata.

OBSERVATIO VI.

De femore luxato.

CVi femur exciderat, huic id nullo modo restitui potuit, nisi machinamento ad hoc apto. Femur etenim (*vt ait Celsus lib. 8. cap. 28.*) in omnes quatuor partes promouetur, facillime in interiorem, deinde in exteriori, raro admodum in priorem aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsus est, crur longius altero & valius est: extra enim per vltimos spectat: si in exteriori, breuius, tantumque sit, & intus inclinatur: calx in gressu terram non contingit, sed planta ima; meliusque id erus superius corpus, quam in priore casu fert; minusque baculo eget. Si in priorem crus extensum est, implicari ne non potest, alteri cruri ad calcem par est: sed ima planta minus in priorem partem inclinatur: dolorque in hoc casu præcipuus est, & maxime vixina supprimitur. Vbi cum dolore inflammatio quieuit, commodè ingreditur. totiusque eorum pes est. Sed & si in posteriorem extendi non potest crus, breuiusque est, vbi constitit, calx quoque terram non contingit. Magnum autem si in tempore periculum est, ne vel doliulter reponatur, vel repositum rursus excidat (*vt cognate nostræ euenit, vt in prima obseruatione diximus.*) Quidam iterum semper excidete contendunt: sed Hippocrates & Duolet & Philotimus, & Nileus & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriæ prædiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu fecerunt, Hippocrates, Aodreas, Nileus, Nymphodorus, Protaechus, Heraclides, repperissent, si id frustra esset. Sed, vt hæc falsi opinio est, sic illud verum est, cum ibi valentissimi nerui, musculique sint, si suum robur habent, vix administrare, si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, & si renerius membrum est, satis est habentiam alteram ab inguine, alteram & à genu intendi. Si validius, melius adducere, qui eadem habentiam ad validos baculos deligant, ac eorum sustiniamas partes oppositas mox obiectant; superioresque ad se vtrique manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrum super scammum, cui ab vtrique parte axes sunt, ad quos habentiam illæ deligantur, qui (*vt in ioculatoribus*) conuersi rumpere quoque. si quis perferre aueit: non solum excedere neruos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scammum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus: sic vt semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est: ea cetera inferior, à qua recessit. Neruus extensus, si in priorem os venit, totummodum aliquid super in-

P

gna

Cap. 18. e. in dem lib. de palma.

Cap. 19. de digito.

Quid cap. 6. de dolentium: vasa m. m. & digiti ferunt.

guen ponendum, subitoque super id, genu ad-
ducendum est, eodem modo, eademque de cau-
sa, quae idem in brachio sit; proutque si com-
plicari seminare potest, tunc est. In ceteris vero ca-
sibus, ubi ossa per vim paulum inter se recesser-
unt, medicus debet id quod eminet retro coge-
re; minuset contra inde coxam propellere. Pos-
sio ossis, nihil aliud novi curatio requirit, quam
vi diutius in lecto detineatur; ne si morum ad-
huc ne cuius laxioribus seminare fuerit, rursus erum-
pat.

SCHOLIA.

*Paulus lib.
9 cap. 112.
de coxa
fractura.*

Quum alia corporis ossa interim pervertantur,
interim toto loco excident, coxae hinc
et illic articulus et luxatio opportuna non est,
qua tota sede (*inquit Paulus*) promouetur, atque
ex his magis coxae articulus: quoniam sinum &
rotundum & profundum possidet, ad hanc, quod
alioquin ubi verius munitur sit. At si quando-
que articulus ubi vim quandam vehementem si-
nu suo exciderit, etiam tunc luxatio maioris
minorisque ratione differentie proveniunt;
quatuorque modis, imo locis, coxa luxatur: vel
enim in anteriorem partem vel exterioriorem, prio-
riorem, vel posteriorem, prolabitur: verum intro
quidem & extra continue, & multo frequentius
intro: in anteriorem autem & posteriorem rarius.
Quibus itaque in anteriorem partem coxa pro-
lapsa est, is crus affectum si cum sano conferas
longius spectatur, & genu prominentius, & ad
inguina crus inflectere nequeat, & iuxta pen-
tumor manifestus occurrit, tamquam femoris
capite illic deficiente. Quibus autem in exteriora
promota est, is contraria notae veniunt; si qui-
dem crus brevius apparet, & iuxta penem regio
in sinum de hisce, clunes inturgescunt, & genu
interius demergitur, crus inflectere possunt. Si in
posteriorem partem prolapsa est, crus sine dolore ge-
nu extendunt, non autem ad anteriorem partem
inclinare possunt, incedere conantes: utina hic
(ut etiam antea ex *Celsi* diximus) supprimatur, in-
guina intumescunt, pares rugosae carnesque
apparent: calci inter ambulandum innituntur.
Porro quibus in posteriora excidit, non aut po-
steriorem aut genu extendunt; neque inflectere
prius quam inguina possunt: atque hic crus bre-
vius, inguina laxiora apparent, & per nates fe-
moris caput eminet. Quibus sane iam inde a puer-
ritia, aut certe longo temporis spatio articulus
prolapsus curae non fuit, etiam praedictum nihil
promouetur, membro iam in orbem coactio.
Quibus autem continenter excidit, hi curatio-
nem Hippocraticis assument; quapropter statim
reponi luxata debent: vetustis siquidem coxae
luxationes, nullo modo consanescunt. Com-
muniter itaque in quatuor luxationibus concin-
natio congruet, tum quae conversione articuli
& circumductu sit, tum quae intentione. Si enim
affectus recens fuerit, & aeger iuuenis, nonnum-
quam semper continentes circumagentesque huc
illuc articulum reposuimus. Quod si in intro-

rem partem luxatio declinauerit, etiam crure so-
lum subito & valenter ad inguina quam intimo
flexo, id quod requiritur effecimus: sin autem
his non cesset, intentione utendum, primum
per manus adhibita, quae crus ab inferiore parte
trahant, ac per securi tibiamque constingant; ex
superiore autem parte, sub alas corpus circum-
dant. Quod si etiam valentior desideretur inten-
sio, funibus coteritis aut implicitis, vel loris crus
dehigabis, omnino quidem supra malleolum; ut
autem genu nihil patiat, hoc quoque superius
ligare oportet: at posteriori regione vincire ne-
cessario non est; verum, ut dictum est, manibus sub-
ter alas comprehendatur, lorique mollis & vali-
di medium iuxta penem adaptatum, in humeros
reducemus, anteriores, per inguina & claviculas;
posterius, per summas partes: duoque lori capi-
tula ministro trademus: deinde omnes similitra-
hentes, ita ut aegrotantis corpus prorsus eleuetur,
intensionem hanc quam dexterrime moliemur.
Hic quidem intendendi modus communis est
quatuor femoris luxationum differentis: priu-
atim autem in singulis modis quo ossa secra in se-
dem suam compelluntur, Graeci *machiam* di-
cunt, euariat. Intenso homine siquidem iuxta
partem articulus exciderit, lori iuxta pe-
nem sui medium inter femoris caput ipsumque
penem dispensari convenit; refertur autem lorum
per inguina adiacentia & claviculam expedit. At
adolecens quidam duobus cubitis affectum fe-
mor, quae crassius est, circumdatur, in exteriora
valenter extrahit. Atque hic modus inferendi al-
liis expeditior est: cui si articulus non esset, al-
liis quoque utendum variis quidem magis, sed
eo efficacioribus, intendi etenim hominem super
lignum grandius aut scamnum oportet, in
quo etiam spinae gibbero vitatos intendimus.
Insculpentur autem per totum fere oblongae qua-
dam ceu foliis, quae latitudinem aliquid ineque-
trium digitorum, non maiorem, habeant, dissi-
dentes inuicem non magis quam digitos quater-
nos: ut secra iuxta extremum in ipsis resistente, in
quaeunque partem conveniat, restituatur
membrum. Per medium autem lignum aut scam-
num, aliud impingatur lignum pedalis longi-
tudinis, columnulae modo crassum; ut sub huius in-
tento homine, lignum inter penem & femoris
caput perveniat. Simul enim corpus is qui ad pe-
dis trahunt porrigi prohibebit: eoque ne visa
quidem sepe venit, in contraria ex superiore par-
te intensio: simul autem intenso quoque homi-
ne, ipsum lignum femoris caput foras propellet;
ac intensio iuxta superius dictum modum admi-
nistrabitur, praeterquam pedis. Quod si ne sic qui-
dem in sedem suam redierit, impactum lignum
rectum auferri debet, ex latere autem huius liti-
rimque singula ligna infingerit, tamquam li-
mina, non minus quam pedalis longitudinis,
his aliud lignum adaptabitur, gradus scilicet mo-
do: ut trinum lignorum figura. Hic literam repre-
sentet, nam paulo interius summis medium lig-
num accommodabitur. Deinde in sanum huius
iacente

iacente homine, sanum quidem crus inter hæc limina subter gradum quodam modo ducemus, affectum autē crus ex superiore parte super hunc ponemus, vt ipsi femoris caput accomoderetur, substrato prius ei multiplici vestimento, ne femur contundatur, aliud autem lignum medioeriter latum, tantum habens longitudinem vt à femoris capite vsque ad malleolum subiectum petrineat, intrinsecus cruri alligabitur. Vbi iam facta est hæc intentio, aut per pistillum, vt in gibbero prius diximus, detrahare ad ima crus cum alligato ligno oportet, vt violentia hac femoris caput in propriam sedem reuertatur. Cæterum est & alius reponendi modus sine intentione per lignū, ab Hippocrate commendatus. Manus enim, inquit, ægotantis molliet coxis alligare oportet, & pedes utroque valido loro molli per malleolos & super genu fasciare, vt quatuor digitorum spacio inuicem distent: intentio autem affecto crure duobus digitis magis quam alterum hominem suspendere, vt caput cubitos duos à terra ablit. Adolescens vero aliquis peritus cubitis suis femur affectum comprehendens quia breuissimum est, vbi & caput femoris, & ex rheda suspendens hominem facile compeller articulum ingredi. Atque huiusmodi modus aliis quidē simplicior est, vt qui non multo apparatu peragatur; sed veluti miserabilem, ipsum vulgus abominatur. Porro si in exteriore membrum fuerit luxatum, homo superius intendi debentorum autem iuxta penem per oppositas partes ferti conuenit, inquit dico & clauicalam: medicum ab exteriore parte introsum agitate iuxta conuenientem formam ex illis quæ inculpræ sunt, ministro quodam veltum ad sanum clunem, ne cedat, obliacente. Sin autem in priora promotus est articulus, homine inuenio vir quidam validus dextræ manus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimere, & simul ad ima, simul ad genu constringere. At si in posteriora propulsum est articulum, non opus est quidem hominem in alrum vsque intendi, sed in firmo iacere, quemadmodum etiam si in exteriore articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebar, super lignum aut scamnum homo pronus tenderetur, vinculis non per illa, sed in crure, vt nuper dictum est, portectis. Iam vero vti conuenit constitutione per alitrem adhibita, iuxta clunium regionem, vbi & articulus excidit. Atque hæc sine de coendice ex causa fortis adueniente luxata, dicta sint. Quoniam vero propter copiam humiditatis veluti humerus, sic etiam coxa prolabitur, visione vtendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus. *Hæstenn Partu.* At hoc tempore etiam chirurgi iuniores & varii alii neotericos autores inter se discrepant, vt annotauit Guido. Nam Albucasis ponit solummodo tres modos; ad interiora, exteriora, posteriora. Brunus, Theodoricus, Lanfrancus, sequentes Auicennam, quatuor ponunt; sed facta comparatione plurimum ad exteriora, raro vero ad interiora, fieri: Guilielmus de Saliceto oppositū

dicat, sæpius ad posteriora, nunquam ad exteriora, ob os ad anchæ ligamentum. Cæterum quum omnes modi curandi quæsi concurrant in duobus modis restantibus, scilicet ad interius & posterius, ideo parum curandum est, & quod ad signa, præter communia, propria magis ipse Auicenna explicauit, scilicet quod in dislocatione ad interius & anterius tibia infirma longior est alia, neque potest plicari: quia caput coxe subintravit inguen, vt illud influit, & in eo apparet concavitas in parte exteriore. In dislocatione ad exterius & posterius è conuerso, tibia breuior est, & non calcit calcaneo, neque alia potest separari, & est concavitas in inguine, & exterius eminentia. Quod ad modos quoque attinet reductionis, hic animaduertendum, licet auctores multos diuersosque modos proferant, ad communem tamen quandam omnes intenti sunt, & duos magis proprios. Communis autem modus apud Albucasin ad reliquos omnes utilis est, quando ignoratur proprius modus dislocationis, tenetur autem æger per humeros fortiter, aut ligatur per humeros per radicem coxe sinistra ad columnam cum corio, & trahatur etiam manibus per inguen, & ab alia parte per genu fortiter coxa: & vice vna aliter huiusmodi, quod quasi eleuetur æger à terra; & tunc tandem coxa ad eandem partem moueatur, quomodo sit reducita. *Primus modus* proprius ad interiorē & anteriorem est, quod, vt dictum est, æger trahatur & dum eminentia apud inguen cum calcaneo impellatur coxa, per genu ad interiora ducatur. *Secundus modus* proprius ad exteriorē & posteriorem luxationem, est quod eodem modo æger trahatur: & dum eminentia extra cum genu impellatur coxa, per genu ad exteriora trahatur. Perfectio reductionis per longitudinem comparis sine mani fiat, *legere textu, & Lamerus riu imitatore.* Modus alius aptissimus ad extendendum est, quem alius vltimū, inquit Guido: *Extendebatur mensa longior ipso ægre, & in quolibet capite, firmabatur columna: postea cum manili transiente per inguina subter dorsum, & supra ventrē ligabatur ad columnam: & cum alio manili ligata coxa supra genu, voluendo eam tibiem vsque ad calcaneum ad alium ligabatur columnam: & cum cauitate postea inter maniles & columnam trahebatur ad quantūlibet partem.* Circa firmandi modum non est aliud faciendum quam in aliis: nisi quod ligatur inferius, ineiundo infra eminentiam ad partem oppositam, & transiundo ante & retro per renes ad partem sanam. Et in interiori ponitur pecia de panno, aut stippa super inguen: & ligatur est tibia sana: & quoniam antiqua, viuunt suspensione pedis ad humerum, vt *Auicenna* facit. Et in exteriori ponitur ferula longa vsque ad calcaneum. Et quando est antiqua, ligatur pondus trium: aut quatuor librarum in coxa, comprehendendo tibiā & pendat ad rotulam versatilem cum trochlea. Mutatur de quito in quintum, & firmatur triginta diebus.

Quid de
Cauisade
vult. diste.
cap. 7. de
dislocatione
in fibia
aut coxa.

OBSERVATIO VII.

De genu articulo à suo loco paululum moto.

Cum articulus genu à suo loco aliquantulū remouisset, chirurgus, vt docet Iohannes de Vigot lib. 8. cap. 2. de dislocatione genu & eius rotulae, cum membri extensione, manibus restituitur, & os in suum locum cum decenti pressura componebat; adiecta ferula commoda, & decenti ligatura per multos dies vtiliter adhibita, prius stuppi & emplastro ex farina volatili appositis, & sub turvatura pannus genu plicationem prohibens iniectus est. Remedia autem de tertio in tertium mutata. Interim non festinabat auferre supradicta & ferulam, aut ad ambulandum festinandumque, ne denno loco suo remoueretur. Genu autem in tres partes promouetur (Iste Paulus lib. 8. cap. 119.) interiore nimirum, exteriorem, & iuxta popliteum: in priorem prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdem igitur intentionis videntes modis, interdum per manus solas, interdum etiam funibus decenter deligabimus: reliquamque adferemus curatiōnem; hoc spectantes, vt particula diutius immobilis conseruetur.

SCHOLIA.

Idem fere & Celsus lib. 8. cap. 21. de genu scitipsum reliquit: Genu inquit & in exteriorem & in interiorem & in posteriorem partem excidere nōsumum est. In priorem non prolabi plerique scripserunt, potestque id vero proximum esse: cum in de opposita patella ipsa quoque caput tibiae contineat. Meget tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memorat prodidit. In his casibus intendi nerui rationibus iisdem quas in femore retuli, possunt. Et id quidem quod in posteriore partem excidit, eodem modo rotundo alioque super poplitem imposito, adducto que eo cruce, reconditur. Cetera vero manibus simul, cum ossium diuersas partes compelluntur. Neoterici haec addunt: Genu est veloci dislocationis: fortasse enim dislocatur, absque causa prater deambulationem velocem, aut lubricam partem, vti canali, multoties excidit absque causa prater saltum: Et genu quidem dislocatur ad omnem partem, nisi ad interiorem, propter rotulam & ad interiorem eius. Hoc modo fit curatio: Sedeat infirmus super sedem humilem seu propinquam tenae: & eleuentur pedes eius pauper: deinde extendat vir fortis manum suam de super, & de subitus extensione fortiter reducat restitutor iuncturam ad dispositionem suam, secundum indicium dislocationis vniuersalem, & liget eam. Addit Theodoricus lib. 2. cap. 52. & si necesse fuerit, lotus & inunctiones praemittantur, vt facilius restitueretur, postea ligetur primo contraditum, postea extensum: deinde paulatim moueatur, donec ambulare consuecat, praestat tamen diutius immobile manere, vt dictum est. Lanfrancus eadem quoque refert, & quod facile dignoscitur quando subito motus membri & erectio denegatur. At si apostema adfuerit, prius

sedandum, antequam imponatur: sed & huius restorationem & curationem paulo diligentius scribit Guilhelmus de Saliceto cap. 27. lib. 3. etiam cum vulnere. Sed adiecit quod omnis dislocatio cuiuslibet membri postquam restituta fuerit, si fuerit simplex, non cum apostema vel vulnere coniuncta, breuissime curatur, & non requirit multas deligaturas. Sed quando ibidem fuerit mollificatio, separatio, extensio, contortio, vel tale quippiam, sunt affectus nervorum, ligamentorum, lacertorum & tendinum, & ideo longius tempus requiritur in curatione; quare vbi dislocatio restituta est, & non redit membrum ad propriam actionem, medicus iudicabit quod cum ea fuerit extensio vel contortio in nervo aut tendine aut lacerto ultra debitum, & violenta, quae requirit nervosarum partium roborationem, & mollificationem eum oleo, pinguedinibus, medulla & res. de gummi, & similibus, ab eodem descriptis cap. de dislocat. spinae & spondylis. Quando accidit rotulae dislocatio, oportet vt ponatur pes plane in terram, & reducat rotula: deinde impleatur curvatura geniculi pannis prohibentibus duplicationem: & ponatur super eam hastella seu ferula resistentes ei in parte ad quam declinat. Cum ergo stringitur & adheret, non duplicetur genus cum festinatione; sed paulatim, donec bene alleuetur. Iubet autem Aucenna duplicari paulatim: nam dicit Lanfrancus & Lamecius, quod non est ingenium firmandi rotulam post reductionem, quam duplicare crurum coxa: & ideo ligata teneatur per horam. At Guilhelmus de Saliceto lib. 3. cap. 26. de separatione rotulae genu: Hoc membrum, inquit, non dislocatur, sed separatur & mollificatur, & conuenitur ad partem inferiorem ultra debitum; & raro ad superiorem: & istud scies quum aeger crur exigit, si nun tedeat rotula in sedem suam in tali mollificatione vel separatione, in hoc casu nihil aliud requiritur quam vt aeger recte stet in suis pedes, & à ministris idoneis ita in pedes detineatur, & ex aduerso per pedes, ne moueri possint: & tunc medicus premit manibus fortiter, & impellat violenti, docte tamen & ingeniose, rotulam in locum suum; quae facile redit dum hoc modo moueatur, & quae reducta immediate loco imponatur faldella stuppeae, longae, laeae, & totum genu ex transuerso ac infra ium supra comprehendant, infusa prius in vino nigro styptico paruo, aut aqua, & expresse, vel emplastro consilicatum. positum de disloc. adueneri seu humeri, & dicit stuppeae sint inuolutae in alb. ani & pul. consilicatum. Et si emplastrum posueris, superpone faldellam stuppeas longas, laeasque, infusas in vino, & expresse: deinde locus decenter ligetur fasciā lata per quatuor digitos, & satis longa, vt supra infraque generi resolutionibus duci possint; & non soluantur ad V. dies: deinde iterum ligetur, & erit sanatus. Si autem fuerit composita cum vulnere & fractura, tunc fiet vna res per sepe dictum est: & si adfuerit mollificatio, contortio aut separatio, sicut vt nosti; adhibita & phlebotomia in brachio aut pede

De rotula.

Quo de
restitutio
ne dislocati
onum
cap. 8. de
dislocatio
ne genu &
rotulae. p.
de & par
tium eius.

pede è diretto, si opus est ita & de venturis & victus ratione dicendum, vt in sermone vniuersali præscriptum est, & circa locum non omittendo defensuum. Et si aliqua durities vel nodi remanserint post loci fixationem, tunc bis in die vng. emolliente descripto de *dislocatione spinae* & *verset arum* apud eundem, inungatur.

OBSERVATIO VIII.

De pede luvato.

Cum nodus rascetque pedis facile dislocetur, sed difficulter restitueretur (*ex idem Galienum de Saliceto dicitur*) ob parva ossa que sex numero habentur, quidam harum parium fascia laxatione, per chirurgum fecit restorationem manuales, cum auxilio ministroi per idoneorum; quia hic locus non indiget multa extensione, nec violentia agri, ne ex dolore conflatus humorum fiat inflammatio. Fascia itaque azequione, statim appofuit peciam infans in *eleprofo, calido*, & de super emplaftrum constrictum; deinde & adellais fluppes infusus in viuo nigro, & circa locum, inungendo cum aliquo defenfiois; & fascia ligatione cum fascia lata per quatuor digitos, firmatis eircum olutionibus cum fustura, de cum bebat corpore lupino, crute eleuato ac pede; quo minus humor ad partem lefam conflueret; interim nota ligationis non stringendo locu doloroso, ne accedet inflamatio aut inflammatio, vel pes stupidi fieret, quia causa & idem in paralyin incidere potest, & tandem mortificari; neque prima ligatio soluebatur nisi quinto die, deinde de tertio in tertium; & ita curatus fuit.

SCHOLIA

Lab 8 cap 2
de Telen

T Alus (*inquit Crispa*) in omnes partes prolabitur. Vbi in interiore partem excidit, iuxta pars pedis in exteriorē conuertitur. Vbi huic contrarius talus, contrarium signum etiam extat. Si in priorem partem erumpit, à posterio- larum nervus, durus est, nimisque quo opus est: si in posterio- re, laxa pene ceditur, plaga maior fit. Reponitur autē in quoque per manus prius in diuersa pede, & crure diductis. Et in hoc quo- que casu diutius in lectulo perseverandum est, ne istalus qui totum corpus sustinet, parū con- firmatis nervis fetendo oneri cedat, tuncque pe- torumpat. Calciamētis quoque humilioribus primo tempore utendum, ne in dura talum ip- sam lædat. Plantæ ossa iisdem modis quibus in manu, prodeunt, iisdemque eonduntur. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehen- dere, ne cum mediā plantā, immoque eius vinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat; ideoque suppar- tet. In digiti quoque nihil ultra fieri debet, quā quod in his qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri. Hæc sane in his ca- sibus faciēda sunt, vbi sine vulgēre ossa excide-

tunt. Jam quoque talis r'culus (*Parva ar'te fiant*) si paulum excc'it, modica etiam int'ntione curatur: si roto loco mutatus est, vehem'ntius e-
get auxilio. Tentandum itaque & hic per manus validiore int'ntione vti. Quod si non reponitur, homine humi re supinator exsurgens, longum aliquem & validum palum inter duo femora iuxta penem in imam humam re'ctum defigamus, vt corpus aduectus cum reniens, ad pedis int'ntionem non cedat: imo prius defigatur, quam homo decumbat. Quod si magnum illud lignu' adest, quod pedale aliud lignum per medium habere desitum diximus, super hoc int'ntionem moliemur, ministro vno semur continente retrahenteque, alter manibus aut loro pedem trahit. medicus luxuram manibus dirigit, alietumque pedem alius ad ima coninebit. A repositio-
ne deligati tuto pes debet, fuscis ad sup'ioris pedis partem, albis ad talum distribui, cura adhibita, ne postea notendo iuxta calceum constringatur. In hoc casu vsque ad dies quadraginta in quiete homini perseverandum est, nam incedere ante absolutam curationem tentare, particu-
lam reddunt inuilem. A. si quis ex saltu calcis os peruerterit, vel etiam aliam quampiam infl'ntionem dispositionem fecerit, blandam quodam int'ntione, conformatione, sumens infl'nti-
mationi contrariis, & fuscis firmis ad dirigendū est, homine similiter vsque dum confluat, in lectulo perseverante. Ceteram dig' torum pe-
uerisio, vt in manibus dicebamus, non diffi-
cultate moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxationibus peruerisioque, postquam in-
flaturata sunt & conqueuerunt, infl'ntatione in articulis, vt venisile est, remanentem, aut tumorem, (*ita etiam duo membra si functionibus im-
pediant*) mollicatibus remediis percurabimus, quorum materiem nullus qui in art'is operibus versatur, ignorat, iuxta Neotericos etiam luxa-
tio nem pedis intelligendum est (*vt & Quidam dicunt*) quod pes facilius luxatur, & facilius rediit sed difficulter firmatur, propter multitudinem ossium componentium iuncturam: & potest di-
locari ad quemcuq; partem, præc'pue ad exte-
riorem & int'eriorem, cuius signa sunt eminen-
tia, & concauitas infolia, dolor, & p'nuatio motus. In reductione eius non est aliud: nisi quod ægro bene firmato, & tibia exensa perstrahatur, & moveatur ad quamvis partem fortiter: & emi-
nentia manibus compingatur, quousque redu-
catur, firmetur, & ferula adhibeatur, maturus de-
quinq; in quinq; dies, quiescat per 30. aut 40.
dies, alioqui sæpe in reductione partis partium
eratur. Ad digiti pedis, vt dicebat Galienus de *Saluato-
li. 3. cap. 26. de dislocatione digitorum pedo*, restitua-
tur vt digiti manus & emplastrum locus empla-
stro constringatur, dicto in cap. de dislocatione
habetur: id enim partes anhect sua appropietate:
nam ex forti ligatione & strictione stupor fieri pos-
set, & tandem membri mortificatio. Velluco
emplastri digitus inuoluatur, vel luxati digiti fal-
dellis stuppeis infusus in vino nigro styptico, vel

Lib. 6. cap.
1. de mon-
stris acri-
tatis, ubi o-
mnino de
pedu dignis
est.

De al-alaca
Irena podar
En dry-verd
avfärd,
pärta ag-
kastat.

Cop 13 de
planta.

Ср. 14. а
аурум.

aqua, & expressis, deinde inuolutis in oui liquore & pul. constrictis & si opus est, ferulis parvis insuper adiciantur decenter, ne dolorem inferant. Deinde super his fiat ligatio decens ac artificiosa fascia lata ad duos digitos vel pollicem vnum iniecta, vt de digitis manuum dictum est. & non soluatut vsq; ad tres vel quinque dies, nisi dolor partis affectae aut tumor & loci apostematio dissolutionem urgeat: vel soluatut omni die, ne membri exiguitate & debilitate stupor in ipso consequatur, & mortificatio aut gangraena succedat. In fine autem firmatio nisbis in die locus innungatur pinguiuscula cum vnguento de pinguedinibus & gummis facto & praescripto in capite de dislocatione genu. Non omittenda veto est plebotomia ex saluatella pedis oppositi vel in brachio; nec ventris lenitio, ant victus ratio accurata, modo dolor intolerabilis, tum alia id indicent.

Nunc tempestiuum est, vt vela contrahamus & huic nono libro, atque adeo toti nostro Chirurgico tractatui finem imponamus, & classicū eanentes, Deo optimo gratias agamus, qui sua liberalitate & benignitate nobis & animi promptitudinem & alacritatem concessit, mihi que licet corpore satis debili, robur adiecit, vt hunc indefessum laborem exegerim, vtq; praeterea quo-

tidianam praxin adeo laboriosam tandem & hos libros omnes, subinde quoque valetudinarius existens, ad finem perduxerim, cum vixiginti septem fere annis praxin exercuissem, & eo poullimum tempore, cum vbiq; bella intestina, maxime vero in istis regionibus inferioribus Germaniae: tum etiam Gallia adeo omnes saeuirent, vt vix quisquam tutus esse potuerit, milite adhuc externo plusquam satis in miseram plebem gauiente. Quare vt illius temporis molestias declinarem, ocium, quamuis tarum satis, ob agrorum nostrorum continuas curationes, nactus, etiam animum ad scribendum appuli, tum ea quae istis praecedentibus anois in praxi mea obseruaueram, in hunc ordinem quem nunc vides redegi, quae & aliis omnibus vt prodesse possint, posteris communia feci, ne cum iniquo seruo deputatus talentum meum sub terra teconderem: & insuper his S. holia quoq; adieci; atque non solum medicas Obseruationes nostras, sed & eas quae ex professu de Chirurgia tractant, etiam nunc ad finem deduxi, ipso 31. die Octobris, anno 1570. videlicet in ipso professu omnium Sanctorum, qui nunc in caelis cum suo Seruatore gaudent, ad quos ipse Deus Omnipotens nunc tum omnes nos deducere dignetur. Cui gloria, laus, & potestas nunc & in seculum. Amen.

*Finis Libri Noni Observationum Chirurgicarum,
deluxatis ossibus, Petro Foresto Alcmarrano medico auctore.*





